



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

615

H72j  
R


N. 204. 7<sup>21</sup> IACOBI

T. 612

HOLLERII H<sup>22</sup>  
STEMPANI, MEDICI  
PARISIENSIS CE-  
LEBERRIMI. R

Ad libros Gal. de Compositione medica-  
mentorum *ἡ τόνος*.

*50* PERIOCHE VIII *Dei Peri-  
phey*



LVGDVN I,  
APVD PETRVM LANDRY,  
M. D. LXXXVII.

ANTON. VALETIVS  
LECTORI.

**M**Ecum forsā mirabere Lector, his in Hollerij cō-  
mentationibus multa passim occurrere, quæ lib.  
de internorum curatione affectuum inserta liceat com-  
perire. Sed intelligas velim istam sibi ἐπὶ ἀνάγκης pri-  
moribus cum medicis communem esse, quæ ad optimam  
medendi rationem viam parat longè fidelio-rem. Quod  
enim loco vno aut altero breviter, & haud satis expla-  
natè traditur, id subinde repetitum magis innotescere  
consuevit. Adde quod (quantum ex laceris, & veluti si-  
bylla foliis, huc atque illuc dispersis authoris chartulis  
deprehendi) nunquam mens fuerat hæc enulgare, quæ si  
fuiſſet, auctiora multo dedisset, & reliquisset elimatio-  
ra. Quali acun-que verò sint, si aliquando tibi placuerunt  
nunc facta meliora non minùs probaturum speramus.  
Periochas autem libuit appellare, quod compendiarium  
ad Galeni libros τῶν τῶν & doctrinam complectantur.  
Vale.

IACOBI





IACOBI HOLLERII

STEMPANI, MEDICI PA-

RISIENSIS CELEBERRIMI,

*Ad libros Galeni de Compositione medica-  
mentorum τὸ πρῶτον.*

PERIOCHE I.



**A**REA genus est Alopeciae, & Ophiasis. Alopecia &  
Vtriusque causa vitiosum alimentum ophiasicos cau-  
capillorum. Ophiasis familiaris pueris sa.  
ab occipite incipit duorum digitorū  
latitudinem non excedens, serpit ad aures & fron-  
tem, donec vtriusque fines, quasi caput & cauda,  
committantur, ut serpentem repraesentet, unde no-  
men. Sponte sua aut leuioribus remediis curatur.  
Alopecia magis accidit adultis, difficilius curatur.  
In vtriusque, quod omni modo marcescit & emori-  
tur extrema pellicula capitis, unde conspersa, glabra  
ta, pili primum extenuantur, deinde excidunt. Lo-  
cus expers cruoris apparet, qui si configitur, sangui-  
nem liquidum & male olentem reddit. Alopecia  
sub qualibet figura serpit. In capillo & barba vter ophiasicos in-  
que affectus differentias habet, quia vel incipiunt, ueterata si-  
vel facti sunt, vel iam inueterati. Inueteratorum si-  
gna.

## AD LIB. I. DE COMP. MEDIC.

gna, cutis densa, subpinguis in totum glabra, & quæ totu, frictione, exasperatione non rubescit, aut ægerrimè curatur.

### Curatio.

**I**N ratione vitæ, purgatione totius corporis. dein de capitis cura quadam per frictiones, & similia circa caput, topicis remediis, tota consistit curatio. Rationem vitæ præscripsit Asclepiades abstinentiâ vini, leguminû, lactî, ciniorum, casei, carnium & eorû, quæ vel plurimum nutriunt, vel flatus & vapores gignunt. Exercitium sit moderatum, rarum balneum, rarus sudor, alimèta, quæ parû nutriunt, tenuem succum & bonum gignunt, atq; omninò repugnant vitio. Purgatio corporis, vt est vitium humorû in pituita, pilulæ coccię, assaieret, turbith, agaricus, puluis hierę diacolocynthidos, diaphœnicû, diacarthamû, qualis erit hæc dosiſ. ℥. pilularû cocciarû 3. ß. pulueris hieræ diacolocynthidos, agarici an. 3. i. cum expressione 3. i. turbith. gummosi infusi in oxymelite, fiât pilulæ. Poterit loco agarici aliquid misceri diacarthami. Diaphœnicum autem dabitur ad 3. ß. Vigētibus ætate poterit tamē acui addita 3. i. diacarthami, aut expressione 3. i. pulueris hieræ diacolocynth. aut 3. 2. agarici. Infusiones fiât in oxymelite. Vbi verò bilis vitium gignit, vtemur pilulis aureis, elect. de succo rosarû, diapruno laxatiuo, rhabarbaro, myrobalanis citrinis. Augebitur vis eorû medicamentorum duobus, tribus vel quatuor granis dacridij. In Melâcholico succo pilulæ de fumo terræ, de lapide lazuli, diasëna, cōfectio hamech, electariû Indum. Horum vis augetur adiecta infusione 3. ß. ellebori nigri, aut 3. i. lã verò vitium

Purgatio.

## PERIOCHE I.

3

Vitium humorum ex calore cutis, temperamento totius tum corporis, tū capitis, & antea cta vita depræhendes. Caput seorsum purgabitur, errhinis, & apophlegmatismis. Cura circa caput eiusmodi est, Primum caput rade, idq; sepius quotidie, vt malum est contumax, rariùs verò, vt est leuius, deinde perfricabis linteo aspero, foliis ficus, osse sepiæ, vriticæ foliis, pumicæ. Perfricabis autē molliùs, aut duriùs vt est malū contumax, atque in contumaci ita perfricabis, vt inde cruor moueatur. Vtemur quoque sinapismis, pūctionibus ex articulis, scarificationibus & cucurbitulis, quæ omnia pro magnitudine mali temperanda sunt. Herbis manè & vespèri, vel eò sepius in graui affectu. Atque hæc ante cibū faciendā sunt. Sequitur vt topica adhibeas, in quorū vfu hoc videtur, vt nō solum illinantur, sed diutius affricādo imbibantur vt altius in profundum subeant, quod in omni affectu faciendū est, vbi cūque vnguentis vtimur. Medicamenta è pinguibs, & medicamētis aridis in puluerem tritis, natura acris, tenuium partiū, quæ humorem vitiosum discutiāt, & alimentum regenerādis capillis attrahant, atque ita calefaciāt, vt neque vrant, neque prætermodum resiccent cutē. Pingua sunt oleū cariynum, anethinum, sinapinū, terebinthinum. & alia, quæ scripta inuenies c. 2. de attrahentibus lib. 1. de materia Chirurgica, adeps viperæ, ranarum, axungia, verus, sed præcipuè derafa axibus rotarum & alia quæ eodem capite scripta inuenies. Viscū quernum, gummi ellen. terebinthina Veneta, vel vulgaris, sc̃c. ampullæ lucernariæ, pix liquida aut sicca, sed oleo liquefacta, ceratum picatum, resinarū, galbanum, mel enu-

*Qua cura  
capiti adhi-  
benda.*

## AD LIB. I. DE COMP. MEDIC.

latum, diachylum, Ireatum, ceratum de Vigo, & similia oleo soluta. In pinguib. pulvisculi excipiuntur è materia prædita ea facultate, quæ dicta est. Medicamenta hæc sunt, euphorbiū, thapsia, arthenicum rubrū, pulvis angelicus, aut mercurialis, thymalorum cinis, nasturtij semē, sinapi, erucæ, sulphur, borax, nitrum, arundinis cortex & radix, vetratrum, radix ari & aristolochiæ, cinis muscarum, murium, ranarū, scarabeorum, ostreorum, salforū, piscium, amygdalarum amararū, atq; hæc vruntur, quod vstura adstrictionem relinquant, & tenuitatem partū acquirant. Eodem modo erinaceorum cinis, stercore volatiliū, muriū, fæx cremata, thus aceto tritum, cortex auellanarū, ficus cremata, cantharides vstæ, vsti scarabei. Sit autem proportio horum medicamentorum tritorū ad pingua subquadrapla, subsextupla, suboctupla, subdecupla, subduodecupla, quale sit. ℥. euphorbij ʒ. i. olei laurini ʒ. i. β. Hic subduodecupla ratio est. Quod si tantū ʒ. i. olei miscueris, suboctupla, si solā semūciā, subquadrapla. Bis in die hæc medicamenta illinuntur vel eò sæpius ea ratione, quæ prædicta est, cū rasura frictione & ceteris. Medicamentū fortius dolorem & ardorem excitabit, imbecillum nihil immutabit cutem moderatam moderatè calefaciet, & veluti pruriginem quandā commouebit. In malignis affectibus & cōtumacibus, fortioribus vtēdū erit ac sæpius repetitis. Leuioribus, leuiora, mediocribus, mediocria miscenda sunt. Hoc erit forte. ℥. gūmi elenij ʒ. β. axūgię veteris lotę ex aqua vitæ in sole ʒ. 2. olei è terebint. & laurini an. ʒ. 6. Liquefiant simul omnia, & probè misceātur in calidis cineribus.

Deinde

# PERIOCHE I. 4

Deinde insperge euphorbij subtilissimè triti, thapsiæ ana ʒ. i. sulphuris vivi seminis sinapi ana ʒ. ss. cineris tithymali, & cātharidum ana ʒ. i. Hic fere est suboctupla proportio. Fortius erit, si imminueris modum pinguium, vel auxeris modum puluerum. Clementius contra, si pulueres minueris, vel auxeris pingua. Eadem ratione ex descripta materia infinita pharmaca miscebis.

## *De profluuio capillorum.*

**A** Morbo sæpius, rarius sine morbo capilli defluunt, partim inopia alimenti, partim raritate cutis. Hic ergo vsu alimentorum salubrium & *Victus.* euchymorum regerandis pilis materiam comparabis, cutem adstringes medicamentis, quæ modicè calefaciant, & leniter adstringant, atque ita corroborent cutem, & poros constringant. Calidiora alimentum capillorum in halitum discutiunt. Quæ nimium adstringunt, eandem materiam repellunt, & sæpe etiam, nimium adstringendo, vias intercipiunt futurarum, per quas vapor inutilis quotidie exhalat. Atque ita retentis excrementis dolores capitis, fluxio in nares, fauces, & reliquum corpus commouentur. In vsu medicamentorum sub hyemen quidem & hyeme detondendus pilus est, sub æstatem & æstate ipsa omninò radi debet. Veteres ante balneum, & à balneo medicamenta illinebant. Nunc exoleta consuetudine balneorum, vitemur foris ex decocto absynthij, stęchados, farmetorum vitis, & vocatarum capillarium, adiectis interdum myrthi foliis. Coquenda in æquis partibus aquæ & vini rubri. Medicamenta iusta consistentia esse oportet, neque tam crassa vt inhæreant, neque

## AD LIB. I. DE COMPOS. MEDIC.

*Olea capil-  
lorum proflu-  
uium sisten-  
tia.*

tam liquida, vt defluant. Iusta est mellis crassitudo hyeme paulo calidiora & liquidiora tantum detrūso pilo, contra æstate, olea conueniunt rosaceū myrthinum concoctum omphacio. extremitatibus rubi & rerum huiusmodi, quæ adstringunt, atque his calidiora oleū de absynthio, de spica nardi. costinum. Medicamenta oleis miscentur, vt ladanum herbæ vocatæ capillares grana myrthi. semen brassicæ, mastiche, & alia id genus. Singulare hoc. ℞. polytrici, capillorum veneris ana. M. β. foliorū myrthi, rosarū, absynthij ana. P. 2. decoquatur in olei dulcis & vini rubri austeri ana quart. 3. donec vinum cōsumptum sit, omnia colentur, exprimantur, expressum oleum reponatur. Iam, ℞. huius olei ℥. 3. ladani ℥. 1. β. mastiches ℥. β. ladanum & mastiche subigantur in mortario pistillo calido, paulatim oleum infundendo, deinde consperge, & probe misce pulueris capillorum veneris ℥. 4. Aliud.

℞. ladani ℥. 2. subige in mortario, calido pistillo, paulatim infundendo vinum austerum, donec mollescat, deinde misce duplum olei conuenientis. Aliud.

℞. ladani, absynthij ana ℥. β. baccas iuniperi tuas & ligatas linteo, deinde per dies quinque mace rentur in oleo cōuenienti, exprimatur linteum in oleū. Hoc illizum, & profluuium pilorū prohibet, & furfures. Item brassicæ cinis oleo myrthino misceetur ad mellis consistentiam, similiter abrotonū in puluerem tritum, & hoc quoque Græcis & Arabibus probatum.

℞. corticum cannæ & auellānarum vstarum, granorum myrthi ana ℥. β. absynthij, gallarum ana

## P E R I O C H E I.

3.2. Terantur omnia in puluerem, misceantur oleo myrtillorum, donec fiat mellis crassitudo & consistentia.

### *De tinctura capillorum.*

**C**anities fit consensu Philosophorum & Medicorum non à siccitate, sed humiditate cruda, *Canities causa.* quam nativus calor non concoquit, externus corrumpit atque putrefacit. Naturis humidioribus celerius ex anteriore parte capitis, quæ humidior est. Qui viuunt capite plurimum operto, raro detecto & perflato aliquando ætate, nonnunquam morbo, sed præcipuè vitilagine, in hanc sæpius incurrunt. Quibusdam de repente pilus exalruit vapore hydragryi, aut cura graui. Habenda itaque cura, vt mali causa cognoscatur, purgandum corpus, si quidem egere videatur, & vt nigrescat pilus medicamentis duorum generum vti licet, calidis, quale est apud veteres Cedrium oleum ex Cedria, pix si quida oleo mixta. Aliud genus medicamentorum terreum est, adstringit & habet aliquid tenuiū partium permixtum, vt in profundū penetret. Sed ab horum vsu constrictis spiraculis capitis, per quæ vapores exhalāt, frigidi morbi capitis, corruptelæ detritum, fluxio in pulmones & reliquum corpus, tabes, mors aliquando insequuntur. In vsu melius est primum extergere caput. Veteres utebantur terra Cimolia. Nos sapone commodè utemur, ac sapo commodè poterit confici ex cōsuetis seuis, ouillo, caprino, hircino, pice liquida addita lixiuiο parato ex iis, quæ partim detergent, partim nigrefaciūt, vt è cineribus corticum salicis. Diuitibus poterit confiri sapo moscho & ambra, quam ambram griseam

## AD LIB. I. DE COMP. MEDIC.

vocant, atque intermisceri atramentū sutoriū, nigretā vocant, aut puluis lapidis nigri, quo iam passim calceos denigrant, & illustrant. Denigrat enim & astringit. Aliquid quoque atramenti impressorij, vernicis, vt magis hæreat sapo. Item pectine vtendū stanneo, plumbeo, corneo intincto medicamentis, quæ nigrefaciant. Capparis cortex aqua incoquitur, vt Dioscorides, lacte asinino, bubulo, vt Archigenes, vel (vt alij) coquitur ad tertias dū putrescat, atq; ita illinitur. Similiter cortex radicis ilicis, quam rustici (houx) appellant, coquitur dum putrescat. Decocto tergetur caput, cortice verò illinitur. Item myrthi nigre folia, semina betæ, folia ficus nigre, mori nigre, nucamenta seu catuli nucū, cortex fructus nucis nondum maturæ, cortex salicis, faba fabacea, galla, sumach, cinara, suber aridum plumbum vstum, excrementū ferri. Alia coquuntur in aqua pluuiæ, quædā in aceto. Succus ex aliis exprimitur, alia teruntur in puluerem, quædā cremantur, vt inde fiat lixiuium. Sunt ex veteribus Medicis, qui præcipiant prius caput radendum. Sic enim melius subeunt intro medicamenta. Ex tritis in puluerem & succo aliorum fit mellis crassitudo.

At flauos capillos reddunt lupini triti addito nitro ex aqua illiti, vel eadem aqua macerati, vel lixiuium. Experimenta sunt mulierum. Lixiuium parant, & inde caput detergent, lauantque, & ita exponūt foli. Aliæ madidos capillos statim conuoluūt suis lintheis, vt sponte sua siccescāt. Lixiuium addunt stramē triticeum, glycyrrhisam, ramenta buxi. Veteres ramenta loti arboris decoquebant. Fæx vini veteris vsta cum oleo muscellino. Illinitur radix eringij & verbasci

*Simplicia ad  
nigrorem capillorum.*

*Flauos capillos que  
faciunt.*



verbasci, flores. lixiuio macerantur, & aliquid herbæ, quam geldam vocant, adiiicitur. Singulare est hoc ad flauitiem capillorum.

℥. olei tartarei & persicorum ana 3. 2. commisceantur & verberentur fortiter in sole, quater in die. Continuetur, donec sint bene flauī. Item accipe radicem ireos, siccet in sole, admisceatur lixiuio, inspergatur, & fiat vt suprà. Item limaces rubri sale condiantur, ex quorum aqua abluatur caput & capilli.

*De furfuribus.*

**P**ityriasis vocant. Morbus est extimæ cutis. <sup>Pityriasis.</sup> pitis cum leui scalptu, quasi furfures excutuntur. Ferè à pituita salsa, nonnunquam ab altero bilis genere. Remedia sunt, conueniens diætā repugnans vitio materiæ, purgatio corporis, vt in alopecia, apophlegmatismi & errhina, quæ per os & nares pituitam ducant. Medicamenta topica, quæ discutiant, vel tergeant. Vrinæ quoque & sudores vtiliter moueri possunt. Materia comparatur ex siccatissimisque faba, hordeo, fœnugræco, orobo, lupino, cineribus betæ, brassicæ, abrotoni, cucumeris agrestis, parietariæ, puluere absynthij, enulæ, ireos, aristolochiæ, staphisagriæ, bryoniæ, ari, sulphuris, lapidis calaminaris, & generis terræ, quæ iam venalis circumfertur exsiccandis scripturis recentibus, pumice, osse sepiæ, foliis ficus. Conuenit item sapo & dñitibus pomata. Adhæc fæx vini, calx, argenti spuma. Composita fiunt ex his. Nā arida incorporantur succo, betæ, brassicæ, ireos, enulæ, cucumeris agrestis, bryoniæ, oleo amygdalarum amararū, fraxini, rutæ, vt sit crassitudo mellis. Hæc omnia fient melius

## AD LIB. I. DE COMP. MEDIC.

melius rasis capillis præmissaq; frictione ex linteo asperiore. Possunt & pulueres per se affricari ex iisdem cineribus. Lixiuum fit, quod conuenit.

℞. argēti spumę, olei rutacei. aceti ana, misceantur calidis cineribus. Aliud. Pulueris ireos & abrotoni ana ℥. β. succi enulę & betę quod sufficit ad crassitudinem mellis.

### *De morbo pediculari.*

*Phthiriasis.*

**P**hthiriasim appellant. Interioris cutis capitis morbus est ab humore calido illic collecto, unde putredine pediculi gignuntur. Post habitam rationem totius corporis, rectę institutam vitam & alia, vt prius, medicamentis siccantibus, detergentibus, attrahentibus ex alto, ac, si vis, amarore præditis vti conueniet. ℞. staphisagrię tritę ℥. β. aloës 3. 2. aceti scyllitici, & olei amygdalarum amaranū, vt sit mellis crassitudo. Aliud. ℞. pinguedinis erasę è lardo salso 3. 2. aloës subtilissimę tritę ℥. β. cum aceto scyllitico fiat vnio. Aliud.

℞. aloës, herbę pedicularis tritę ana ℥. β. olei fraxini & succi genistę quantum sufficiat, vt fiat mellis crassitudo. Aliud. ℞. pilularum communiū 3. 2. pul. contra vermes tantundē, cum succo athanasias fiat linimentum. Sapo cum aloe compositus aloe mollis addito oleo irino in muriam & lixiuū vel falsuginem carniū aut piscium iniicitur, & inde affricantur partes. Lixiuum fuerit fortius è cineribus athanasias & truncorum cynarę, id est, articaulis. Licebit vti & iis, quę faciūt cōtrā vermes. Sunt qui arrhenieum misceant. Vulgus hydrargyro vtitur. Sed in pueris & mollioribus naturis, neque hydrargyro, neque aceto vtimur sine periculo.

*De*

*De Achoribus.*

**A**choras Saphari vocant Arabes, vulgus *Ti-<sup>Achores, eorūque cau-</sup>* neā. In achoribus cutis ab acri sanie primum <sup>sa.</sup> prurigine irritatur, deinde exulceratur, & saniem reddit, subestque aliquando humor lentus, crassus, & viscidus, vnde sanies, tineæ species. Remedia sunt vita recta. In plethora, phlebotomia, in cacochymia, purgatio totius corporis, deinde per Apophlegmatismos capitis. Sequuntur remedia topica, quæ distingui debent, vt vitium magnum est, vel exiguum, recens, cōfirmatum, inueteratum, superficialē vel profundum. Denique vt est natura corporum, exiguo vitio, leuia remedia sine purgatione aliquando satisfaciunt. In recenti, repellentibus vtendum est. Discutientia commiscentur, eaq; mediocria. Confirmato vitio & inueterato magis, quæ magis discutiunt, tergent, incidūt. Leuiora remedia superficiali Tineæ, maiora profundæ comparari debent. Acetum vi repellendi, incidendi, discutiendi præditum, & propterea eximium. In hoc morbo pueris, mollioribus naturis, & corporibus noxium. In remediis olea sunt, axungię, succi, medicamenta arida, quę liquidis & pinguibus permiscuntur. Olea quædam repellunt, vt rosa um, myrthinum, cydoniorum, salignum, id est, è falicibus. Alia verò tergent & discutiunt, irinū, de cucumere asinino, amygdalis amaris, iuniperinum, fraxinum, de serpentibus, de frumento, medio cortice sambuci, de nucleis persicorum. Axungię in alopecia scriptæ, succi borraginis, fumariz, scabiosæ, parietarię, betę, anagallidis, enulę, aristolochię ireos, sambuci, absynthij, ebuli, cętaurij minoris, marrubij,

## AD LIB. I. DE COMP. MEDIC.

*Remedia ad  
achoras.*

bij. cucumeris agrestis. Arida, sulphur, cinabrium, sales torrefacti. arthenicum. ærugo. metallica acria, & ea quæ scripta sunt in Alopecia. In vsu radendū caput est, & perfricandum succo aut liquore conuenienti. Succij iam scripti & liquores conueniūt, lixiuium, vrina, falsugo. quibus acetum permisceri potest. Postremò medicamēta illinūtur. Aceti loco mixtura vini & lixiuij vtendū est. Vinum sit austerrum, vbi repellendum, acre & vetus, vbi discutierendū est. Leuia sunt creta, argilla figularis, rubens sapo, pomata dissoluta aceto, in pueris & mollioribus corporibus, vino austero & lixiuiio, spodium, antispodiū, pompholyx, lapis calaminaris miscentur initio. Sinapis vulgaris repellit, vi aceti incidit, deterget virtute sinapi. Sales torrefacti, & diu cum hydrargiro triti, donec nigrescāt, vtiliter permiscentur. Mediocre est ex axūgiæ veteris bene lotæ in aqua rosarum ℥. 4. sulphuris viui triti in aceto acerrimo ℥. 1. salis, vt dictum est, torrefacti & triti, pul. sinapi, plantaginis an. 3. l. Aliud sulphur viuum aceto acerrimo maceratur in vase æneo collocato ad solem, deinde siccatur in eodem aceto. Ouum cum sua testa triduum maceratur. Vitellus extrahitur, crematur testa, omnia permiscentur. Aliud. Radix lapathi acuti & enulę cesa in taleolas in aceti & lixiuij partibus equalibus ad putrilaginē coquitur, deinde permiscentur axūgiæ veteres, consperguntur sulphure, vt prius, præparato. Aliud, colla fabrorum, gummi ceraforum simul in aceto macerantur, deinde coquuntur in eodem aceto, arque hoc abiecto oleum de frumento vel de sulphure miscetur, vt fiat satis liquidū euchristum. Postremò sulphuris

fulphuris & cinabrij partes æquales miscentur.

Aliud. ℞. succi borraginis, scabiosæ, lapathi acuti, ireos ana ʒ. 2. facis olei veteris, aut olei quod conueniat ʒ. 3. aceri, quod sufficit. Bulliant, simul omnia. Deinde subductis igne misce pulueris ellebori albi & nitri, sulphuris viui, lythargiri auri, auripigmenti, cinabrij, calcis viuæ, aluminis, gallarum, fuliginis picis, vnde fit atramentū impresorium, cinetis è facie vini vsta. æruginis ana ʒ. 2. eo plus minusve. Acre est aliud. Pix aceto coquitur, adiecto aceto oleo conuenienti miscetur. Sulphur, cinabrium, sinapi tritum permiscetur. Vidimus tineam *Maligna tinea luis venerea remedia curata.* in quam lues venerea degenerauerat, eaque nullis aliis remediis potuit curari, quam quæ solent vsurpari in ea lue.

#### De Psyracia.

**P**sydracia, pustulæ sunt duræ, subalbidæ, quæ expressæ saniem reddunt, vbi enulato vnguento, citrino, lacte virginali, saliuâ limacum, pomata theriaca, radice enulæ, & lapathi acuthi, in aceto cocta, & cum axungia mixta vtendum est.

AD

AD LIBRVM SECVN-  
DVM GAL. DE COMPO-  
SIT. PHARMACOR.

¶ τόνος

PERIOCHE II.



Aput dolet intēperie, aut solutione  
continui. Intemperies alia simplex  
alia cōposita. Vtraq; cū materia, vel  
sine materia, in toto cerebro, in solis  
venis, arteriis, membranis, neruosis  
corporibus. Solutio cōtinui acri humore, erodēte,  
putri, bilioso, salso, grauis dolor excitatur distētio-  
ne. Distēdit autē humoris copia vel flatus, vulnus,  
casus concussio in eodem sunt genere. Galenus ex  
varietate causarū efficientium, ex partiū laboran-  
tium natura, ex loco, ex qualitate propria doloris,  
dolorum genera distinguit. Causæ efficientes, in-  
ternæ, & externæ æstus, perfrictio, ebrietas, casus,  
cōcussio, vulnus fumus, vapor aliquis virulētus, vt  
grauis odor, vel alius quidam suauis, sed hinc infe-  
ctus. Sic Medico non solum cōmunis, sed vniūiq;  
propria & particularis natura, quæ sua cuique est,  
cognoscenda. Causæ internæ sunt naturalis intem-  
peries, aut contracta morbo, quātitas, qualitas ma-  
teriæ mala cōformatio, obstructio. Obstruunt ferē  
humor crassus & viscidus, aut vapor eiusdem natu-  
ræ. Obstruuntur viæ, futuræ capitis, ossa palati cola-  
toria, viæ ad nares, aures, oculos, ad spinam, venæ  
& arte-

*Dolorum ge-  
nera ex qui-  
bus sunt a Ga-  
leno distin-  
cta.*

*Medico parti-  
cularis &  
propria cuiq;  
natura cogno-  
scenda.*

& arteriæ. A partium natura, nervosorum corporum dolor magis pungit, distenditq; arteriarum pulsat. *Dolorum differentia a partibus petita.*  
 In venis & substantia cerebri stupidior est. Loco, periostio superficialis, altus in meningibus. Intra calvariæ inclusus dolor sæpe pertingit ad radices oculorum. Ex propria qualitate hoc modo. Grauis dolor est in plenitudine & copia in acri humore, & vapore simili rodit. Sed in vapore acri distentio maior, minor rosio. Contra in humore, distentio pulsu cum membranarum, inflammatione. Sequitur cum grauitate copiam membranis conceptam, sine grauitate & pulsatione, copiam crudi, frigidiq; flatus. Dolor diurnus & contumax vel totum caput occupat, ut in cephalæa, vel alterum latus, ut in hemicrania, A sanguine ferè in frõtem, à pituita in occiput, à bile flaua in dextrum latus, à melancholia, in sinistrum decubit. Sed & ex proprietate dolorum humor aliquando intelligitur. Nam ferè moderatus est à sanguine, à pituita, coniunctus est frigiditati sensui, stupori, somnolentiæ, tarditati. Vbi facies decolor est, à melancholia varia phantasmata & imagines animæ offeruntur, à bile, calor maior, pallida facies, vigiliæ. Sed his omnibus adiungenda est antea acta vita, requirendumq; quo modo habeant viscera, & reliquum corpus. Humor enim & vapor, qui dolorem facit, aliquando generatur in ipso cerebro. Sæpe ab aliis partibus corporis & toto genere venoso transmittitur. Sunt quibus arteriarum intemperies multum sanguinem spirituosum colligit, unde vehemens pulsansq; dolor. Quibusdam, quod rarum scribit Auicennas, & memoria nostra visum est, vermis procreatus in cerebro,

## AD LIB. II. DE COMPOS. MEDIC.

graues dolores excitat, & hoc quoque rariùs, quod cuidam ex frequentì odoratu basilici, scorpìo in cerebro genitus, graues longósque dolores, & tandem mortem attulit, vt primo capite lib. i. de internis morbis diximus.

*De dolore capitis ab aestu.*

**D**utius iter facientibus, in sole commorantibus, in thermis, aut vaporariis calidis, calidiores vapores aut fumos excipientibus, dolor excitatur, vbi caloris sensus est in capite, fronte temporibus, saepe etiam post aures, vigilæ, oculorum rubor. Hic ergo cùm sit sola intemperies, contrariis pugnare oportet. Ea verò sunt refrigerantia & repellentia, in quibus tamen vitanda sunt, quæ nimium refrigerant & insigniter adstringunt. Declinandus splendor solis, instituenda quies, somnus, aquæ potus, aluus molliri debet, bene perspirata habitatio, & auersa à solaribus radiis, vita frugalis, alimenta quæ refrigerant & humectant.

Vitetur clamor, strepitus, motus animæ, corporis, & præcipuè mandibularum. In topicis hæc sunt *In topicisque obseruanda.* obseruanda. In declinatione, quo iam tempore lenitur dolor, medicamenta leniter digerentia, refrigerantibus miscenda sunt. Deinde, vt Apollonius consulit, fasciæ è lana, vel, vt nunc, gossipio circumligandæ fronti, omninoq; prouidendum, vt ne liquor, qui capiti adhibetur, parte aliqua in oculos, vel os defluat. Raditur caput aliquando, & ros paulò crassiora, vt detrusis liquidiora medicamenta fingenda sunt. Vtimur autem oleis, succis, liquoribus, foliis, floribus & germinibus plantarum, mucraginibus farinis mixtis in succo conuenienti. In oleis



oleis conuenientissimum rosarum recens sine sale & ex oleo omphacino cōparatum, alioqui in oleo albo, hoc est virginali vocato, vel eloto multę rosę aliquoties commutatę madeant, aliquādo rosarum non ita laudabile, sæpius lauamus aqua rosarū, q̃ si omninò desideratur legitimū rosarum, nenupharino, violaceo, papauerino, aut alio id genus refrigerante vtemur. Sed vt addatur adstrictio, aliquid olei cydoniorū, aut myrtillorū intermiscemus.

Succi sunt ē portulaca, lactuca, semperuiuo, vmbilico veneris, millefolio, polygono, & aliis eiusdem naturę. Sed hęc recentia esse oportet, nōdum ætate duriora, & sine succo. In liquoribus acetum, sed interdictū pueris, & mollioribus corporibus. Folio vitis, salicis, nenupharis, & herbarū præscriptarum. Flores nenupharis, rosarum, violarum, papaueris, capreoli vitium, fruticis, rosarum, rubi. Farinæ fabarum, hordei, quę in succis prædictarum herbarum adhiberi possunt, aut iisdem tritis commisceri. Muccagines psylli, cydoniorū, aliquando semina contundimus, paulatim effusa rosacea, donec fiat crassitudo aliqua, quale hoc remedium, Arabibus probatum, & nostris vsitatum.

℥. semi. papaueris albi, hyoscyami albi, lactucę, portulacę an. 3. i. sem. cucumeris & cucurbitę an. 3. 2. cōtundantur paulatim affusa aqua rosacea, donec fiat crassitudo, vnde frons, & tempora illinantur. Oxyrhodinū in frequenti vsu est, ex quinque partibus olei rosati, vna aceti, aliquando aliquid aque rosarum permiscemus. Ceratum Galeni rosarū, ex cerę tribus partibus, duodecim aut decem olei rosati cōficitur, subigitur cum succo her-

### AD LIB. III. DE COMP. MEDIC.

barum dictarum. Multa cerota conficies mutato rosaceo in aliud genus olei conuenientis. Cera fit alba, prius mollita in aqua tepida, lotaq; postremo subacta aqua rosarū. Sic enim maior vis inerit cerato, ad maiorem refrigerationē. Tota nocte sub dio collocantur, inclusa vase, hinc sepeliuntur puteis, aut aquis frigidissimis immerguntur. Licebit uti conseruis rosar. violarum, & nenupharis, emplastri more adhibitis, oxyrhodino, oxyerato, caphura quoq; topicis immiscetur. Lac muliebre cū tantillo caphuræ naribus inditur. Nodulus è rosis madefactis in aceto & aqua rosarum, naribus admouetur. Spongia quoque in decocto rerum quæ cōueniūt, immergitur, exprimitur, admouetur. In declinatione, quæ concoquunt, ut muccago, seminis althææ extracta in aqua chamæmeli, oleū chamæmelinum repellentibus misceri debent. Initio adhibita ut refrigerent, quia celeriter incalescunt subinde innouari debet. Ratio vitæ frugalis, aquæ potus, somnus, quies, perflatum cubile, & auersum à solis radiis, tranquillitas animi, quies corporis, & mandibularum, propterea in omni dolore capitis vehemēti interdici<sup>m</sup> duris alimētis. Debet aluus esse mollis quod procuratur iusculis è lactuca, oxalide, borragine, beta, iusculo prunorum, sero lactis cassia, catholico, & omnino leuioribus medicamentis. Dolor à perfrictione si fuerit, concidit facies, sed est decolor, pigris sensus, pigre animæ fluctiones, frigidis læduntur, utendū calidis, oleo rutaceo, irino, costino, nardino, quibus hyeme frigida, & maiori perfrictione, stiracem calamitā, benzoinum, mithridatium, theriacam permiscemus, euphorbium

euphorbium quoque oleo subdecuplum, vel subduodecuplum. Possunt olea confingi è maiorana, thymo, serpillio, origano, satureia, mentha, rosmarino, & aliis id genus calidis plâtis, in oleo & vino coctis ad cõsumptionem vini. Affectu peferuerâte, raditur caput, aut detonditur, paulò crassiora medicamenta quàm in æstu adhibentur. Fiant capitella seu pileoli ex aluta, quæ interiore parte inducta sit mollib. emplastris, calefaciëtibus, vt mithridatio, theriaca, aut vnguentibus crassioribus ex præscripta materia. Sinapismus quoque vsui est. Abstinentum phlebotomia, catharticis fortibus, cucurbitulis, multò magis eo genere curâdi, quod vsitatum in lue venerea, quod genus tantum locum habet in dolore longo, & pertinaci, à crassis multis, & viscidis humoribus. Alimenta sunt boni succi, quæ moderatè calefaciunt, vinum tenue, calidum cubile, illitus narium, infusio in aures, ex materia præscripta, oleis & aliis.

*Ab ebrietate.*

**E** Brietas grauißima affert symptomata, alia quidem subitò, alia post tẽpus, quale est illud scriptum ab Hippoc. apho. 5. lib. 5. Si ebrius quispian obmutuerit repente, & quæ Gal. cõmemorat cap. 5. lib. 5. de locis malè affectis. Moderatum symptoma est, dolor capitis, in quo videndum, an vinum crudum, & crapula restiterit in ventre, sic enim vomitus imperandus, confirmandus ventriculus, alioqui vteris iis quæ contra ebrietatem faciunt. Quorum duo sunt genera, alia quæ refrigerant & repellunt, iam descripta in dolore capitis

*Ebrietatem  
profigat duo  
genera reme-  
diorum.*

## AD LIB. II. DE COMP. MEDIC.

*Brassica e-  
brietatem ar-  
cet.*

contra æstum, vt rosatum, & peculiariter polygo-  
num, alia naturali quadam proprietate, aut certè  
non ita manifesta ratione, vt hederæ folia alligata  
fronti, ruta, decoctum centaurij minoris, amygdala  
amara, ceruinum cornu, brassica, quã scripsit Theo-  
phrastus naturali quodam odio dissidere cum vite,  
vt vim huius succumque eliciat: si feratur in vite,  
atq; inde vitem corrumpit, propterea Andracidè  
vsum brassicę contra ebrietatem. Quod autè vul-  
gò persuasum est crapulam vino elui, non caret ra-  
tione. Siquidem bene puro ventriculo & distribu-  
to priore vino, bibitur. Hoc enim vapores crassos  
discutit quos genuit crapula. Quod & Hippoc. &  
Gal. ostendūt in dolore oculorum ab huiusmodi  
vaporibus, eo Apho. vbi scripsit Hippoc. Dolores  
oculorum meri potio soluit. Apollonius somno,  
inedia, quiete, vomitu, vel vacuatione vitur, sed  
hæc conueniunt, vbi crapula grauatur vëtricus,  
alioqui inutilia. Alimenta sunt pauca, & boni suc-  
ci, quæ facilè concoquantur, pullastra, pulli colu-  
borum, capus iuuenis, alæ & testiculi gallorum, pi-  
sces saxatiles molli carne, oua forbilia, hordeatum,  
aquæ potus, siquidem inde non læditur ventricu-  
lus, sic enim vino bene diluto hydrosaccharo,  
cum vino granatorum, iulepo Alexandrino vti li-  
cebit. Secunda mensa, cydonia, vux passæ, pira, &  
mala leuiter adstringentia, in vapore cocta, con-  
ueniunt. In declinatione diutiùs & paulò celerius  
ante cibum obambulandum. Post duas, aut tres  
horas à cibo breuiùs & lentiùs. Atque hic bal-  
neum conuenire potest, & refrigerantia topica,  
commutanda in ea quæ moderanter calfaciant,  
quale

quale chamæmelinum est. Superstitio est in vsu amygdalarum amararum contra ebrietatem. Voluit enim septem esse numero, 9. aut 11.

*De dolore capitis ex ictu, vulnere, aut contusione.*

**I**cto capite, contuso, aut vulnerato, spectandum est, an ad malum pericranium extendatur. Sic enim membranam vsque ad os diuides cultello, aut scalpello, derafo osse, linamentis vulnus replebis, sed in primis omnia aduertenda sunt signa, cum præsentia, tum ea quæ veluti accidētia recens illato ictu superueniunt. Leges itaque cap. 4. lib. 8. Celsi. Alioqui si temerè vulnus factum solidabis, aut contusionem negliges, grauissima accidentia consequētur, vt mortes, fissio, fractio, aut aliter læso subiecto osse. Itaque in magna contusione, si quidem nullum vulnus est, aut exiguum, tutius fuerit, iniecto clystere, detracto sanguine ex cephalica respondente, in crucē interfecare, cutem contusam, & vulnus breuius ampliare. Sic enim facilius probamus, nunquid os læsum sit, vulnus linimēto implendum est. Inducendum splenium, aut complicatum linteum medicamēto, quod inflammationem prohibeat, quod reprimat, ex oleo rosato, albuminibus ouorum, bolo armena, puluere myrtilorum, aliisq; id genus, & suprà lanam succidam, vino, acetove tinctam, vel oxycrato impones. Postremò fasciola omnia colligabis. Iā tertio die, cōtusio vel omnino discutienda, vel in pus vertenda est. Quod si magna diuisio fuerit, iam tērato osse & membrana, futuris vulnus coniungendū est, sed ita, vt inter duo fila instum spatium relinquatur, & parte declinū magis pateat, qua scilicet pus cōmodius de-

### AD LIB. III. DE COMP. MEDIC.

fluat, quod alioqui collectū aut arrodit caluariam, aut per futuram fluit. In caput interius grauius adfert periculum. Dolor autem ferè excitatur ab inflammatione. Hic ergo leniendus dolor est, & extinguenda inflammatio. Vtrunque fit mistis medicamentis, quæ sine adstrictione & calore laxant, quorum materia abundè descripta in lib. de materia Chirurgica, cap. de dolore. Iam sublato metu inflammationis, lenito dolore. pus omninò cōficiendum est medicamentis suppurantibus. Repurgandum vulnus, detergēda sanies; tuncq; glutinādum, vbi benè purum vulnus fuerit. Hoc autē fiet prius regenerata carne, per medicamenta quæ peculiari- ter appellant cephalica. Deinde iam tecto osse, per ea quæ vocant glutinātia, vtraque materia, ex monumētis veterum, & obseruatione recentiorum, descripta est à nobis libr. 2. de materia Chirurgica. Est & aliud quod Galenus colligit de vsu aceti. Si quidem membrana quæ dura meninx appellatur, nudata est, omninò abstinendum ab aceto. Si verò ab osse incolumi ea omninò tecta est, distingues hoc modo, nam si grauis est inflammatio, & grauis dolor, hic abstinebis. Vel si vtrunque malū leue est, ita vteris & medicamentis, quale rosatum est, permiscebis, vt tenuitate partium, vim aliorum medicamentorum deducat in altum. Retinenda vitæ ratio, quam Apollonius instituit quies corporis, subtractio alimēti, vacuatio quæ sit, vel phlebotomia, vt antè dictum est, & medicamētis purgantibus, & clysteribus, noxiorum abstinētia, balnei, vini. neq; vini solū, sed & potuum qui inebriant. salforum, acrium, acidorum, clamoris, strepitus, motus animi, corporis,

mi, corporis, præsertim mandibularum.

*De diuturnis capitis doloribus.*

**C**ausa ferè intemperies cū materia frigida, in genere intēperies. vel solutio cōtinui. Intemperies, vt dictum est de dolore capitis sine materia, quæ ægerrimè curatur. Vbi confirmatā est, vel cū materia, atq; hæc vel biliosa & flatuosa, vel quod sæpè fit frigida, crassa, viscida. Atque hanc quoque statim flatuū copia sequitur, vnde distentio & dolor, quasi contundenti similis, & ad instar malleoli ferientis. Signa ex dictatis antea repetenda. Altera causa est solutio continui à vulnere, cōtusione, casu, distēctione, à flatibus. Iam verò flatus generatio medico intelligēda est. Generatur enim inopia caloris, atque hæc inopia duobus modis intelligitur, quia vel singulariter calor imbecillus est, vel non simpliciter quidem, sed vt ad materiā refertur. Atque in hac cōparatione materiæ quantitas eius, & qualitas considerāda, quantitas quidē, qui copiosior est, quā vt à calore etiā integer confici possit. Qualitas autem quia natura sua flatulēta est, quod in multis alimētis cōtingit & humore frigido, qui faciliè in flatus resoluitur. Atq; hi flatus cōtinuitatē soluūt, quia mēbranas & sensilia corpora præter naturā distendūt, & vi quadā suturas relaxant, vnde & diadematis, & fasciis arctiūs colligatis remedia inuēta sunt. Graue malū est, vbi materia putrescit, vnde febris, inflāmationes, & phrenitides.

*Flatibus unde sit generatio.*

*Curatio.*

Recta vitæ ratio instituatur. Alius lubrica, aquæ potus, media aut parcissima vita, nisi à bile malū oriatur temperamentū. Ætas, cœlum, cōsuetudo,

b b 5

& reliqua

## AD LIB. II. DE COMP. MEDIC.

*Intemperies  
nuda nec phle-  
botomem ne-  
que purgatio-  
nem postulat.*

& reliqua repugnent. Vitetur omnis vehemēs motus corporis, & animi. Alimenta acria, acida, salsa, & omnia quæ vapores gignunt, clamor, strepitus, splendor magnus, nocturnus aër, sed is præsertim, quem illustrant radij lunæ. In intemperie pura, neque phlebotomia, neque purgationibus vtendum est, cum materia hæc sequitur. Si plenitudo grauis, obstructio, inflammatio, febris, cõtusio, insignis fractura, vulnus, ac denique si intolerabilis dolor est, venam secato. Celsus phlebotomiã superuacaneũ remedium putat, vbi intolerabilis dolor non est, quem sequi non oportet. Nam citra hũc in propositis cõditionibus necessaria est. Vena cephalica aperienda, aut, si malũ ab inferiori corpore, mediana, paulatim digito indito, expressa cephalica. Deinde perseuerãte malo, venæ capitales, in fronte, temporibus, post aures secare oportet. Itaque Medicũ diligẽter animaduertere oportet, vt qua parte dolor magis vrgeat, maior sit rubor, tumor, pulsatio, sece-  
tur vena capitalis. Arteriotomia conueniet, vbi à sanguine calido & spirituosio dolor natus est, de qua lege 13. Meth. medēdi, & 6. de Sanitate tuẽda. Setis quoque porcinis, folio arũdinis, aut festucæ, irritãdæ sunt venæ interiores nariũ, vt sanguis profluat, nam & inde sanguis sponte naturæ motus, dolores capitis dissoluit. Alij vtũtur sanguisugis fixis in pinis narium. Sed ante phlebotomiam, siquidẽ resistit alius, clystere aut leui pharmaco purganda est, quia ẽ fece intestinorũ sublatus vapor sæpẽ dolorem mouet. Cucurbitulæ occipiti, vel paulò inferius in ceruice adhibentur, etiam cum scarificatu, nisi æger videatur opportunus paralyfi. Purgationes instituantur,



instituantur, vt est materia, ex ratione quæ in alopecie descripta est. Animaduertendū tamen in dolore, qui à flatibus excitatur, num flatu ab alimento generentur, aut à materia. Nam si ab alimento, frustra purgatio est, si à materia, id ipsum distingui debet. Nam si pauca, & solo capite inclusa, aliis remediis deduci debet. Si multa vel etiam toto corpore collecta, purganda est. Sed si crassa & frigida, incidentibus & concoquentibus prius preparanda est, quæ si tota potest cōcoqui, & pituita dulcis est, nō eget pharmaco, si salia, putris, aut corrupta, necessaria purganda est. Post habitam rationem totius corporis & capitis, per rationē vitæ, vacuationes, purgationes, ad particularem vacuationē capitis, per errhina, sternutatoria, masticatoria veniendum est.

*Errhina & sternutamenta concocta materia conueniunt.*

Errhina & sternutamenta maximè conueniunt, incisa prius & concocta materia, siquidē crassa est & viscida. Sternutamēta peculiariter cōueniunt, vbi caput multis vaporibus repletum est, vtrāq; præferēda, vbi pars anterior capitis purganda est, quæ admodum διαμαρῆματα caput posterius melius repurgāt. Illa tamen, errhina dico & sternutamenta, suspecta esse debent, vbi imbecilliores oculi, vel iam laborant, adhæc quibus nares aut polypis, aut ozænis, aut aliis id genus vlcerebus vel iam laborant, vel opportuna sunt, multò magis, si materia repurganda virulenta est, id quod sæpè accidit in lue venerea. Hic ergo masticatoriis potius utendum est. Masticatoriis similiter abstinendum, vbi fauces, palatum & reliquæ oris partes, pulmones quoque, vel iam laborant vlcere, vel vlcere opportuna sunt, hæc autem, ne fiat cōsuetudo, & vlcera

*Eadem quando suspecta.*

*Masticatoriis quando abstinendum.*

iam

### AD LIB. III. DE COMP. MEDIC.

iam facta irrigentur, quæ resiccare oportet, vel quæ in metu sunt, moueantur, neque contrà. Nec facit quod quis obiciat, materiam ille etiam, & deductam masticatoriis hiatu oris, & decliui capite, repurgari, quia in transitu vlcera irrigantur, & per somnum consuetudine facta iam non repurgatur materia. Errhina, alia sicca, alia liquida, alia verò euchrista, vt quæ illinuntur. Succis vtendum in maiore copia humiditatis, eo quæ corniculo vel fistula infusa prius subtilissimè trita insufflantur, alioqui inspiratu attrahuntur.

*Errhinorum  
materia.*

Aliquando solus vapor fatis est, vt nares scilicet admoueatur pixyribus, in quibus illa reposita sūt. Liquida vel vola manus, vel cochleari excepta tepida quidem inspirando attrahuntur. Quæ verò iam consistunt euchrista, digito, penna, vel alia resimili, illinuntur. Errhinorum materia, acris amara falsa, nitrosa, elateriū, piper, sinapi, elleborus, melanthium, cyclamen, maiorana, centauryum, pyrethrum, hyssopus, thymum, thalasspi, satureia, anagallis beta, soldanella, sales torrefacti, ammoniacum, nitrum, & alia id genus. Liquida ex iisdem exsuccatis, vel liquori mixtis. Pluribus vsus est succi betæ, hederæ, mercurialis parietariæ, maioranæ, anagallidis, contunduntur herbæ, & vt facilius reddat succum, aliquid aceti aquæ vitæ, vini, aquarum maioranæ, parietariæ, & similium instillatur, intermiscemus quoque aliquid zinziberis, piperis, nucis moschatæ, eorum quæ prius sunt dicta. In siccis errhinis quorum si multum est succi permixtum, fiunt euchrista, aliquando teruntur sicca, ex aceto, aqua hyssopi, maioranæ, vitæ & similium, aliquando ex iisdem

iisdem friguntur, inuoluuntur linteo raro, & calida naribus admouentur. Ab imbecillioribus inchoandum ad fortiora, ut elaterium & euphorbiū, atque hæc temperantur lacte, mucagine althææ, psyllij, lini & similiū. Hæc omnia melius à balneo, siquidem hoc vsitatum est, alioqui matutino, laxato corpore, aquam autem continemus ore, aut lac, ne dum hæc immittūtur naribus, aliquid in os decadat, quod os exulceret, vel deuoratum lædat. Si inde nares incaluerunt, lacte vel aqua tepida immissa naribus, medendum est. Eadem seruanda in masticatoriis, quorum materia eadem, quæ errhinorum. Sed excipiantur ferè mastiche, vua passa, ficu, cera: alioqui errhinorum materia vino incoquitur, ad gargarismos. Sternutamenta subtilissimè tritis errhinis siccis commouentur, sed maximè acribus, elaterio, elleboro, castorio, zinzibere, pipere albo, & aliis id genus. Sequuntur topica. Ea repellunt & refrigerant, quæ conueniunt initio. Concoquunt & tenuant, quæ incrementis misceri debent repellentibus.

*Topica remedia.*

Quæ discutiunt, maximè conueniunt in declinatione. Dolorē leniūt, quorum maximus est vsus in vigore. Corroborantia locum habent, iā discussa materia, & pacatis doloribus. Itaque raso prius vel detonso capite, remedia adhibenda sunt paulò crassiora, ut dictū est. Liquidiora hæc fiunt, ut melius penetrēt pharmaca. Laxetur cutis declinetur tædiū, quod relinqueretur inquinatis capillis. Atq; dū his utimur, vel pharmaca repetenda, vel qui hac parte plurimum conueniant, clysteres acres iniciēdi, frictionibus partium inferiorum vtendū est.

*Materia*

## AD LIB. II. DE COMP. MEDIC.

Materia repellentium in humore, vel vapore frigido & crasso tepida applicatur, multò magis hyeme, & temperamêto frigidiore. Contrà verò in materia calida & biliosa, frigida sunt repellentia. Verùm dum hæc aguntur, prouidendum vt ne caput nudatum pilis frigore lædatur, multò magis hyeme & coelo frigidiore. Itaque cucuphis vocatis, & gossipio caput muniendum est, consuetis quoque pileolis, quæ materia conuenienti perfumari possunt, benzoino, stirace, caryophyllis & aliis id genus. Puluis quoque ex conueniêti materia intermisceri potest. Cucuphas ex gossipio, alioqui emplastra aluta inducimus, ex qua fiat veluti pileolus. Materia remediõrum prius descripta est, in dolore capitis ab æstu, ebrietate, perfriktione. Legenda est historia apud Æginetam de muliere, quæ cõtumes huiusmodi dolores curabat decocto radicis cucumeris agrestis, & foliorum absynthij in hydrelæo, expresso oleo, quod relinquebatur, fouendum caput & irrigandum. Materia verò emplastri modo applicanda: potest medicamentum augeri hydrelæo factõ ex oleo conuenienti, chamæmelino, irino, & aliis prius descriptis, cui oleo olibanum, opopanax, galbanũ, benzoinum, & alia huiusmodi misceri possunt. Quod paratur ex attramêto, parabile est, sed vulgari scriptorio vtêdum magis circa, iniitia, post iniitia verò, impressorio. Democritus vtebatur arida fece attramêti, quã diebus integrum terebat ex aceto, deinde addebat octauam partem opij. Neque omittendum remedium, quod maxime conuenit vaporibus crassis, dum retinetur anima, seu respiratio, ligatur collũ, vt his artibus san-

guis

*Cucupha muniendo capiti inserviens.*

*Copia vaporibus crassis discuriendis conueniens remedium.*

guis vnà cum calore & spiritu colligatur sursum in venis & arteriis capitis, atq; ita collectus vaporem tenuet atque discutiat. Extrema remedia sunt, emplastrum de Vigo cum hydrargyro, in pileolo aluta capiti inductum, & toti ceruici affixum. Hoc remedium in crassis & viscidis humoribus tépestiuè & conuenienter adhibitum, plurimum potest. Adhæc sinapismus, diacopregias medicamentum, dropax, quæ scripta inuenies cap. de Pyroticis 3. de materia Chirurgica. Adhæc cauteria *παράκρωσις*, quæ vocatur seton. In materia frigida, crassa hæc postrema remedia conueniunt non in calida.



## AD LIBRVM TERTIVM

GALENI, DE COMPOSI-

TIONE PHARMACORVM

ἤ τέρτιος.

## PERIOCHE III.

*De aurium dolore.*

Vribus acris sensus à natura datus, descendente neruo à quinta coniugatione, cum dura meninge, fusque ac disperso in meatum auditorium. Causæ dolorum in genere, intemperies, morbus instrumentalis, solutio continui, particulatim refrigeratio, calfactio, densatio, obstructio, spiritus flatulentus, humor

*Aurium doloris cause.*

### AD LIB. III. DE COMP. MEDIC.

*Aurium do-  
loribus à fri-  
gid. quæ con-  
ueniunt.*

mor crudus, frigidus & viscidus illic inclusus, humor mordax, sanies acris, inflammatio tum propaginis membranæ, tum nerui auditorij vlcus. Dolor autem in ambitum auris, propter circumpositas latebras extenditur. Refrigeratæ auri, & inde dolenti calorigifica conueniunt, fel tauri cū adipe anatis, vt Arabes & Græci cū succo porri, quod remedium præterquam quòd calfacit, aperit quoque obstructions, terget, incidit. In hoc quoq; remedio consensus est Arabum & Græcorum. Cæpa, præsertim rubra, ampla excauatur, in cauitatem oleum conueniens cum succis conuenientibus & medicamentis immittitur. In calidis cineribus aut furnis vulgaribus super tegula coquitur, excipitur liquor. Oleum ex cæpa exprimitur, mixtura auri instillatur. Olea conueniunt, in quibus folia ruthæ, lauri, eiusdemq; baccæ, aut iuniperi, maiorana, origanum, rosmarinus, hyssopus, calamus aromaticus, piper, galanga, zedoaria, grana paradisi, zinziber, caryophyllum, & similia coxerint. Oleum de spica, de cinamomo, euphorbio, vel in quo vigesima quarta pars euphorbij mixta sit, oleum è castoreo, de piperibus, de scylla, de scorpionibus, de ben, seu muscellinum, de nucleis persicorum, amigdalarum amararum, auellandarum, de galbano, ammoniaco, & alia id genus. Plurimum vtendū est succis ruthæ, baccarum lauri & iuniperi, canabis viridis, centuarij minoris, bryoniæ, ari, dracuntij, persicariæ, & rerum amararum, vbi præsertim frigiditati coniuncta est frigida materia & viscida, qua detergent. Materia sicca, castoreum, ellebonus, calamus aromaticus, cardamomū, galanga, zedoaria, & alia in oleis memorata. Sacculi ex

culi ex eadem materia implentur, incoquantur vi-  
no acri & cretico seu maluatico, aut alio vino ge-  
neroso, exprimuntur, admouentur calidæ auri, vt  
inde vapor excipiat. Dolens auris gossipio clau-  
ditur, vt vocant, moschato. pileolis cōsuetis omni-  
nò via ad aures frigori plæcluditur. Ex oleis com-  
memoratis vnguenta fiunt pretiosa benzoino tri-  
to, momento moschi & ambaris, id est, ambre gri-  
seæ, addito.

*De dolore auris à calore.*

**G**AL. vtilissimum remedium putat in inflāma-  
tione & calore ouum crudum rosaceo suba-  
ctum. Arabes liquore oui tenuis suba cto ex aqua  
rosarum, nenupharis, violarum, lacte muliebri,  
succo parietariæ vel polygoni cum rosaceo vtun-  
tur. Materia remediorum, quæ refrigerant & do-  
lorem leniunt, itémque eorum quæ calefaciunt,  
amplissimè descripta cap. de dolore, lib. 3. de mate-  
ria Chirurgica. Quo loco remedia quoque inue-  
nies narcotica, quale est Philonium cum lacte mu-  
liebri, semina papaueris albi, hyoscyami albi lactu-  
cæ, cucumeris, trita omnia affuso succo è foliis &  
floribus papaueris, nympheæ, hyoscyami, vel aqua  
rosarū, violarū, nenupharis, trochisci. Stellæ dissol-  
uti sapa, vel in lacte muliebri, Trochisci de croco  
descriptione Mesuæi. Finges pastillos narcoticos  
ex opio, castoreo, sinapi, calamo aromatico, pipere  
& omninò addita materia. quæ cōcoquat, incidat,  
calefaciat, eritq; aliorum proportio ad opium du-  
pla, quadrupla, sextupla. Vniuntur pastilli sapa, vi-  
no, in vsu dissoluuntur lacte muliebri vitello oui.  
In obstructionibus à crassis, vel flatibus, vel humo-  
c c ribus





habet, epuloticum est, quod nō nisi bene puris vlc-  
ceribus, iisq̃ue inueteratis & duris corporibus v-  
surpandum est. Sunt qui frigrant octies in sartagi-  
ne ex aceto, deinde cum aceto coquunt, miscentq̃;  
rosaceum; alij more Gal. tantū terūt, & aceto qua-  
druplo coquunt. Clementius est remediū hoc mo-  
do. Scoria ferri in frustula diuisa fictili crudo co-  
quitur, dū vas percoctum sit deinde extinguit la-  
cte, idq̃ue bis & ter repetunt, cremant, extinguunt,  
tum in mortario terūt affusa aqua vel fontana, vel  
rosarum, vel plātaginis, vel simili, vbi diu versant,  
purgant, siccant, tum repetunt in mortarium, volu-  
tāntque affusa pluuia, postremò siccant. Singulare  
auxilium, vbi, citra morsum siccandum est. Recē-  
tiores abluunt mulsā. Ablues, & remediis scriptis  
cap. de purgantibus lib. 2. de materia Chirurgica.  
Post ablutum vlcus, succus parietariæ, anagallidis:  
saniculæ, buglæ, centinodie, plantaginis, bursæ pa-  
storis, millefolij cum melle coques, & his vteris.  
Similiter melle rosato, syrupo de absynthio vel suc-  
co eius cum melle rosato. Eodem modo, apij suc-  
co, vbi metus est putredinis, addes puluisculum a-  
loës & myrrhæ, centaurij minoris, gentianæ, sar-  
cocollæ. Ægyptiacum quoque solutum vino, vel  
œnomelite, remedium est veterum & recentiorū.  
In siccantibus vlceribus aprium alumen vstum  
ex vino, vel, vt sit fortius, ex aceto tritum. Alij v-  
rina pueri impubis vtuntur cum œnomelite. Forte  
est, ærugo trita cum œnomelite scylliticō. Sed  
quibus remediis abluas, tergeas, siccēs, inuenies ca.  
de purgantibus & epuloticis in materia Chirur-  
gica.

### AD LIB. III. DE COMP. MEDIC.

*Ad dolorem ex inflammatione, & sine vlcere.*

**S**anguinē detrahito, interdicito vino, nutrito, vt in febris. Sanguis ex cephalica eiusdem lateris detrahitur, clystere vel leui medicamento prius instituto, Circa initia lenientibus medicamentis sine calore dolorem sedato. In quibus præstantissimum credit Gal. ouium crudum ex rosaceo subactum, molliter immisum auri. Rosaceū, sit legitimum, quod magna præcautione admonuit Gal. Ouum sit recens. Licet vti rosaceo cum tantillo aceti. Arabes hoc remedium leuiter coquunt, tantillum caphuræ adiiciunt, quale fuerit rosacei opti.  $\mathfrak{z}$ . 1. aceti  $\mathfrak{z}$ . 2. leuiter bulliat in aqua calida, deinde misce caphuræ Gr. 4. Vt edum quoque muccagine feminis psyllij & cidoniorum extracta in aqua rosarum. Hæc muccago per se vel mixta prioribus medicamentis vsui est: lac quoque muliebri cōuenit instillatum auri. Quod si nimis vrget dolor, & inde periculum ægro imminet, ad narcotica prius descripta confugere oportet. Iam remissis doloribus ad cōcoquentia simul & lenientia veniendum. Sed dum hæc fiunt, omninò procurandum, vt vel clysteribus, vel leuibz pharmacis moueatur aluus. Leniunt itaque & concoquunt muccagines feminis althææ, lini, fenugræci, gummi arabici. Extrahuntur in aqua bismalūæ: adduntur pinguis, butyrum, œsopus, adipēs gallinæ, anseris, adeps suillus recens & sine sale. Postea basilicū & diachylon paruum, oleo anethino, amygdalarum dulcium, chamæmelino, irino dissoluimus & aliis medicamentis lenioribus, quæ cap. de suppurantibus scripta inuenias. Farinis etiam hordei, fabarum,

barum, althææ, lini, fœnugræci coctis rosaceo, vel oleis memoratis, vti conueniet. Aliquid indetur auri. Magna pars toti auriculæ & ambitui in linteis applicabitur.

*De vermibus aurium*

**V**ermes innascuntur ex putredine, quibus remedio sunt amara, qualia hæc, Olei persicorum, amygdalarum amararum ana  $\mathfrak{z}$ . 1. succi apij, centaurij minoris, ana  $\mathfrak{z}$ . 2. aceti  $\mathfrak{z}$ . 2. Coque in calidis cineribus, deinde adde myrrhæ, aloës ana  $\mathfrak{z}$ . 1. addito felle fiet efficacius. Aliud. Foliorum persicarum, absynthij, graminis, athanasie, matricarum, horum vnus vel duorum.  $\mathfrak{z}$ . 2. succi extracti ex nucleis persicorum addito pauco aceto  $\mathfrak{z}$ . 2. olei de fraxino  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . ellebori nigri  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ .

*Observationes quadam in doloribus aurium.*

**I**N his obseruandum ne quid durius, asperius, frigidius, calidius, grauius ex alto cadens dolorem exasperet. Liquidum sit medicamentum, tepidum, quod molliter instilletur, vel corniculo, vel crassiore penna secundum longitudinem diuisa in duas partes, extremo molli vel lana obuoluto, vt per cavitatem alueoli molliter influat medicamentum. Aliter hapso gossipij, lanæ, serici, imbuto prius medicamento & molliter expresso efficies, vt medicamentum leuiter influat. Vapores inferuntur auribus, sacculis (vt antè dictum est) tepidis expressis, spongiis cõplicatis, linteis in cõueniẽte medicamento inculcatis, expressis, admotis aliter veteres lenticulas implebant decocto conueniẽti, clauderbãt orificiũ, vel lana pauca, vel raro linteo, per quæ exhalaret vapor. Orificium admovebant

### AD LIB. III. DE COMP. MEDIC.

auri. Aliter quoq; corniculum auriculare fingi potest, altero extremo latiore, quodq; sit satis cōprehendēdo orificio lenticulę: altero angustiore, quod auri inditur: vocant per embotū. Sed corniculum cū sit inflexum, commodius est: alioqui emboto vocato vtendū erit. Quod si inflexo collo iisdem corniculo auri inditis, & ab alio exuctis flatus & alia corpuscula extrahuuntur auribus, vel instrumentis, quę similia sunt vulgaribus siringibus, exufflatio ab ore, & naribus efficiet, vt vapor melius attrahatur, & excidant, quę restiterunt in auribus.

*De corpusculis, quę incidunt in aures.*

**A** Qua, lapilli, festuca, animalcula, faba, & alia id genus incidentia auribus, periculū graue afferunt, nisi maturē excludantur. Nam inde dolor grauis, distentio, surditas, inflammatio, febris, conuulsio, mors deniq; consequitur. Iubebis ergo vel corniculum, vel stipulam, vel plumam comparari, quę aperta extremis partibus, altera quidem in aurem immittatur: altera comprehendatur ore vt fiat suctus, & inde quod lædet, extrahatur. Alij extremā partem infarciunt stupa, quę incēsa orificiū externum claudunt. Incenditur autē extrema parte, quę foras prominet: alioqui iuncum lucernarium, medullam sambuci, ceream candelā, verruculum ferreum vel argenteum extrema parte inducūt visco, glutine terebinthina, ac re omninō viscida, quā immittunt auri, vt quod lædit, aglutinet. In materia duriore eiusmodi instrumentorum molli lana extrema mollienda sunt: atq; dum eiusmodi instrumenta induntur auribus, omninō prouidendum, nequid effringatur, quod relinquatur aure. Quod  
si quid

si quid viscidum post extractum corpusculum in-  
hæsit auri, detergente decoctione eluendum est.  
Iubendus æger vt inclinata aure celeriter descen-  
dat è gradibus, aut môte insiliat pede, qui auri læse  
respondet, tussiat. Sternutatione vtendū, atque ali-  
quando cietur sternutatio, vt violento motu, quod  
lædit, excludatur. Nōnunquam eadem prohibetur  
præhensis clausisq̃ue naribus, vt aure, vt retentus  
spiritus impetū faciat in aures. Tabella illa, cuius  
meminit. Gal. violentum remedium est, concussio  
puerorū prehenso pede, herniæ periculum facit in  
molliore corpore, & quod ei malo opportunū est.

*De graui auditu.*

**I**N læso auditu vel præcipuum instrumentū læ-  
sum est, vel quæ partes ei seruiunt, vel cerebrū  
ea præsertim parte, vbi oritur quinta neruorum  
coniugatio à qua neruus auditorius est. Præcipuū  
instrumentum auditus extremitas est interna mea-  
tus auditorij, vbi neruus cum dura meninge ex-  
porrectus attingitur. Læduntur autem intempe-  
rie, simili morbo & solutione continui. Intem-  
peries rebus externis & morbo contrahitur, ani-  
maduertendūque qualis præcesserit morbus, ca-  
lidūne an frigidus, vt inde cognoscatur intempe-  
ries. Morbi instrumentales hoc loco ab obstructio-  
ne, quia non potest esse communicatio aëris exter-  
ni spiritus auditorij. Obstruitur meatus à tumore  
præter naturam tuberculis, aut carunculis adnatis,  
crassiore pure, crassa & viscida materia, copia for-  
dium, corpusculis incidentibus. Solutio continui,  
vt in vlcere. Intemperies curanda contrariis, cali-  
da frigidis, frigida calidis, quorum materia supe-

*Auditus præ-  
cipuum in-  
strumentum.*

### AD LIB. III. DE COMP. MEDIC.

rius descripta est. Obstructio liberanda remediis  
cōuenientibus, vt si ab inflāmatione, iis, quæ cōtra  
inflammationem scripta sunt. Si ab œdemate, inci-  
dentibus, attenuantibus, detergentibus. Similiter si  
à crasso pure aut pituita. Materia autem in dolore  
scripta est cōtra flatus & crassam pituitā. Scirrhus  
mollientibus, incidētibus, tenuantibus, & ea ratio-  
ne, quam scriptā inuenies cap. de malacticis, per-  
curatur. Tubercula, verrucæ maximum negotium  
faciunt, & vix nisi ferro, aut eo genere remediorū,  
quæ excedūt supercrescentē carnē, curari possunt.  
Corpuscula eximēda iis artibus, quæ proximē di-  
ctæ sunt, sordes auriscalpio & detergentibus infu-  
sionibus expurgandę sunt. Quibusdam vi tonitru,  
bombardarum, campanarum, laborat auditus qui-  
bus vox lenis, tarda, exigua, numerosa aut musica si-  
milis musicorū instrumētis remedio est. Peculiaria  
quædā remedia sunt contra læsum auditū, qualia  
quæ sequuntur. Castoreum solutum aceto & mix-  
tum oleo amygdalarum amararum, baccae lauri vel  
iuniperi, terūtur paulatim, affusa aqua vitę: singulis  
vnciis expressi succi, dimidiū 3. ellebori nigri per-  
miscetur. Subtilissimē trita colocynthis oleo con-  
uenienti permiscetur, vel eadem oleo & vino ad-  
dita parte aceti; coquitur oleum, vsui est, vtile bal-  
samū artificiale & acopa, quæ scripta inuenies cap.  
de dolore. Suffumigia fiūt per corniculū ex caryo-  
phyllis, ligno aloës, baccis lauri, ramētis iuniperi &  
rosmarini, maiorana sicca. Meliora fient, si in aceto  
scyllitico macerentur, vt ex omnibus fiat suffumi-  
gium. Fiūt quoq; trochisci ex elleboro, albo, casto-  
reo, pipere, calamo aromatico, borace, iūctis aceto.

Trochisci

*Auditus læsi  
peculiaris re-  
media.*

Trochisci vsui sunt fuffumigijs, vel foluti in oleo conuenienti ex adipis anguillarum ℥. i. olei muſcellini ſemuncia, ſucci caprifolij & Iouis barbæ ℥. 2. aceti ℥. i. ouis formicarum, quantum capiat dimidia teſta nuciſ. Coquuntur omnia in vaſe teſtaceo: colatura vtrique auri infunditur, atque omnino materia cōuenit prius deſcripta contra dolores aurium à crassiſ & viſcidis humoribus. Deſperatiſ aliis auxiliis decoctum ligni ſancti, & emplaſtrum de Vigo toti ceruici adhibitū, & poſt aures, ſingulari remedio eſt: verū cognoscendum eſt inueteratum malū eſſe immedicabile, atq; inueteratum putant poſt duos annos, & vbi æquabilis ſurditas eſt, neque augeſcens, neque remittens ſeſe, aut vbi ſcirrhus aut tuberculū interius iam intercipit meatum auditoriū, vbi in interiore meatu ſolutio continui eſt in neruo auditorio. Medicamenta liquida eſſe oportet, tepida, quātitate modica, ſubinde commutata, vt tertia quāq; hora. Atque priuſquam noua immittantur, detergenda auris atque repurganda. Iaceat æger in aurem ſanā, vt medicamentum influat. Sed quia iniecta in aurem cohibita ſæpè corrumpuntur, & præſertim quæ ſunt pingua, propterea fuffumigia & vapores præferunt iniectiſ. Quod ſcripſit Hippocr. ceſſare ſurditatem bilioſiſ deiectionibus, de ſurditate critica vel ſymptomatica in morbiſ intelligendum eſt.

*De Parotidibus.*

**A**bsceſſus ſunt glandularum, ſed auribus ſæpe numeroſiſ peſtilentiſ. Omninò peſtiliferi, nonnunquam maligni, quales ſcribunt vigiſſe, multoſque rapuiſſe anno 1510. Nonnunquā clemen-

### AD LIB. III. DE COMP. MEDIC.

tes sunt, quales viguerunt anno 1545 & præcipue vere. Nōnunquam sunt critici, qui si intro redeūt, lethales, nisi alui profluuium, vel insignis excretio subsequatur. Alij tardiùs erumpunt, alij celeriùs. Quidam cum dolore & inflammatione, quidam sine his. Itaque vbi vel dolor grauis, vel inflammatio, clystere molli vel leui pharmaco moueatur aluus, deinde auferatur sanguis è cephalica eiusdè lateris, tum medicamentis, quæ leniant, vtendum est. Cataplasmata ex farina hordeacea cocta hydrelæo, cerato variè comparato ex oleis, quæ nō reprimant quidem sed refrigerent, qualia scripta inuenias cap. de dolore, quibus muccago psylij misceri potest, præsertim vbi calor coniunctus est. Abstinendum hoc loco, vt in toto genere parotidū, medicamentis, quæ reprimant. Pacato dolore digerētibus nec ita calefacientibus vtēdum est, vt si fieri potest, materia resoluatur. Quod si resolui nō potest, & ad suppurationē vergit, suppuratibus vtendum est, qualia sunt farina tritici hydrelæo cocta, butyro vel axūgia mixta. Acetosa nō ita manifesta ratione cocta sub cineribus suppurat. Potest pinsi cum butyro, radici liliorū coctæ permisceri. Similiter licebit vti radice lapathi acuti, althææ, liliorū cocta, & cum butyro pista. In calore hyoscyamo cum butyro vti licet. Archigenes diu fouebat tepi da: deinde cataplasmata è farina hordeacea adhibebat, quod scriptum inuenies, vt alia multacap. de suppuratibus. Vbi iā pus factum est, vel ferro decliui parte, vel ruptorio vocato vomica aperies. Vteris medicamētis, quæ pus exhauriant. Materia describitur cap. de resoluētibus, de vomica aperiēda.

*Parotidibus  
omnibus re-  
primentia i-  
nimica.*



da, de pyroticis. Vbi apertus est abscessus, vlcus fuo-  
more curandum est, & purgandum sordibus, incar-  
nandum & cicatrice ducendum, ac fit aliquādo in  
malè curatis parotidibus, vt fistulæ ducantur, cō-  
tra quas incipientes, Gal. vehementer probat phar-  
macū quod sequitur. ℞. olei vetustissimi, alioquin  
racinini, anethini, caryini, cocti in sartagine ℥. 6. a-  
ceti fortissimi tantundem, lythargiri ℥. 4. Bulliant  
simul, coquantur per diem semper agitādo, donec  
nigrescat pharmacum, splēdeat que. In mitibus pa-  
rotidibus hoc medicamentum sufficiet. Olei cha-  
mæmeli, liliorū, butyrī recentis ana ℥. 6. croci gra-  
na 6. Fiat linimentum, superponatur lana sordida.  
Quòd si paulò durior videatur abscessus, admisce-  
bis & tetrapharmacum, vel dialthæas, vel diachy-  
lon paruum, de muscillaginibus, resumptiuum, vel  
aliquod id genus, qualia multa inuenias ca. de ma-  
lacticis. Ac primū crassiusculis linimētis, postea  
compage mollium emplastrorum, præsertim si do-  
lor abest, vt conueniet, vt si durities relicta fue-  
rit, vteris remediis contra scirrhus ex cap. de ma-  
lacticis.

*De narium affectibus.*

**I**N nares propago à dura meninge, nervus à ter-  
tia coniugatione descendit, patet & foraminib.  
exterioribus: & altero angustiore, quod ad mam-  
millares processus, & anteriores ventriculos cere-  
bri pertinet, altero ampliore, quod ad palatum &  
os diuertit. In naribus polypi fiunt & ozæna. Poly-  
pus tumor est præter naturam duriusculus, similis Polypus  
substantia carunculæ polyporū pisciū. Ozæna vlcus Ozæna.  
est malignum, quod ab acri fluxione, & aliquando  
putrilaginosa

### AD LIB. III. DE COMP. MEDIC.

putrilaginosa nascitur, atque putredinis signū est, quod grauit̃ olet: neque omne vlcus nariū ozæna est. Nam sæpè à pituita falsa vlcera concitātur in naribus, quæ crustulas ducūt, & facilè curantur. Ozænis malignitate respōdent vlcera in lue venerea suborta, quæ & aliquando, vt ozæna, cancrum referunt: quod vbi fit, magna desperatio est neglectis eiusmodi vlceribus. Os nasi cariem ducit, atq; corrūpitur, vnde forma naturalis nasi deprimitur & deperditur. In ozænis & polypis hæc sunt communia. Vacuandum corpus aliquando phlebotomia è cephalica, deinde etiā è venis, quæ ad labra perueniunt: deinde purgatione, ex quo resiccandū caput optima vitæ ratione, & medicamentis. Idēque corroborandum est in medicamentis, quæ resiccant caput & corroborent. Cucuphæ sint gossipio intertextæ & conspersæ puluisculis, qui siccēt & corroborent, quales sunt è ligno aloës, caryophyllis, macerè, moschata nuce, stēchade, saluia, maiorana, mentha, rosmarino, betonica, lauendula & aliis id genus. Præterea frictio è spōgia à syncipite ad occiput & latera ducta. In medicamentis, quæ raso capiti adhibētur, emplastrum barbarum, tum quod descriptum inuenies cap. de hæmorrhagia, tū quod cap. de glutinantibus, vel quæ sequūtur. Myrrhæ, thuris ana ℥. i. duo oui albumina. limaces triticum suis testis numero sex, rursus terātur omnia in mortario, & linteo inducta, capitique affixa 9. dies sinātur. In medicamētis topicis differētia est, quia ozænis cōueniunt, quæ repellant & discutiāt in polypo, qui ab humore crasso & viscido nascitur, quæ adstringant, incidant, tergeant, discutiant.

Atque

Atque in ozænis alia quidem remedia lenia sunt, alia verò acria, quibus in rebelli malo, serpente & putrido vtédum. At mediocria ex vtroque genere fiant, vbi malū erit mediocre. Lenia sunt rosæ sicca insperse, plantago sicca, herba vocata scordioides, clymenum vulgare, malorum granatorū triū generū succus leuiter coctus, vel cum melle in vase æneo ita coctus, vt crassitudinē habeat. Mel vstulatum cum succo plantaginis, cum puluere ireos, myrrha, aloë. Fortia sunt, aquæ fortes, metallica acria, pulueres dracuntij, batrachij, & quæcunque acria sunt. In leuibus verò metallica, quæ sine morfu siccant, quale est plumbi cremētum, lithargyrus, cerusa, pompholyx, puluis malicorij, & magna illud Gal. ex confusis granatis. Cæterum cum omnis ozæna vlcus sit, ordine quidem curāda est, purganda fordibus, incarnanda & claudenda cicatrice. Purgabitur hydromelite è decocto marrubij, centaurij, gaiaci, apij, absynthij, agrimonix, mixto aliquando fero lactis, vnde acrimonia lactis retundatur, aliis quoque abundè scriptis cap. de purgantibus. Purgatum vlcus aqua forti, qua aurum separant, aqua sublimati attingi debet. Mel Hispanicū tostū, addito puluere corticis gaiaci, purgat, incarnat, & cicatricem ducit. Cremētum plumbi tenuissimè leuigatur æquali parte vini austeri deinde adiecta æquali parte olei myrthini ad spissitudinē coquitur, pfloricum Mesue huic rei vtile est. Egyptiacū siccatur, & deinde puluisculo factō aliquid aristolochix admiscetur, gentianæ & similium. Gal. pastillis Andronis, Polyidæ & similibus utebatur, quos scriptos inuenies cap. de Hæmorrhagia. Sed quia

*Ozænā quæ  
optime pur-  
gent.*

### AD LIB. III. DE COMP. MEDIC.

quia medicamentorum vis subinde affluente humore diluitur, subinde cōmutare oportet. Negotiū fit maius, cum vlcera ea parte sunt, qua foramē est narium ad palatum, quia non tā faciliē medicamēta adhiberi possunt. Iubendum ergo, vt æger maiore vi inspiret, vbi medicamēta immittūtur: alioqui os amplissimè aperiat demissa lingua, vt specilli extremo medicamenta ad vlcus adducantur. Sunt qui firmum asperūque filum, vel è setis textū in nares mittāt, impellāntque, vt æger magno inspiratu attrahat, & alterū extremum in os perueniat. Itaque vtroque extremo filum prehensum diducitur, vt asperetur vlcus, & sanguinē reddat, deinde filum medicamētis illinūt, vt inde cōtingat vlcus. Nec defunt, qui acum plumbeam eo filo trāfigāt, ne filum reduplicet. Resupinato capite & naribus esse oportet, quum medicamenta immittuntur, iubemúsque aliquādo, vt vel muliebri lac, vel aliud, vel aquam ore contineant, vbi acria medicamenta sunt lethalia, ne quid translatum in os deuoretur.

#### *Cura polypi.*

**I**N polypo particulatim conueniunt ceratum myrthinum, ceratum ex cera rubra cum oleo myrtyllorum. Sed oportet ceratis addere sextam, octauam, decimam, duodecimā partem ægyptiaci, vel æruginis. Alioqui tantundem alicuius pharmaci generis eorum, quæ cathartica dicuntur, quorum materia & descriptio est cap. de pyroticis. Ad idem facit psoricum Mesue, Macerationis emplastrum, terrapharmacum cū duodecima parte æruginis, Lamponis medicamentum, quæ omnia scripta inuenias li. de materia Chirurgica, & quomodo.

modo sit eius vtendū. Ex argenti spuma & cerusa,  
vino, aceto & myrthino oleo coctis fiunt vnguen-  
ta, quibus aliquid pulueris malicorij, rosarum, ba-  
lauftiorum, aluminis & similium misceri potest.  
Puluis & succus dracūtij, cum foliis, radicibus, se-  
minibus, medicamentis miscetur, vt proximis vn-  
guentis, succo granatorū mixtura fiet, vt sunt cor-  
pora, & contumax malum est. Melicorium, tritum  
coctum cum parte trofchiscorū Alcibiadis effica-  
cissimum remedium est. Describuntur cap. de Py-  
roticis. Quod si crustæ fiunt vel in ozænis, vel po-  
lypis, medicamētis siccantibus resiccare oportet,  
qualia sunt epulotica, vnguētum de cerusa. & alia  
id genus ex cap. de epuloticis. Deinde vel vossella  
molliter cōmouēde, vt leui motu decidant. Nun-  
quam enim vi excutiendæ sunt, nisi iam resiccatæ  
non ita hæreant. Veteres sternutatorio utebantur,  
vt maturæ crustæ deciderent. Alij emolliunt bu-  
tyro, adipe anseris, aut gallinæ muccaginibus tra-  
gacanthæ, gummi arabici, vt emollitæ cadant cru-  
stæ. Remedia resupinato capite alia quidem instil-  
lantur: alia corniculo insufflantur, quædam specil-  
li nucleo capta inferuntur naribus, vel è pyxide,  
cochleari, vola manus inspiratu trahuntur vapores  
è vasis angustioris orificij admoti naribus. Excí-  
piuntur in vlceribus narium à lue venerea reme-  
diis, quæ contra hunc morbum adhiberi solent, il-  
lizu, emplastris mercurialibus vtendum est.

*Malicorium  
tritū effica-  
ciss. ad poly-  
pos remediū.*

De hæmorrhagia non agemus hoc loco, pro-  
pterea quod ea abundè à nobis actum putemus  
cap. 4. lib. 3. de materia Chirurgica. Illinc petan-  
tur remedia.



# AD LIBRVM QVARTVM,

GALENI DE COMPOSI-

TIONE PHARMACORVM

κτ' α' π' ς

PERIOCHE IIII.

*De Medicamentis ocularibus.*

Topica medi-  
camenta ocu-  
laria.

ιεράκια.  
ὀξύδερλῆ  
κολλήρια.

**M**edicamenta ocularia alia sunt ἀνάδου-  
να, & quæ λυσιπόνια appellant, eaque  
dolores leniunt. Alia repellunt, sed le-  
uiter, & adstringendo roborant. Non-  
nulla sunt, quæ concoquunt & extergent, discutiunt, molliunt. Plurima quoque excrescentem  
carnem consumunt, quædam peculiariter confir-  
mant oculos, conseruant visum, & aciem eius in-  
tendunt, hieracia & oxydorcia. Vlcera oculorum  
peculiarioria habent medicamenta, sed leuiora aliis  
vcleribus, quæ videlicet extergent, siccant, incar-  
nant, cicatrice tegunt aut crassiores cicatrices ex-  
terunt, quorum alia mitiora, vt citra morsum sic-  
cent: alia paulò acriora, de quibus omnibus ordine  
dicendum est.

*De dolore oculorum.*

**D**olores oculorum, inquit Hippocrates, meri-  
potio, balneū, fomentū, venæ sectio & epo-  
rum medicamentum soluit. Meraco vino vtimur-

vbi

vbi bene puro corpore venæ oculares, quæq; vicinæ sunt crasso sanguine, vel eiusmodi vapore repletæ sunt. Sit vinû vetus, tenue, giliuum, odorû, non adstringens, quod vel in cibo, vel inter cibos propinetur. Nā ieiuno datum vehementer nocet. Et quanquam ab Hipp. scriptum est, meri potus, & consuetis tamen & natura biliosis, adolescentibus quoque leuiter dilui potest, sed minùs solito. Ac quidā ex veteribus calida diluebant. Phlebotomia vbi corpus plethoricum est, & dolor grauis excruciat. Eligitur vena primû basilica in plenitudine vel mediana, deinde cephalica, postea in frõte, Postremò ex angulis oculorû, nisi vlcuscula, quæ phlyctenas vocât, aut profundius vlcus cum inflammatione adsit. Tûc enim reprobâda phlebotomia in minoribus venis, sed venâ amplo foramine aperire cōuenit, vt sanguis crassior effluat, & maturius sequatur animi deliquium, quod in asperrimis dolorib. magnâ vim habet, vt ex aliquot historiis licet colligere. Balneû vsui est vacuato corpore, cocta inflammatione. Vbi acris fluxio est, fomêto vteris, initidò quidem, vt têtes num corpus reliquum, vel caput laboret. Sic enim adhibito fomento color fluxioq; augebitur. In incremento & vigore, vt lenias; in declinatione, vt discutias & corrobore. Verû fomêta in mollibus linteolis & leuib. applicêtur, nequid vel grauitate, vel aspredine, vel durtie lædat. Propterea Hipp. sacculos reprobât. Medicamentû epotum in cacochymia pro natura vitij quod redûdat. Sed præter hæc frictions Cucurbitulæ occipiti & ceruici affixæ, vincula reuellendo dolores leniût, leues quoq; inspiratus cōprehensio

*Animi deliquium in asperrimis doloribus saluberrimum.*

# AD LIB. IIII. DE COMP. MEDIC.

*Oculorum  
anodyna duo  
rum sunt ge-  
nerum,*

ore medicamento, quod vim habeat leniendi, do-  
lores sedant. Medicamenta topica duorum sunt ge-  
nerum. Alia reuera leniunt: alia stupefaciunt. Sed  
stupefacientibus non temerè vtédum, qualia sunt  
collyria è cerusa lota, amylo, opio, & breuiter, que  
opium aliáque id genus recipiunt. Nam vehemē-  
ter fluxiones reprimere non possunt, sed excerni  
prohibēt, vnde erodi corneā contingit, si acris flu-  
xio est: vt si multa, magis irritari, aut vehemēter in-  
tendi, nisi medicamentum fuerit vehemēter nar-  
coticum. Intolerabilis dolor remouetur, sed stupe-  
factio aliud malum sequitur. Nam vis oculi omni  
nò læditur, vt in posterū vel nihil, vel hebetius vi-  
deat. Hinc quoque relinquitur dura quædam di-  
spositio tunicarum quæ nō facilè corrigitur. Hęc  
Gal. qui non solūm his, sed & in leniendo dolore  
emplasticis pinguibus, nimium adstringētibus, ab-  
stinendum putat. Emplastica poros infarciunt, ne  
quid exhalare possit. Adstringentia immodicè eos-  
dem cōstringunt, atq; ita interceptis viis, per quas  
debet fluxionis materia discuti, eadem retenta, in  
oculis dolores exasperat. Sed præter hæc adstring-  
gentia tunicas nimium resiccāt, & inde visum he-  
betant. Pingua verò propterea prohibet Gal. oleū  
& alia id genus, quia in vehemēti ardore oculi fa-  
cilè incenduntur. Eadem quoque sordes faciūt, &  
omnino vlcerū initia sunt. Turior itaque vsus est  
eorum medicamentorū, quæ re vera anodyna sunt,  
qualia sunt fomēta ex sola aqua tepida, ex decocto  
meliloti, chamæmeli, fœniculi anethi, fœnugræci,  
rosarū, absynthij. Quòd si calor multus cōiunctus  
est, ex decocto psyllij, foliorū mādragoræ, hyoscya-  
mi,

*Oculorum ar-  
dor vehemēs  
pinguia re-  
spuit.*



mi, papaueris, violarum, rosarum, similiter liquor oui, aqua rosarum, muccago seminis cydoniorum, medulla cocti cydonij, vel pomi alicuius cocti in vapore aquæ. Moderata est muccago altheæ, tragacanthæ, gūmi arabici, lac muliebre, sænugræci bene loti prius infusi diem integrum, deinde cocti, vt prima & secunda aqua abiciantur, penidia, alphenic, diatragacanthum frigidum, amyllum, muliebri lacte dissoluuntur, leni edo leuiter, & citra morsum extergendo, creta similiter vti licet. Anodynon est oui liquor cum suo vitello. Aliquando caphurum miscemus: vt in hoc, quod lenit & coquit. ℥. muc-  
caginis sem. psyllij & tragacanthæ extractæ in aqua bismalux ℥. 2. liquorū oui ℥. 3. croci 3. 3. caphuræ Gr. 6. Atque meminisse oportet recentibus muc-  
caginibus & succis vtendum, quia vno atq; altero die acescunt atq; corrumpuntur. Quæ collyria ano-  
dyna dicuntur, ferè opium recipiunt, quale est dia-  
rhodon Nili, quod etiam ingentes dolores lenit, tenues fluxiones, acresq; sistit. ℥. rosarum resectis vnguibus 3. 3. croci 3. 2. gummi arabici 3. 1. spicæ nardi, opij ana 3. 3. cum aqua fit collyrium. Vfus tēpore lacte muliebri, vel liquore oui liq. dissimè diluitur. Anodyna enim liquidissima esse oportet. Arabes hoc collyrium, si ef rosatum vocant, atq; ita cōficiūt. ℥. rosarū resectis vnguibus 3. 15. croci 3. 18. gūmi arabici 3. 19. spicæ, opij an. 3. 2. fiat si ef cū aqua pluuiæ. Habent & si ef alba quibus plurimū vtūtur: quale hoc est in principiis inflātionū & dolorū. ℥. gūmi arabici, tragacanthæ, amyli an. 3. 3. cerusæ lotæ 3. 6. opij 3. 1. opiū ī sapa aut vino dulci tēperatur: deinde reliquis iūgitur in oui albumine.

## AD LIB. IIIL. DE COMP. MEDIC.

In vsu diluitur lacte muliebri. In augmento hoc cōuenit. ℥. sarcocollæ nutritæ in lacte muliebri, aut asinino ʒ. β. amyli, diatrāgacāthi an. ʒ. β. cerusę lotæ ʒ. 6. olibani ʒ. i. β. confice cum aqua pluuiæ.

*Alexandri mirabile in calida ophthalmia & dolore.*

**C**Admix vltæ, lotæ ʒ. 10. cerusæ lotę ʒ. i. scorie ferri vltæ lotæ ʒ. β. gummi arabici, tragacanthæ ana ʒ. 4. olibani, opij ana ʒ. 2. croci ʒ. β. cōfice cum aqua pluuiæ. In declinatione sarcocollæ nutritæ ʒ. 10. croci, spicæ, aloës ana ʒ. i. Terūtur omnia ex muccagine feminis fœnugræci. Linimēti modo adhibentur. Sed quia in ocularibus remediis, sæpē cadmiæ vltæ lotæque, & sarcocollæ nutritæ mentio fit, vtriusq; ratio explicanda est. Cadmia itaq; quæ & Cathinia dicitur, vel cuius loco lapide calaminari vtimur, vi siccandi & intergendi prædita vtitur, & lauatur, hoc modo. In frustula magnitudine grani hordei confingitur, melle optimo conspergitur, cōcluditur fictili crudo, cuius orificium operiendo clauditur, lutatūrque. Sed operculum vno vel pluribus foraminibus peruiū esse oportet, vt fumus exhalet. Vas autē, vbi coctum est, subiecto igne vel in fornace figulari, iam ignita cadmia & vaporibus nigris in albidos commutatis, qui, scilicet, per foramina operculi exeunt, tollimus, & ablato operculo cadmiam vino austero extinguimus, & mortario terimus, siccāmque ad medicamenta reseruamus. Aliter quoque veteres. Cadmia inclusa fictili vase puro igne crematur, deinde lacte asinino extinguitur: secundo ac tertio vritur atq; extinguitur lacte: iam tertio vltā extinctā que

in

*Cadmia  
preparatio.*

in mortario affusa aqua fontis diutissima versatur, purgatur, siccatur, siccata secundo ac tertio in mortarium repetitur, versatur ut prius, & siccatur.

Postremo cum aqua pluuiæ in mortario circumagitur, siccatur, iam omnis qualitatibus expers, ex qua fiat collyrium plane diuinum, ubi dolor sedandus est.

Ulceræ implenda, siccanda hypopia, ubi sistenda est acris fluxio, & lenienda calida lippitudo, ubi pruritus, ardor, vltio, sed peculiariter, ubi detergendum & siccandum.

℥. cadmiæ, ut ante præparatæ ʒ. 2. cerusæ è lacte lotæ sæpis ʒ. 2. ʒ. Cerusa cum cadmia sæpius miscetur, & 15. diebus in mortario ex aqua pluuiæ versatur. Postremo tragacanthæ lotæ & purgatæ ʒ. ʒ. succo fœnugræci per noctem imbuitur, ut multum succum imbibat. Postridie vniuntur omnia reponuntur vase vitreo operto tenui linteo, loco subdiali, & bene puro. In usu dissoluitur oui liquore, vel muliebri lacte. Sarcocolla citra morsum siccatur, coquit, digerit leuiter, amaricat. Trita utraq; maceratur in aqua rosarum tribus diebus tum siccatur, & pluribus diebus in succo rubi maceratur, siccaturq; postremo infunditur in lacte muliebri, siccaturque blandissimum medicamentum fit.

*De repellentibus.*

**R**epellentia duorum sunt generum. Alia leuiter repellunt, quæ conueniunt oculis, eaq; vel leui frigore, vel corroboranti adstrictione reprimunt. *Repellentium genera duo.* Alia verò vehementer adstringunt noxia oculis, quia poros contrahunt, tunicas resiccant, exasperant, dolores creant, visum interturbant, quibus tamen aliquando, ut in procidentia oculi, sed aliis mixtis,

### AD LIB. IIII. DE COMP. MEDIC.

*Repellensia  
leniora.*

vtimur. Leuiter repellunt rosarum succus, flores, folia nardi, spica, crocus, hypocystis, oui candidū, muccago psylij, sumach. cydoniorum, aqua rosarum, plantaginis, & quod ex mororum succo præparatur. Succi mororum rubi quartarium vnum siccetur in sole, subinde agitando: vbi fuerit siccatus, imbue liquore oui, & sine siccari in sole. Postremò consperge lacte muliebri, & fac siccari. Puluisculo vttere soluto liquore oui, vt lenias & reprimas. Repellunt quoque cadmia vitæ, vt prius, & austero vino extincta, deinde trita è puluis, & quæ metallica citra morsum siccant. Deinde hæc, quæ leniunt quoque. ℞. farinæ capitum papaueris & meliloti ana. P. i. pul. rosarū P. ss. panis albissimi ℥. 2. f. decoctio in lacte mixtis pulueribus in fine decoctionis. Deinde transferantur omnia in mortarium, & subigantur cū ouo integro & croci scrupulo. In doloribus oculorum abstinentum à multis linteis, vinculis arctioribus, grauibus sacculis aut cataplasmatis: sed tenuissimis linteolis medicamenta continenda sunt: videndumq; ne remedia, quæ adhibentur, dolorem creent, & priusquam siccantur, commutanda sunt. Et quia in doloribus oculorum multa ferè lachrymatio est, quæ vim medicamentorum diluit, propterea subinde commutanda sunt remedia.

*De vlceribus oculorum.*

**V**lcus in alba tunica cornea, genis, angulis, oculorum à re externa fit, vt stylo, gladio, vel aliter. Præterea ab acri fluxione, cui prudenter occurrendum est, alioqui ne vnà procidat & sequatur cæcitas, periculum est. Hoc vlcus in genere

Genere quidem communem habet curationem cū  
 reliquis vlcerib. Vult enim repurgari, ficcari, im-  
 pleri, & cicatrice claudī. Peculiariter tamen ex na-  
 tura partis clementiora remedia desiderat, multo  
 magis si proprietate individuū acerrimo sensu &  
 purissimo spiritu præditi sūt, quales ferè sunt oculi  
 cœrulei. Declinanda itaque tum quæ exasperando  
 tergent, tum quæ mordicādo siccant & nimia ad-  
 strictione exasperant. Atque hæc vlceri, quæ vlcus  
 est, propriè cōueniunt. Nā & in collyriis & reme-  
 diis ocularib. sæpè mixta inuenias, quæ sunt acia,  
 vt in malignis & nimium sordidis vlceribus, quæ  
 dolorem leniunt: vt in dolentibus, quæ molliūt: vt  
 in callosis, quæ plurimum adstringūt: vt cū ma-  
 gno impetu irruit fluxio in oculos, vel à prolapsu,  
 vnde mixtus est. Quæ omnia vt non statim vlceri  
 conueniant, conueniunt tamen per accidens. Ita- *Collyrium*  
 que influxionis impetu stalticis vocatis, id est, si-  
 stētibus, vtimur, quæ materiā recipiunt frigidā &  
 adstrictoriā, quale hoc est singulariter prædica-  
 tum. ℞. æris vsti, cadmię vstę lotęque an. ʒ. 3. myr-  
 rhæ, opij ana ʒ. 4. acacię, gummi arabici ana ʒ. 7.  
 Ex aqua fingitur collyriū. quod liquore oui dissol-  
 uitur in ipso vigore, quando sordes & maturatio-  
 tum in vlcere, tum in lippitudine apparet. Sed hic  
 animaduertendum, quod sit commune omnibus  
 ocularibus remediis, oculos parum assuetos medi-  
 camentis sæpè irritari, cū primum medicamen-  
 ta adhibentur. Quod si contingit, tepefacto liquo-  
 re oui dolor sedandus est: deinde medicamentum  
 adhibendum donec assuescat oculus. Conuenit &  
 collyrium prius descriptum in præparatione cad-  
 miz,



donec crassius nigrescat, sarcocolla nutrita, pumex  
 vltus & lotus, ostreorum cinis, ossa sepiæ, gemmæ  
 tritæ, puluis absynthij, plantaginis, bardanæ, cly-  
 meni, herbæ scorpioïdis, buglæ, saniculæ, herbæ  
 Paridis. Sed melius erit ex his succum exprimere,  
 subigere in mortario plumbeo, pistillo plumbeo,  
 donec crassities & liuor cōtrahatur: deinde ficcari  
 oportet, & ita vti puluere. Cornua cerui, capræ, vltæ  
 lotæque, antimonium vltum lotumque. Vehemen-  
 tiora sunt æs vltum lotumque, squama æris, vitrio-  
 lum, cuprosa, arrhenicum, sandaracha ærugo, sed  
 his in malignis & plurima forde madentibus vti  
 conueniet. Ex hac materia, concoquentibus, myr-  
 rha, thure, croco, galbano, castoreo, fiunt collyria  
 ferè ex succo fœnugræci. Vtimur quoque saccha-  
 ro cando, penidiis, alphenic. diatragacanth. frigi-  
 do, solutis lacte & liquoribus, qui extergent. Sic  
 enim lenies, extergebis, & vlcus ad carnem com-  
 parabis. Parietaria, anagallis, centaurium minus,  
 absinthium, plantago teruntur in mortario paula-  
 tim affuso lacte: exprimitur succus, qui vt prius  
 versatur in mortario plumbeo ad crassitudinem  
 ficcatur, vt fiat puluis: cō cornu cerui collyrium ex-  
 purgat, incarnat, exterit cicatrices. ℞. cornu cerui  
 vlti loti, thuris, plumbi vbi loti ana ʒ. 2. squamæ  
 æris, vltæ lotæ ʒ. i. opij ʒ. ʒ. gummi arabici ʒ. i.  
 cum aqua pluuiali fiat collyrium.

Sed hic meminisse cōuenit duplicē esse aquā plu-  
 uiā in præparadis metallicis: vna enim hyberna est,  
 & inutilis: altera æstiuæ & tonitruosa, vtilis. Aliud.

℞. sarcocolæ nutritæ in lacte ʒ. 10. pulueris diai-  
 reos simplicis, gummi arabici, tragacathæ ana ʒ. 2.

dd 5

punicis

## AD LIB. IIII. DE COMP. MEDIC.

punicis vsti lotiq; in lacte ʒ. i. ex mucagine fœnugræci fiat collyrium. Atq; hîc meminisse conuenit in vlceribus nimium madentibus puluisculis vten-  
dum esse, in aliis collyria liquoribus dissolui : lac autem conuenire dissoluendis colliriis, vbi est le-  
niendum, & breuiter extergendum : succum verò fœnugræci, vbi detergendum magis. Quòd si co-  
piosius quoq; detergendum, veteres succo fœnu-  
græci tantillum mellis addiderūt. Aliud ℥. pumi-  
cis vsti lotique ʒ. 2. gummi arabici, tragacanth. ana  
ʒ. i. pulueris diatragacanti frigidi ʒ. ss. cum succo  
fœnugræci fiat collyrium. Absterget plurimum vt  
etiam aspredines & albugines tollat. Vrina pueri  
impubis æneo vase diu versatur pauculo melle ad-  
iecto, donec sit crassitudo. Materia siccatur, fit pul-  
uis, ac primum, vt cōsuescat oculus mucagini tra-  
gacanthæ, deinde fœnugræci permiscetur, eritque  
quadrupla muccago. Licebit vti collyrio diuino an-  
tea descripto è cadmia præparata. Adhæc diarho-  
do Nili, deteriso vlcere, regeneranda caro implēdis  
vlceribus oculorum conueniunt terra sigillata, sar-  
cocolla nutrita, thus, cortex thuris, manna aloë lo-  
ta, myrrha, gummi arabicum, tragacantha, metalli-  
ca, quæ citra morsum siccant, & alia scripta cap. de  
sarcoticis, quale hoc. ℥. cort. thuris, myrrhæ, & a-  
loës, sarcocollæ nutritæ ana fiat puluis. Collyrium  
è cornu cerui antea descriptum, & Cleonis pluri-  
mum vsitatum veteribus, quod incarnat & cicatri-  
cem ducit. ℥. spodij loti, plumbi vsti loti ana ʒ. 2.  
batituræ carybis ferraturæ vstæ & lotæ, croci aræ  
ʒ. ss. gummi ʒ. i. confice cum aqua. Vfus tem-  
pore diluitur liquore oui & lacte, aqua infusionis  
tragacanthæ,



# PERIOCHE IIII.

30

tragacanthæ, mucaginis tragacanthæ extractæ in  
 aqua plantaginis. Sief de plumbo incarnans & cō- <sup>Sief de</sup>  
 solidans. ℞. plumbi vsti, antimonij vsti, loti, tuthiæ <sup>plumb.</sup>  
 lotæ, æri vsti gummi tragacanth. ana ʒ. 2. opij Gr.  
 8. cum aqua pluuiæ. Aliud, quod incarnat, repri-  
 mit, vestigia corrigit & lenit. ℞. tuthiæ, cadmiæ  
 præparatum, vt decet, cerusæ, antimonij, olibani  
 ana ʒ. 2. myrrhæ ʒ. 1. sarcocollæ, sanguinis draco- <sup>Collyrium</sup>  
 nis, aloës, opij ana ʒ. 1. β. f. ex aqua Collyrium è <sup>e thure.</sup>  
 thure, quod mollit, lenit, coquit, incarnat. Thuris  
 ʒ. 10. antim. sarcocol. ana ʒ. 5. croci ʒ. 2. ex mucca-  
 gine fœnugræci pleno vlcere cicatrix ducenda est  
 per ea, quæ vocant epulotica medicamenta, quæ  
 citra morsum siccant, qualia inuenias cap. de E-  
 puloticis, & quod sequitur. ℞. antimonij, blattæ  
 bizantiæ ana ʒ. 10. acaciæ ʒ. 3. aloës, sarcocolle nu-  
 tritæ ana ʒ. 1. confice cum succo rubi. Sarcocolla,  
 vt prius nutrita cicatricem ducit.

*Hebes visus.*

**V**isus hebes senio, morbo frigiditate humorû,  
 & spirituum crassitie immodica, tenuitate spi-  
 rituum, inopia vtriusque contrahitur. Sed à senio  
 & inopia spiritus vel humorum difficillimè instau-  
 ratur. In tenuitate spiritus leuiter adstringentibus  
 & refrigerantibus vtendum est. Huius rei manifestû  
 argumentum est, quod interdum & in splendore So-  
 lis statim disperso spiritu & quasi euanescente pa-  
 rum acutè vident. Noctè verò iam cogente & leui-  
 ter refrigerante, spiritus acutissimè cernunt. Id  
 quod videre licet in felibus, leonibus, pardalibus,  
 & pleròq; genere animalium, quibus veluti igne  
 micant oculi in tenebris. Cōtra crassitiem humo-  
 rum

### DA LIB. III. DE COMP. MEDIC.

rum & spirituum, detergētibus & incidentibus leuiterque corroborantibus vtēdum est, oxydorca vocant Græci medicamenta, quæ hebetudini visus citra manifestam occasionem ortæ medētur quorum magna pars è materia constat, quam contra crassitiē facere diximus. Quale est Antonij Musæ. Fellis perdicis syluestris partē vnā, succi parietarię succi centaurij minoris, mellis optimi ana. Aliud.

Fel gallinę veteris succo cętaurij pari miscetur, quibus mel septupla ratione adiicitur. Aliud. Scribonij Larg. Succi radice fœniculi  $\mathfrak{z}$ . 2. pari melli commiscantur, reponuntur çrea pyxide. Alij parē modum succi chelidonię permiscēt. Obscuritatē quālibet persanare scribit Gal. gruis fellis  $\mathfrak{z}$ . 2. succi marrubij & mellis optimi ana  $\mathfrak{z}$ . 2. Aliud. Fellis tauri, succi fœniculi an.  $\mathfrak{z}$ . 1. mell. opti.  $\mathfrak{z}$ . 2. Aliud. Mellis scyllitici: succi marrubij an.  $\mathfrak{z}$ . 2. succi granatorū dulciū  $\mathfrak{z}$ . 3. fellis accipitris  $\mathfrak{z}$ . 1. fortiora sunt collyria antea descripta vt prædicta extergēte, quę metallica extergentia recipiunt. Atque hæcenus præscripta sunt, in crassis vaporibus & humorib. conuenire possunt. Cōueniunt etiā suffusionibus & maculis oculorum ex detergēte, digerente, leuiter corroborante materia. Quod sequitur maximē probatum est veteribus, quod maximē iuuat, scriptores, pictores, lectores, aurifices, & quicunq; cōtenta oculorum acie plurimū laborant. Succus exprimitur ex granis punici acidi, vt Aëtius, dulcis vt Octauius. Is succus æneo vase reponitur, quod sit opertum tenui linteo, quodq; exponatur Soli, donec crassescat succus. Succo iam crasso par modus mellis additur, miscenturque, & fictili reponuntur.

nūtur. Illinitur medicamēto oculus hora somni.

*Ad albugines.*

**I**N albuginibus atq; omninò morbis oculi, vbi medicamentorum vim subire profundius velimus, balnea frequentia imperamus: alioqui iubemus, vt vapor humidus ex aqua primùm tepida excipiatur oculis deinde vapor è materia, quæ extergeat: postea medicamenta leniter diūque affricando adhibemus. In albuginibus sapa penum cū melle distillatum, vel solutum cum melle liquido vel vt sit fortius, cum oxymelite scyllitico singulare remedium est. Succī anagallidis, parietariæ, chelidonij, amygdalarum amararum cum melle, ac breuiter earum rerum, quæ detergent. Addunt succum papaueris rubri: & quæ gersa serpentina vocatur, è radicibus dracuntij descripta cap. de sarcoticis, soluta lacte equino plurimùm iuuare potest. Aliud. Fel hirc. aut cuiusuis, alterius animatis exsiccat in vase æneo adiecto syrupo de artemisia, ruta, calamento: vbi inde puluis factus est, succus marrubij, anagallidis & similium miscetur, & quod inde molliter applicatur oculis. Aliud. Ossis sepia ʒ. 2. salis ammoniaci, cerusæ ana ʒ. 1. ammoniaci, sagapeni ana ʒ. 2. Fiat puluis. Aliud. Rad. dracuntij, aristolochiæ, chelidonij ana ʒ. ʒ. ʒ. concidatur in taleolas, reponatur in vase æneo. Superfundatur vrina pueri impuberis: exponatur Soli, siccentur, terantur, tritis adde salis ammoniaci ʒ. 2. mellis torrefacti tantundem. Fiat puluis. Ammoniacum, saluia matris subigitur, & illinitur albuginibus infatium. Mirum est quod scribūt, butyrum per se illitū mirabiliter cōferre in cōtumacibus. Metallica  
mi scemus

*Oculorū albugini accom-  
modatum re-  
medium.*

# AD LIB. IIII. DE COMP. MEDIC.

miscemus vi extergente prædita, & collyria quæ inde comparantur. Ærugo crematur, diu teritur ex aqua plantaginis. Capitur ℥. β. cui additur cerusæ lotæ in lacte ℥. i. gersæ serpentariæ ℥. 2. trita omnia cum muccagine fœnugræci illinuntur.

## Ad Hyposphagmata.

**I**cto oculo refudat sanguis tenuis, atque effunditur in oculum, unde rubor & aliquando dolor & inflammatio. Taifati vocant Arabes. In dolore & inflammatione recurrendum ad remedia prius descripta. Quod autem attinet ad remedia propria hyposphagmatis, initio vtendum iis, quæ reprimant & leniant: deinde iis, quæ digerant: postremò quæ digerant & corroborent. Primum itaque liquorem oui illinito, & lanam vel linteolum molle in eodem inculcatum adhibeto. Lac quoque muliebre similiter adhibetur. Veteres magnam vim in sanguinibus posuerunt. Alij sanguinem hirundinis primo loco statuerunt, deinde palumbæ, vel turturis: tum columbæ, sed masculi, prætulerunt. Tenellæ pennæ extrahuntur plenæ suo sanguine, & molliter oculis sanguis infunditur. Gale. 10. de simplicibus medicamentis parui facit eiusmodi cōtrouersiam de sanguinibus, vtiturque succo fœnugræci post initia cum collyriis primum Democritatis è myrrha, diasmyrno; deinde quæ in multo thure fiunt: postremò quæ è croco. Quæ collyria scripta inuenias septimo Aëtij, & Pauli, & quarto *ἡ ῥόσας*. Rosas. vel rosarum magna aqua rosarum & vino incoques, & tepida oculis admoquebis. nam & tepefactum oui liquorem & reliqua remedia tepida adhibemus. Alij bolum armenâ, terram sigillatam;

*Sanguinis  
magna vis  
ad ὑποσφαγ  
ματα.*

figillatam, argillam ex liquore oui dissoluunt & adhibent. Post initia lini semen teritur cum butyro: totum vehementer exprimitur, & pingue expressum illinitur. Mirum est, quod scribit Archigenes. Hyssopi coma trita, & linteo inuoluta, deinde inculcata in aqua calida, si inde foueatur oculus, sanguinem diffusum ita extrahit, ut si lintheum exprimitur, sanguinem reddat. Arabes plurimum utuntur arrhenio bene loto, sublimato rursus loto ex aqua coriandri, præsertim ubi iam hyposphagma liuorem duxit. Leue collyrium digerens. ℥. thuris 3. 3. diligentissime conteruntur: deinde in collyrium uniuntur cum aqua sequenti. Salis ammoniaci, salis gemmæ, ana 3. i. liquefcat in aqua pluuiæ, qua thus uniatur. In usu dissoluitur aqua, vel succo coriandri. Fortius est quod sequitur. ℥. thuris, myrrhæ, croci, ammoniaci ana 3. i. sublimati bene loti cum succo vel aqua coriandri 3. ss. cum eodem succo vel aqua fiat collyrium, quod adhibeatur cum eodem succo, vel aqua. Fortius. Arrhenici bene loti sublimati prius, deinde rursus bene loti & confricari cum aqua cori. 3. 2. sarcocollæ, piperis, ammoniaci, lapidis lazuli an. 3. i. cum aqua, in qua 3. ss. salis ammon. dissoluta sit fiat collyrium. Fiunt foris in declinatione ex decocto absynthij, meliloti, chamæmeli, fœniculi, hyssopi, & remedia adhibentur, quæ scripta in albugine.

*Ad oedemata oculorum.*

**A** Pituita, quæ in oculis diffluit, mollis, laxis & indolens tumor circa oculos nascitur, genas ferè occupans, qui bene purgato corpore, his remediis dissoluitur. Primum fouetur locus ex aqua tepida cum spongia molli. Faba, lēs, cicer, in aqua cum tantillo

*Archigenis  
remedium ad  
cruentatos o-  
culos.*

## AD LIB. V. DE COMP. MEDIC.

tantillo aceti, horum vnum, vel omnia percoquuntur, deinde trita pressaque cribro culinario trāscollatur, mel adiicitur, cataplasmat. modo adhibetur. Postea verò, vbi magis discutiendum est, hyssopus & pars radicis figilli beatæ Mariæ cū dictis leguminib. coquitur alioqui creta oxycrato vel lixiuio dissoluitur, aliquid mellis additur, & ita illinitur.



## AD LIBRVM QVINTVM,

GALENI DE COMPOSI-

TIONE PHARMACORVM

ἡ ῥέσις

PERIOCHE V.

*De Hypopis.*



ψίσις per ω in secunda syllaba & i in penultima, suggillatio est, quæ ferè fit sub oculis, genere ecchymomatum, id est suggillationum comprehensum. ὑπόψις verò per o & υ in penultima, ocularis morbus, cum pus fufum cornea includitur. Differt hypopiū, quod est sugillatū, ab hyposphagmate quia hoc in oculis, hypopium verò in genis & malis. Conueniunt autem remediis. Nam vbi graue malū est, phlebotomia, clysteribus, purgationibus, apophlegmatismis, sed leuioribus, cōmuniter vtendū est. Quod ad topica attinet, primū quidem leui-

ter

ter repellētibus, mixtis modicè digēētibus, multò magis in hyposphagmate, vtēdum est. Initiò ergò caseo recēti, diarhodo Nili soluto in decocto meliloti, aliis quoque similiter repellētibus & leuiter digerentibus vtendum est: ac breuiter, quæ in hyposphagmate descripta sunt circa initia non inueteratis hypodiis conueniunt. Recētiore rosaceo oui candido, insperso puluere myrtilorum vtuntur: deinde speciebus sanguinis, quæ descriptæ sunt in hyposphagmate, farinis fabarum hordei, coctis in oxymelite. Eādem farinæ saluia subactæ tergēt, leniunt, discutiūt. Forus ex aqua tepida, ex decocto chamæmeli, meliloti, althææ ac tandē fœnugræci: oui luteū cū melle, faba vino macerata, læuigata. Item quod sequitur. Lithargyri, cerusæ ana ℥.i. cū melle subigatur. Nutriuntur primū rosaceo, deinde chamæmelino. Dissolutum vnguentum rosatum tantillo syrupi de absynthio mixtum iam nigricantibus hypopiis, nuxraucida & iam oleosa cum melle subigitur, & supinè decumbente ægro ne excidat, hypopio tribus horis adhibetur, quæ cū excidit, alia reponitur. Pānus inculcatus oleo de kerua, oleo de nucibus veteri, de ricino & similibus, panis diu mansus & saluā subactus, cumini nodulo includitur, & feruenti aqua salsa immergitur, & ita imponitur. Serpentis exuuium melle vel aqua marina subigitur, & imponitur. In remediis præcipua sunt, iam plurimū nigricāte hypopio, raphanus, radix bryoniæ, dracunculi, sigilli Mariæ quæ primū cum butyro, deinde per se adhibentur. Quòd si inde ardor & mordicatio excitatur, tepida locus foueri debet. Si locus vehemēter in-

## AD LIB. V. DE COMP. MEDIC.

tumuit, fotu tepidæ ex ſpongia plurimùm vtendū  
eſt, deinde inungendum anethinum. In inflamma-  
tione diu foueto calida, & farinas coctas fabæ &  
leguminum ſcriptorum in hypophagmate colato-  
rum, vt priùs, cribro culinario cū melle imposito.  
Quòd ſi fiſſura quædam coniuncta eſt, ad remedia  
glutinatoria, qua parte vulnus eſt, decurrendum.

### De Aegylope.

*Aegilops na-  
ſcens valida  
repellentia  
poſtulat.*

**A** Eglylops paruus eſt abſceſſus inter os naſi &  
maiores angulum oculi, periculofus, pro-  
pterea quòd excarnis locus eſt, & vicinus oculo.  
Primùm itaque Aegylope naſcente repellentibus  
validè vtendum eſt, factò vero Aegylope, diaphore-  
ticis primùm citra morſum, deinde fortioribus v-  
tendum eſt, adhibita cura, ne quid diffluat in ocu-  
lum. Ac breuiter inflammationum modo curan-  
dus eſt. Propterea neque phlebotomia prætermi-  
tenda eſt è cephalica, neque purgatio, ſi fuerit opus.  
Cucurbitulæ quoq; & maſticatoria vſui ſunt. Vbi  
verò ſuppuratio facta eſt, ampliandum vulnus, vt  
pus effluat, & non corrumpat. Os aperto abſceſſu  
purgandum mellicrato, melle roſato, & aliis id ge-  
nus. Purgatum vlcus ablueridum è vino, implen-  
dum ſarcoticis, ariſtolochia, manna, thure, aloë,  
myrrha, reſina, ſarcocolla, chamædri, ruta, & aliis  
quæ ſcripta inuenies cap. de ſarcoticis. Ex quo epu-  
lotico cicatrix ducenda eſt. In Aegylope difficultas  
ſpirandi, inde læſo offe, ſed iniuria leuis tantùm  
aſperato, maior verò iam carioſo, maxima, vbi  
iam ad colatorium os & malas corruptelas trãſiit,  
vbi fiſtula ducta eſt, & mucoſa caro atque cor-  
rupta. Hic ergò veterum & recentiorum cõſilium  
eſt.



est. Diuidendus angulus in tri ngulum, vt apex trianguli versus radicē nasi: litera verò & basis ad oculum vergant. Quòd si caro corrupta, aut callus prohibet, cathæreticis vtendū erit, quæ scripta inuenies cap. de pyroticis. Ampliarum vulnus primū implendum vel spōgia. vel medulla sambuci intorta, ne scilicet coalescat. Quòd si tantū asperatū os est, rasura sufficiet: si cariosum, tenui & retuso cauterio vtēdum est: quod cum sit, munien-  
 dus oculus spongia, quæ sit imbuta aqua frigida. Sed priusquā cauterium imprimatur, videndū quòd perueniat ossis corruptela. Aliquando enim fursum ad colatoria vergit, nonnunquam ad malas. Atque quocunq; vergat, cultello aperiendus locus est, vt fiat via cauterio. Iam repurgato osse, ægyptiaco mixto cū melle rosato, & syrupo de absyn<sup>8</sup>thio vtendum est: quod medicamentum etiam os purgare potest, si quidem leuis est iniuria. Veteres cephalicis vtuntur scriptis cap. de sarcoticis. Archigenes inurebat plumbo liquefacto per infundibulum misso. Recentiores aquis Alchimistarum fortibus vtuntur. Sed primū permiscent lacti, vel muccagini althææ, lini, fœnugræci, vel tragacanthæ extractæ in aqua vitæ: postea solis aquis os attingunt. Vtuntur purgantibus & incarnantibus ex succo agrimonie, apij, absynthij, rutæ, melle rosato, syrupo de absynthio, aloë, mirrha, sarcocolla: vsto alumine, antimonio, mixtis in putri carne pulueribus ægyptiaci, mercurij cū alumine vsto. Superponunt emplastrum diacalcitheos, quod sit recens factum & repellens: partē per ambitum fouent vino rubro decoctionis ros. chamæmeli: superponuntq;

AD LIB. V. DE COMP. MEDIC.

linthea inculcata in dicto vino post adhibitū em-  
plastrum diacalciteos. Parant & mundificatium  
quod vocant ex farina fabarum & hordei cocta, in  
prædictis succis addita, i terebinthina lota, in vino  
albo. Purgato vlcere veteres probāt alumē vltum  
ex terebinthina, vitri subtilissimè triti puluisculū,  
rutam pistam cum vino granatorum. Discutiendo  
verò nucem rancidam conquassatam, & appositā,  
chamæm. fol. vel māsā, vel subacta cū saluia salsa.

*De ionthis seu varis.*

**I** Onthi, q̄ sint similes *ſp̄s*, id eſt, ſumo, & faciem conſpurcent, appellati. Vari à Latinis tubercula parua, dura, in cute faciei à crasso ſucco orra. Remedijs egent, & Galenus ſcribit, mollientibus, quia dura: diſcutientibus, quia alienam materiam in ſe continent. Veteres Medici incidentia & tergentia videntur miſcuiffe. Fricabis ergo mixtura pari mellis & aceti, amygdalis amaris aceto piſtis, lithargyro ſubtiliſſimè trito, concorporato terebinthinæ liquidæ, & butyro. Poteris intermiſcere aliquid fellis caprini, vel ſimilis. Lilij radix vel panis porcini melle ſubigitur, lapis calaminaris ſubtiliſſimè teritur, maceratur in aceto, & ſiccatur, quadruplo melli permiscetur. Itē. ℥. ſaponis ʒ. 2. olei amygdalarum amararum ʒ. 1. aceti ʒ. ʒ. offiſſe piæ triti & puluerati ʒ. 2. Pomata oleo ouorum vel de tritico diſſoluitur, aceto albo addito, & illinitur. Gummi-arabicum album, ſal torrefactum, vtrunq̄ ſubtiliſſimè tritū acri aceto diluitur. In calloſis & inueteratis varis ammoniacū, ſapo, galbanum, opopanax, & alia id genus aceto diſſoluta p̄dictis miſcētur. Qui ſi contumaciores ſint, ali-

quid metallicorum acrium detergentium intermiscetur, quemadmodum & in tumoribus ficosis, ulcerosis, subrubris, rotundis, dolentibus. Vnde principium impetiginis, métagræ aut lichenis agrestis quæ materiam habeant crassam, permixtam liquoribus acribus. Nam hæc ubi transierint impetiginem, raro nisi acribus permixtis & medicamentis ecdoriis, idest, excoriantibus curantur. Primum tamen leuioribus utemur: deinde contumaciore malo trāsibis ad ecdoria, de quib. in materia imperiginum. Hæc sunt acetositas citri, aqua vitis, vlmī inclusa in folliculis, aqua fabacearum, florum fabæ, centaurij minoris, parietariæ, enulæ, gentianæ, ranunculi, ari, bryoniæ, anagallidis, & his fortiores aquæ sublimatæ & vocatæ fortes. Oleum ex eadē materia, de tritico, de sulphure, de vitriolo, de ouis de fraxino. *Exdōgia* sunt metallica acria, æris, squama, lapis calaminaris, sulphur, ærugo, arrhenicum. Diu teruntur ex aceto acerrimo. Pastilli fiunt, qui ceratis liquidis permiscentur. Cætera fiunt ex cera fulua, vel, ut fortiora, viridi oleo cōuenienti, & ut hæreant magis, terebinthina mixta, superponitur vesica bubula, aut membrana suilla, vel similis. Medicamentum tota nocte finitur, vel ad horas multas, lacte, sed lactis, aquis memoratis tepidis facies ablui: repetuntur medicamenta, donec exarescant pustulæ & vlcera. In medicamētis leuioribus sanguis leporinus illitus, salua præmāso sale, ouum integrum triduo maceratur in mixtura sulphuris & aceti post triduum abiecta testa: ouum ex ea mixtura subigitur & illinitur. Gummi cerarum aceto dissoluitur & illinitur, radix enulæ &

## AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

lapathi acuti coquuntur in aceto ad putrilaginē: tepido aceto, permixto melle: affricatur locus: deinde radices pistæ cum axungia viperarum illinuntur. Psoricum Mesuæi saliuæ ieiuni hominis, & liquido melle dissoluitur. Fraxinus viridis crematur saliuæ excipitur, quam extrema reddunt. Sublimatum & cinabriū aliq; ecdoria in mucagine gummi arabici, vel tragacanthæ, vel mucagine scænegræci illinuntur. Sed in vsu ἐνδορῶν extremæ partes impetiginis, & quæ sanæ vicinæ sunt, medicamento repellente, & quod inflammationem prohibeat, muniendæ sunt. Cinabrium, thus, massiche, æqualiter miscentur cum aceto. Fiūt pastilli, vnde fumus excitat<sup>r</sup> loco impetiginoso excipiendus munitis oculis, & ore, & naribus. In his omnib. meminisse oportet, priusquā adhibeātur, habendam esse rationē totius corporis, vt, scilicet, aliquoties repurgetur, atq; medicamēta, vt facilius subeāt, malaxata impetiginosis partibus adhibeantur. Malaxātur autem decocto maluæ, bismaluæ & similiū.

### *De dentium affectibus.*

**D**entes viris ferè triginta duo: mulieribus, viginti octo. In vtroque dentium ordine quatuor acuti & lati, vt prehensum cibum solidum incidant, vnde τομείς & τόμαιοι, iidem γελασίνοι, quòd in risu sese maximè proferant. Inter quos duo medij & præcipui columelares exoriuntur ferè primi septimo mense, quanquam aliis tardiùs. Hos ad latera canini duo sequuntur: acuti quidē sed non lati ac potius in cuspidem acuti. Configunt dura vi maiore, & diuidunt duo numero in vtroque ordine. Ad decimum ferè mensem, aut nonum.

nonum enascuntur. Sequuntur maxillares plani firmis radicibus defixi, in quibus, qui genuini vocantur & postremi erumpunt, tardissime apparēt, vix anno vigesimo, vt Aristoteles voluit, aut post generationis profusionem, vt Auicēna. Varro anno ferē septimo. Reliqui maxillares ante secundum annū & secundo anno producantur. Primores vulgus anteriores & lacteos appellat : caninos verō oculares: maxillares parum deflexa voce, maxillarios. Crescunt dentes, quia nutriuntur, & assiduo teruntur manfu. Excidūt omnes ætate, sed postremi maxillares nervos substratos habent à tertia cōiugatione, qui affecti imaginem præferunt laborantis dentis, quomodo & gingiæ. Dentes autē in propria substantia & sentire & dolere contra multorū sententiā affirmat Gal. 16. de vsu partium, & 5. *ὑπὸ τῶν δοντῶν*. Historiam dentium scribit Aristoteles 4. cap. & 8. lib. de gener. animalium : cap. 1. lib. 3. de Partibus animalium: cap. 1. 2. 3. 4. lib. 2. de Historia animalium: Gal. vndecimo de vsu partium. Plinius cap. 37. lib. 11. Celsus, cap. 1. lib. 8.

Sunt autem affectus dentium cōmunes reliquis ossibus, qui exasperantur, roduntur, perforantur, cariem ducunt & rubiginē, nonnunquam quoq; ab affectione, quæ sit similis inflammationi, liuentq; omnia à saniosa acri, & virulēta materia. Proprius affectus dentium, neq; communis reliquis ossibus, dolor est. Itaque in corruptela dentium tria genera sunt remediorum. Nam dens corruptus & vitiosus ferro extrahitur, vel medicamenti acribus, sicatur, tabescit, vt deinde sponte sua excidat. Tertium remediū; vt quod est incolume; relinquatur.

*Dentium corruptela tria instituantur genera remediorum.*

## AD LIB. V. DE COMP. MEDIC.

Instrumentum quo dens extrahitur, *ἰσχυρὸς* à Græcis Medicis appellatur, forceps (vt dicat quispian) dentarius. Sed de extrahendo dēte non satis cōuenit inter veteres Medicos: quamquam magna pars vitiosum & corruptum dentem extirpandum credidit. Erasistratus non temerè extirpandum putat, eiúsq; rei testimonium adducit, quod apud Belgas in templo Apollinis *ἰσχυρὸς*, forceps dentarius, plumbeus suspenderetur, quo significaretur nō esse tollendū dentem, nisi vacillet, vt plumbeo forcipe excludi possit, id est, nulla vi: qui si qua parte cariosus fuerit & vitiosus, vitium scalpro atteratur relinquatur quod est sanum. Ac re vera nō temerè euellendus dens est, sed si corruptus, totus tabidus vacillās, si nerui subiecti inflammatio, à qua periculum immineat. Sic enim excluso dēte liberatus neruus iā nō apprimitur, sed transpirat, & remedia cōuenientia admittit. In corruptela videndū quanta ea sit. Aliquādo enim superficialis est, aut extremae parti incedit, quomodo in ossibus asperis & cariosis nō os totum excindimus, sed aspredinem & cariē scalpro deradimus. Ita in dente aut pars quædam deceditur lima, radice incolumi. In medicamentis autē, quæ hæc faciunt, exsiccant & tabefaciunt, acria sunt omnia, lac tithymali, exuuium serpētis.

Gummi hederæ vulgò cognitū est remedium, quod religione quadam colligitur post medium, Augustum, & intra idus Septembris, eoq; vtitur ad dolores dentium. Exuuium verò serpētis remedium est memoratū ab Antiquis. Galenus vndecimo de simplicibus decocto eius vtitur cōtra dolores. Archigenes cōburit, miscet oleo & melli, illinit ægro denti,

*Dens non temere euellendus.*

*Gummi hederæ tritum ad dentium dolores remedium.*

dēti, munitis cera, vel re simili dētibus vicinis. Idē quoq; non vīsum denti admouet, vt excidat, pyrethrum, aut radicē cucumeris agrestis in aceto acerrimo triduo maceratam teres. Indes purgato denti. Id ad tres aut quatuor dies reperes, vt dens excidat.

Adeps ranæ viridis dentē depellit. Licet quoq; vti cauteriis per canaliculū denti impositis: atque cauteria modò è ferro, modò è testa nucis, radice gentianæ, & similibus cōparantur. Sunt, qui oleū calens, vel aquas fortes denti immittāt, vt excidat.

*Contra vermes.*

**V**ermes aiunt subnasci dētibus & hos arrodere, à quibus dolor non ita fortis, pruriginosus, nulla aut pauca saluatio. Hi amaris rebus enecantur, decocto centaurij, colocynthidos, pilulis cōmunibus aloē, myrrha, semine cæpæ, porri, ceruino cornu, puluere cōtra vermes & aliis id genus. Quod autem vulgus sibi persuadet, & ab antiquis Medicis scriptum est de suffumigio è semine hyoscyami, videtur fabulosum. Nam inde aiunt manifestè vermes excidere. Re vera incēso semine euolant tanquam vermiculi, etiam si non attingat fumus vermiculosum dentem. In doloribus dentiū remedia multa sunt. Phlebotomia, vbi inflātionis suspicio, præsertim in neruo, purgatio totius corporis. In vitio humorū clysteres acres, cucurbitulæ in ceruice & scapulis, extremarum partiū frictiones, errhina, masticatoria, & quæ viam fluxioni intercipiūt, anacollemata, id est frōtalia, forus malarū & faciei, periapta, quæ vel è collo suspenduntur, vel alligantur carpo, Topica deniq; denti adhibita. Horum materia ferè incidens, digerēs, calefa-

## AD LIB. V. DE COMP. MEDIC.

ciēs, quia ferè à crassis humoribus & flatib. dolor is excitatur, mixtis aliquando adstringētibus, rosis, galla, malicorio & similibus. Ac ferè collutiones fiunt materia in aceto cocta. Itaque origanū, hyssopum, satureiam, calamenthū, nasturciū, maioranam, pulegiū, thymū, saluiā. adhæc pyrethrum, qui pes Alexandrinus dicitur, galangam, piper, & alia id genus aceto coques, ac inde collues, vel fumū ore excipies mixtis circa initia rosis, malicorio, balau-  
stis, vbi nō videbitur caput nimis redūdare excre-  
mētis. Post collutionem hiāti ore finat æger pitui-  
tam defluere. Hipp. 7. Epid. castoreo, pipere cōco-  
ctis vino, diūque contentis ore dolores dentiū &  
gingiuarum coniugis Aspasij liberat. Mentastrum  
cum radice euulsum, & in peluim datū, cōspersaq;  
aqua calida fumum reddit, qui obuoluto vestibus  
ægro exceptus ore, dolorē mirabiliter sedat, præser-  
tim si æger in lecto bene coopertus quiescat, &  
moueatur sudor. Dioscorides radici althæe vel hyf-  
sopo coctis in aceto, vt inde fiat collutio, magnam  
vim tribuit in dolorib. dentiū. Ranę virides in aqua  
& aceto coctæ simile ius reddunt. Acetū syllicitū  
colluitur. Dēs caninus vltus tritus coquitur in ace-  
to ad collusionē. Alium tritū respōdenti carpo alli-  
gatur. Ranunculi similiter folia alligātur, sed exul-  
cerantur. In dentiētibus pueris lac caninū gingiuis  
abluitur, cremor lactis, butyrum recens, subactum  
ex aqua violarū. Cerebellum leporis physicum est  
appēsū pueris, cornu veteris cochleæ, vbi dolor  
à calore ortus est, aqua rosarū cum caphura collui-  
tur. Decoctum papaueris, vel radiceis mandragoræ  
& hyoscyami, solani, pilulę de cinoglossa, quæ con-  
tra



tra omnes morbos datur, leuiter solutę butyro induntur dēti. Materia anacolle matū. errhinorū, masticatoriorū prius descripta, similiter sacculorū, cataplasmatū & fomentorū in materia oculorū.

*Ad dentes mobiles.*

**S**enibus consumptis dentium stabulis, ictu cōcussis dentibus, neruo, qui dentes firmat, emolito, dens mobilis vacillat. In senibus collutio ex adstringētibus coctis austerio vino. Eadē collutio ictu cōcussis. Sed in neruo, qui multa pituita mollior ac infirmior est, omnibus modis vacuanda pituita est pharmaco purgāte, errhinis, masticatoriis. Deinde ad collutiones siccantes & adstringentes veniendū, alioqui adstringentia excepta melle rosato, syrupo myrtillorum, conserua rosarum, cornorum & similium adhibentur denti. Acetum syllicitum confirmat dentes, & constringit gingiuas, lac asininū similiter, vlmi cortex & ramuli in vino cocti, vt inde colluas. Materia adstringētium sæpius descripta est, describeturque in stomachicis.

*Ad corrosos dentes.*

**M**ateria vacuanda medicamento purgante, quod vel bilem flauam, vel atram, vel pituitam salſam purget. Eiusmodi vitium aliquando nascitur communi vitio totius corporis: aliquando assidua fluxione è cerebro: nonnunquam hepatis aut potius lienis vitio. In remediis localibus consensus est Græcorum & Arabum, nigella Romana torrefit, teritur ex aceto acri, dēti imponitur. zinziber, radix capparis, angelicę vel sylphij, tormētillę vel lapathi acuti in aceto coquitur, acetū colluitur cocta radix adhibetur dēti. Benzoinum, opopanax soluta

## AD LIB. V. DE COMP. MEDIC.

soluta oxymelite adhibentur denti. Sal ieiuno sub lingua liquatus & retentus ore dentem prohibet à putredine & erosione. Sal cum alumine vritur, extinguitur aceto, acetum colluitur, materia denti applicatur.

*Ad dentes malè coloratos.*

**Q**UÆ dentes præseruant, sunt è materia eorum quæ siccant & abstergent: vnde fiunt dentifricia, sal torrefactum cum melle, puluis parietariæ, amygdalæ amaræ, cornu cerui, margaritarum puluis, rasura eboris & coralli pulu. gersa. serpentaria, iris florentiæ, marmor tritum, pumex vstus, os sepia, lana succida colligata linteolo cum tertia parte salis. Vritur cinis capitis vulpini & leporini, quibus pulueribus aromatica miscentur, fantala, rosæ, cinamomum. Lignum aloës & similia arida dentibus affricentur, cōcorporentur melle rosato, vel anthosato. Materia vino decoquitur ad ablutiones & collutiones dentium. Sed & ex materia quæ ad collutiones doloris dentium coquitur, remedia parantur, præsertim quæ aromatica sit. Repurgatur dens virga rosmarini vel lentisci. Contrà verò corrumpunt dentes, quæ nimium calida, nimium frigida, sed præsertim, vbi deinceps & interiecta pauca mora nunc calidis, statim frigidis attinguntur dentes. Adhæc pingua, acerba, dulcia, viscida, frequens vomitus, dura, lactis multus vsus, magni pisces & pingues, raphanus, porrum, brassica.

A D



# AD LIBRVM SEXTVM, GALENI DE COMPOS-

TIONE PHARMACORVM

ἡ τὸ πρῶτον.

## PERIOCHE VI.

*De oris affectibus.*

**I**nfiammatio oris, vt affectus indicat, post habitam rationem totius corporis initio eget repellentibus medicamentis quale est mulsa, in qua rosæ coherint. Ac mulsa melior fuerit comparata è rosaceo melle aut mixtura aquæ & conferva rosarum. In incrementis & vigore miscenda, quæ concoquant, ficus, vix passæ, myrrha, crocus. Postea quæ discutiunt, sulphur viuû, nitrum, sal ammoniacû, & quæ eius sût virtutis. Ex natura partis repellentia & digerentia leuiora sunt, quia cutis oris reliqua cute corporis melior & rarior est. Deinde in ea materia seligi debet, quæ nihil graue oleat, aut sapiat, quæq; nihil mortiferum habeat. Præter hæc, ab iis omnib. metus est, non solû propter os, sed propter subiectos pulmones & ventriculû, ad quos ab ore patēs via est. Alia quoque ratio ex natura corporû quia pueris, mulieribus, & omninò molliorib. corporibus leuius medicamentum comparandû. Propterea Gal. diacaryo simplici in his vtitur, sed sine adstringentibus

# AD LIB. VI. DE COMP. MEDIC.

adstringētibus pulueribus, acribus & aliis. Sed hoc quoq; considerandum in mixtura mellis. Medicus enim aliquid cōcedit saporī & ori: deinde in acri & tenui fluxione min<sup>9</sup> intermiscet mellis, ne, scilicet mel fluxionem attenuet, & propterea acriore reddat. Diacaryon medicamentū ex succo primū & melle cocto Gal. cōficit. Sit autē modus mellis subduplus, subquintuplus. Nam iis, qui dulcibus gaudent, & ubi crassa materia est, plus mellis, in cōtraria cōditione minus miscendum est. Propterea miran-

*Diacaryon  
Pauli.*

dum non est q<sup>d</sup> aliter Paulus, Aëtius, Alexandrinus, Nicolaus diacaryon conficiunt. Paul. Succī corticum exteriorū nucis expressis Iulio mense ante maturitatē nucum heminas uinq; mellis heminam: coque ad dimidium: deinde adde myrrhæ 3. 2. croci, aluminis an. 3. 1. in declinatione nitri, sulphuris ana 3. 1. pro hemina succi 3. 10. accipies: pro hemina mellis 3. 13. cum dimidia, quod magis conuenit in crassa materia. Succī percollati heminam vnam, mellis heminā vnam, glycyrrizæ 3. 1. coques primū glycyrrizā cum succo, deinde mel adicies.

*Diacaryon  
Alexandrini.*

Alexand. Succī lb. 6. mellis lb. 1. β. coque ad spissitudinē in vase stāneo duplici. Coctis adde myrrhæ 3. 3. croci, omphacij ana 3. 2. aluminis scissilis 3. 1. Illinitur medicamentum cynanchicis & faucibus exulceratis, vel oxymelite colluitur, aut prædicta

*Diacaryon  
Nicolai.*

mulsa, in qua rosæ præcoxerint. Nicol. Succī lb. 4. bulliāt vna ebullitione. Adde tunc mellis lb. 2. coque ad spissitudinē. Tum adde initio pul. rosarum, balaustiorū, aluminis an. 3. 1. in incremētis & vigore glycyrrizæ 3. β. croci, myrrhæ ana 3. 1. In declinatione, boracis, nitri, salis ammoniaci ana 3. β.

AD



AD LIBRVM SEPT.  
GALENI DE COMPOS-  
TIONE PHARMACORVM

ⲛⲓ ⲧⲟⲡⲓⲥ

PERIOCHE VII.

*Diamarum.*

**M**Ororum duo genera, alterum celsi, domesticum ferè & esculentum: alterum bati, id est, rubi. Ex utroque diamorum fit. Sed quod ex succo mororum rubi fit, vocatur diabatinon. Initio inflammationum oris solo succo uti licet, sed ex rubentibus, necdum maturis exprimi debet. Nunc aliquid syrupi myrtillorum, vel rosarum siccarum succo misceri potest. Ad usum verò, ut feruetur succus, melle concoquitur. Efficacius fuerit, si vel myrthinum, vel rosatum loco mellis communis misceas. Parari potest cum saccharo rosato: atque succi ad mel quadrupla, quintupla, sextupla, proportio est, præsertim ubi per multos menses seruandum non est. Succus seorsum coquitur: deinde mel, aut saccharum adiicitur. Coquitur in vase æneo stannato ad syrupi crassitiem. Octavius in diamoro bati, batina mora collecta triduum asseruat, priusquam exprimat succum. Initio, ut magis adstringat medicamen

*Diabatinon.*

## AD LIB. VII. DE COMP. MEDIC.

medicamentum, omphacium, omphax, rosę siccę, balaustium, malicorium, & breuiter quę adstringunt, misceri debent. In vigore quę mitigant, decoctum ficuum pinguium, passularum mundatarum, glycyrrhizę, decoctum bifmaluę, quo hoc medicamentũ dilutius esse debet. In declinatione permiscetur mulsu in qua coxerit ea materia, quę descripta est in dolore dentium à materia frigida.

*Diamoron  
ex descriptione  
Hera Galeni.*

Varia autem est mixtura. Heræ. Succı ʒ. 6. mellis ʒ. 1. vini austeri ʒ. 10. croci ʒ. 1. myrrhę ʒ. 2. omphacij ʒ. 1. aluminis ʒ. ʒ. Gal. succı ʒ. 5. seorsũ coquantur: mellis lib. 1. adiiciatur. Coctis & ab igne depositis adde croci, myrrhę ana ʒ. 1. ʒ. omphacij ʒ. 1. siquidem, vt Heras, austeri vini ʒ. 10. medicamento permisceas. Quod si citra vinũ, omphacij ʒ. 1. duas vel tres permiscere potes loco omphacij: vel succı rhois, vel vinum granatorum austerorum misceri potest. Quemadmodum & balaustium & malicoria, siquando miscentur ex austeris malis punicis, meliora sunt. Διαμωρον bati, vt Alexandricus Succı mororum bati ʒ. 2. mellis ʒ. 1. sapæ ʒ. ʒ. coquantur omnia lęto igne, vase æneo stannato ad syrupi crassitudinem. Seruetur medicamentũ eodẽ vase. Nicolaus in antidotario miscet succı mororum Celsi ʒ. ʒ. succı batinorũ ʒ. 1. sapæ ʒ. 3. coquit, vt Alexandrinus. Aliter quoque Mesue. Sed mixtura Galeni & ratione semper vtendum est.

*Diamoron ex  
descriptione  
Alexandri.*

*Diaraon, ex granatis.*

*Diaraon.*

**G**ranatorum tria genera: austerum, quod adstringit: dulce, quod lenit: acidum, quod altius penetrat. ex his succus exprimitur, vel integris cũ succo malicorio, vt magis adstringat: cum nucleis,

nucleis, vt mediocriter, cum pulpa sola, vt minus adstringat. Quod adstringit magis, initio coctum per se conuenit sine melle, quia tū resolutione nihil est opus. Atque vt valentius adstringat, aliquid adstringentium pulueratorum concoqui potest, vt sit iucundius medicamentū quarta pars syrupi ros. de siccis, vel myrthorum, vel cidoniorum misceri potest. Postea quoque mel rosatum, aut sine his conserua rosarū siccarum & similium. Mel autem adiiciendum magis, cum digerēdi locus est. Coqui debet in vase æneo stānato, rudicula agitari ex materia, quæ adstringat qualis est rubi. Succus ita coctus, ros ab Arabibus appellatur. Incrassatur aliquando Sole. Aëtius hoc modo cōfecit ex Galeno. Ex tribus generibus granatorum lb. 3. mensura nostra aut pondere exprimūtur. Galenus addit exprimi oportere cum suis corticibus tuis. Aëtius addit glycyrrhizæ ℥. i. decoquit ad spissitudinē, tum addit mellis ℥. 13. 14. 15. contra inflāmationes oris, fastidia ciborum, & alui fluxiones. Medicamēto addi possunt, quæ in medicamento diamoro, & diacaryo dicta sunt, eodem modo è succo cotoneorum cum prunorū acerborum, qualia quæ vulgò dicuntur (prunelles) & genus quoddam, quod tardissimè maturatur, berberorum, cerasorum adstringentiū, grosellarum (gallicè groselles) eornorum, sorborū, mespilorum, omphacis, agrestæ, stomachica conficies. Sed vt acerbitas vincit, ita plus mellis miscēdum est in his stomachicis. Quædam parantur ex materia esculenta, & hæc non solum inflāmationibus oris, sed fastidio ciborū, fluxionib. alui, & vomitionibus conueniunt. Alia ex materia non escu-

## AD LIB. VII. DE COMP. MEDIC.

lenta, vt quod paratur ex corticibus nucum, quæque alumen, sulphur, calcanthum & similia recipiunt. Hæcque solum stomachica sunt.

### *De gargareone inflammato.*

**G**argareo defluxu humorum aliquando nimis relaxatur, vt quasi fiaccidus concidat, quod malum medicamentum adstringentibus & siccantibus curandum. Vuluam appellant, quâquam vix morbus vel vulua, abscessus est in extremo gargareone eo modo, quo si digitus inflammatus in extremam sui partem materiam inflammationis transmitteret, vel ea parte turgeret magis. Initio inflammationis clystere, vel potione molliâda aluus, sanguis è cephalica detrahendus, cucurbitulæ ceruici affigendæ. Diffruidendæ verò, quæ sub lingua sunt, quies, inedia, alimēta forbilia imperâda sunt. Interdicendum vino, acribus, duris. Topica initio repellant, in statu misceantur, quæ mitigent, in declinatione, quæ discutiant. Abeunte malo in vuam appellatam, animaduertendum an rubeat, doleâtque. Sic mitigatoriis & discutientibus, vbi liuescit, præcidere oportet. Nonnunquam exulceratur, vbi ad curationem vlcerum recurrendum, vt purges, incarnes, cicatricem ducas. Sed in materia, hæc efficiat, esculenta, aut quæ nihil habeant virulentû, eligenda, quanquam aliquando vbi ea vlcera serpunt & putrida sunt, calchanto & similibus metallicis vti licet. Sed ne deuorentur, prouidendum, atque ea materia ex secundo de materia Chirurgica repetenda. Quæ repellût, alia sunt leuia, sapore austero, aut leuiter adstringentia, palmulæ, rosæ, capræoli vitis, rubi genera, cytini, id est, hypocystidis, austera



auftera mala & pruna. Talia cerasa, pyra, radix mori & fimilia. Alia verò media, myrthus, myrrha, illi-  
cis & quercus folia, glandes, mēspila, cotonea, ca-  
ftaneæ, echini. Fortia funt rhu, malicoriū, & balau-  
ftia ex aufteris punicis galla, alumen. Materia inco-  
quitur aqua vel oxycrato ad gargarifmum. Leuiga-  
tur vel afpergitur gargareoni : ex leuibus & forti-  
bus varia proportione infinita mifcentur medica-  
menta. Eodem modo temperatis mediis cum leui-  
bus aut fortibus. In duriore corpore & maiore flu-  
xione fortioribus vtendum, ita & aliis vteris pro  
ratione. Ex eadem materia fuccus, fi licet, exprimi-  
tur, qui liquidus vfui eft. Siccatur vt inde puluis  
infpergatur: qui fi vifcidus permanet, diluitur. Mi-  
tigant glycyrrhiza recens, althæa, vuz paffæ, iuiu-  
bæ, pruna, febeften, ficus pingues. Horum vtimur  
decocto, vel eadem adftringentibus concoquitur.  
Digerunt autem prius commemorata, origanum,  
hyffopus, & fimilia. Atque diacaryo, diamoro, dia-  
ræo e granatis, & aliis id genus, confcripta prius  
ratione, in inflammatione gargareonis vtendū eft.  
Præcidendi gargareonis ratio ex libr. 3. Prognofis.  
Hippoc. 6. Pauli, & Celſo petenda eft. Vritur, ſcari-  
ficatur, præciditur. Sed videndum ne maior pars,  
quàm oportet, auferatur. Sic enim vox perit, &  
ſpiritalia nimium refrigerantur.

*De Aphthis.*

**A** Phthæ Græci, Alcola vocant Arabes. Serpen-  
tia oris vlcera vertunt Latini. Aphthicos vo-  
catur, qui laborat. Aphthos morbus eft familiaris  
pueris, vt ex 3. Aphorif. lib. licet colligere, eft autē,  
quod ſuperficiem oris occupat. Aginguiis ſepè in-  
cipit,

*Curatio in  
gargareone  
præcidendo.*

*Aphthis.*

## AD LIB. VII. DE COMP. MEDIC.

*Aphtharū ge-  
nus duplex.  
Aphtharum  
causa duplex*

*Aphtharum  
differentiæ à  
materia sum-  
ptæ.*

capit,serpit in palatum, descendit in vuam & fauces,periculosissimum pueris,&quod sepè eos consumit. Galenus duplex genus facit 3. Epid. Aliud est mitius,aliud cachoetes & malignum. Hoc vitium ferè cum ardore & erysipelate. Causa autem duplex:in pueris quidem mollities oris,quod ait Gal. quasi *βρωδης*, propter mollitiè à sero lacteo patitur, & insuetis generibus cibi & potus. Altera causa,quæ grauius malum facit, excrementorum acrium copia, vnde maligna vlcera & depascentia sæpè commouentur. Hoc viris & mulieribus aliquando accidit. Sunt & Aphtharum differentiæ à materia sumptæ. Aliæ enim rubent à sanguine: à bile flauescunt:albicant à pituita falsa: nigricant ab atra bile. Remedia inde euariât. Deinde quia in mollioribus & nimis maligna affectione clementioribus vtendum est. Itaq; ardor refrigerandus est. Quod autem exulceratū, cicatrice claudere oportet. Itaque in pueris prouidendum nutrici, vt primum quidem purgetur:deinde nutriatur alimentis partim refrigerantibus,partim adstringentibus loco pulricularum,quæ farina tritici,lacte,& sale vulgò pueris coquuntur, hordeato vtendum est cum saccharo rosato. Os colluatur iulepo rosato,myrtino,addita parte succi granatorum,& eorum, quæ priùs commemorata refrigerant & adstringūt. Similiter ex materia,quæ leuiter adstringit,rosis,capreolis vitium,& cæteris aqua coctis collutiones fiant. Inde pulueres vlceribus inspirantur,qui vel mediocriter adstringunt,quiq; fortiter. Præscripta sæpiùs ratione vsurpanda sunt in igneo feruore, lactuca,intybum,solanum,portulaca,plantago,centinodium

tinodium & similia. Coquantur aqua ad collutionem, quæ aqua etiam alimentis misceri potest. *Vt* mur quoque aquis inde distillatis caphura addita, succis, granatorû, ribes, oxiacâthi, cerasi, mali, pyri, materiæ adstringentis quæ vt dulciora sint, saccharo rosato condiri possunt. Miscetur quoq; diamoron, diacaryon, diarœon, & alia priûs côm memorata ac mellita, Miscere cõuenit in initio, & sine adstringentia. In prærubris vtendum iis quæ leuissimè adstringunt: in albidis, adstringentibus magis, postea iis, quæ citra rosionem digerunt: in subflauis, refrigerantibus magis; in nigris, magis discutiētibus, vbi verò sordida admodum vlcera sunt, & serpunt nimium ad remedia malignorû vlcerum veniendum vt purges, in carnes, cicatricem du cas, quorum materia ex secundo de materia Chirurgica repetenda.

*De vitis vocis.*

**V**T vitia vocis intelligamus, qua ratione vox naturaliter perficiatur, intelligere oportet. *Vocis materia.* Materia vocis spiritus est, inclusus in thorace & pulmonibus non quomodocunque exclusus, sed vehementiûs, quàm in expiratione. Spiritum eo modo vehementiûs exclusum exsufflationem vocant. Exsufflatio itaque materia vocis est. At hoc esse non potest sine actione muscutorum intercostalium, à neruis etiam, qui à respondētibus spinæ vertebris intercostalibus spatiis describuntur, vim nerui accipiunt à cerebro. Itaque cerebro lēso, nec vim demittente in neruos, cessabûnt muscoli intercostales. Nec erit efflatio, nec vox similiter radice lēsa neruorum intercostalium, aut musculis essentiali morbo laborantibus. In vulneribus thoracis,

## AD LIB. VII. DE COMP. MEDIC.

quæ in cauum penetrant, quâ tum spiritus per vulnus efflatur, tantum materiæ voci detrahitur. Vt aliquando vel obscura, vel quasi dimidia, vel certa vox nulla relinquatur. Atque de materia. Iam verò spiritus ille aliquâ do interceptis viis intercluditur, ne ad asperam arteriam & laryngem perueniat, aut non conuenienter perueniat. Ita asthmaticis, purulentis vox sæpè læditur. At vbi efflatio libero trā situ ad arteriam & laryngem peruenit, aliæ causæ lē se vocis requirendæ sunt.

Ac causa sæpè & in tunica, quæ meliori parte arteriam vestit, communi quidem atque continua, & tunica, quæ totum os interius, fauces, linguam, palatum, & œsophagum inducit. Ea ergo tunica cum longa, multa, irrigatur distillatione, vocem adimit: moderatè verò humectata raucedinē facit. Irrigatur autem ferè à distillatione, cui accedit quoq; humiditas è pulmonibus, vel asthmaticis & purulētis. Sed hæc quoq; inspirato aëre frigidiore, vocem corrumpit: vel aëre venenato aut maligna qualitate prædito: quod aliquando accidit iis, qui metalla curât, aut halitu quodâ è speluncis vel ab animâ te venenato, quale fortasse est, quod de lupo scribūt: Lupi Mœrim videre priores. Sed nimium resiccata ea tunica vox vitium trahit, & fit clangor: vel in febre vehementi ardente, causa post longas vociferationes, multasque, vitium contrahit simile lassitudini, quæ phlegmonodes appellatur. Vulnerata quoque arteria & ita efflato spiritu materia vocis, vox perit, nonnunquam quoque potu meraciore. Sed larynge læsa maxima vitia accidunt voci, præcipuè vbi muscoli aperiētes vel claudētes laborât.

Neruis

Neruis quoque vocalibus læsis, vox grauiter læditur. Sæpè etiam aboletur gargareone, epiglottide, faucibus, musculis, qui arteriam coniungunt, œsophago. Oesophago respondente, spina, & maximè, vbi intro luxata est neruis sextæ cōiugationis, qui carotidibus affident in collo, ac denique cerebro læso vox lædi potest. Itaque priusquàm de remediis vocis statuatur, videndum de causa, & an remediis locus sit. Incisis enim neruis sextæ coniugationis, gargareone, musculis, vel aperiētibus, vel clauden-  
 tibus, desperatur curatio, quemadmodū inueterata raucedo, quæ vel annum, vel duos annos superat, incurabilis à multis iudicatur. Ac Medici arteriaca vocant medicamenta, quæ vel musculis laryngis, *Arteriistorū*  
 vel mēbranæ, quæ arteriā succingit, medeātur, quo-  
 rum triplex genus est. Primū læuigat, minimè mor-  
 dax, emplastica natura, quo genere vtuntur in rau-  
 cedine, aspreddine, initiis inflammationū. *medicamen-  
 torum generū  
 tria.* Secundū  
 genus est facultatis citra rofionem abstergentis, in  
 quo genere, vt in reliquis, distinguenda sunt, quæ  
 magis aut minus id faciunt. Tertium genus eorum,  
 quæ siccant, discuriunt.

Itaque ordo est in vsu horum medicamentorū,  
 vt primū lenientibus vtare, donec moderatior  
 fuerit inflammatio, postea leuiter abstergentibus,  
 vt paulatim abstergerendi facultas augeatur, tum sic-  
 cantia permiscantur, postreimò acria. Magna pars  
 horum medicamentorū in hypoglottidas, hoc est,  
 medicamenta, quæ tenentur sub lingua, fingi de-  
 bent, vt paulatim illiquefiant, & deglutiātur, tum-  
 que omninò cohibenda tussis, ne materia defluens  
 in arteriam reiiciatur. Etenim hæere necesse est.

## AD LIB. VI. DE COMP. MEDIC.

Præterea viscidis ferè medicamētis colligatur materia. Primi generis oua forbilia, butyrum, amylū, tragacantha, terra sigillata, gummi arabicum, glycyrrhyza, sorbitio vulgaris è tritico, ex hordeo, lac, mustum dulce coctum, ius passularum benè coctarum, dactylorum veterum & dulcium, iuiubarum, sorbitio ex pineolis recentibus, quomodo fit ex amygdalis, decoctum nucis pineæ, esus pedum animalculorum, coctorum ad putrilaginem, gelatina, fursurum cremor, semen lini, althææ, & inde mucagines. Muccago psyllij, seminis cucurbitæ exorticati, citruli, violarum, melonis. Hæc eadem fient secundi generis, additis saccharo, alphenic, diatrachantho frigido, penidiis, pilulis albis, saccharo violato, ac tandem melle. Iam in secundo genere præter hæc decoctū amygdalarum, caricarum pinguium (nam acres & aridæ ad tertium genus sunt referendæ) syrupus violatus, iuiubarum, prunorū dulciū, nenupharis, de papauere, de floribus & foliis althææ, è decocto nucis pineæ rosinosæ, è decocto passularum pinguiū. Tertij generis hyssopus, thymum, filicis radix, semē ormini, vrticæ cīnammum, cassia lignea, piper, spica, & alia id genus aromata acria, thus, crocus, myrrha, mastiche. In concoquentibus numerantur, terebinthina, coquit, terget, siccat, amygdalæ amaræ, detergent, & his magis farina orobi, ormini semē, radix iridis. Diaireos Salomonis facit ad abscissam vocem à frigore, similiter & diaireos simplex, vel diatrachanthū, ubi à calore vitium est. Nam in hæc tota materia distinguenda, quæ refrigerant, contra causam calidā, similiter quæ calefaciunt, contra frigidam causam.

Galenus

Galenus ex Hippoc. in raucedine, siue fit à distillatione, siue à frigore, non putat vtendum medicamentis purgantibus, quanquam hoc tempore & cassia, & catholico sine periculo vteris. Voce clauosa læuigantibus, quæ refrigerant, vtendū est. Balneum quoque in lesa voce conuenit, vbi vel à calore, vel immodica vociferatione contractum vitium est. Consensus est veterū vocis studiosos plurimū iunari, si plurimum panem siccum ederint, priusquam bibant, aut liquida sorbeant. Mixture trium generum concorporatis aridis, vel diaireos cum vitello oui, cum butyro, syrupis, muccaginibhs, infinita remedia constitues, vt res exiget.

*Raucedinis  
purgationem  
accommodare  
Galenus re-  
tat: recentio-  
res Medici  
imperant, sed  
clementiorē.*

Reliquo hoc libro de tussi, reiectione sanguinis, & spirandi difficultate agit Galenus, ac plurimum vititur medicamentis narcoticis, quorum vsus est benè purgato corpore, vbi nimium tussis vrget, & vigilia. In narcoticis, itaque syrupus est de papaue re, cui proximi sunt syrupus de nenuphare, & violatus recens. Galenus plurimus est in descriptione diacodij, quod ita confici debet. Decem capita 78. aut nouem papauer, candid. loco neque squalido, neque palustri colliges, vt sint ea capita neque molliora, neque sicciora. Magnitudine verò mediocria capita ista selecta vnum diem fines. Neque statim exempta coques post horas 24. qui dies vnus est, sextario aquæ puræ & synceræ vel pluuiali, vel fontanæ, quæ non ducatur per canales plumbeos, incoques. Est autem sextarius, quantum capit cheopina Parisiensis, adiecta quarta parte. Coques autē dum capita in tabescāt. Sic autem capita exprimes in aqua, in qua coxerint, animaduertesq; ad mate-

*Diacodij præ-  
paratio.*

## AD LIB. VII. DE COMP. MEDIC.

riā decocti, vt dimidiū vel sapæ, hoc est, vini cocti  
 è musto dulci, in morbis thoracis, ex musto adstrin-  
 gente, in dysenteriiis & vbi vigent vigiliæ, tenuior-  
 que fluxio est, vel mellis vbi partim sistendum, par-  
 tim educendum, nec ita vigent vigiliæ, nec acris,  
 aut tenuis fluxio. Alioqui & sapæ & mellis vtrius-  
 que parem modum in media conditione, decocto  
 adicies. Coques autem dum sit spissitudo syrupi.  
 Aliquando glicyrrhyza adiicitur loco mellis, dia-  
 tragacanthum frigidum in calore & siccitate, dia-  
 reos simplex, vbi educendum. Saccharum quoque  
 loco mellis misceri potest. Datur cochleare delin-  
 gendum. Aliud est medicamentum narcoticum,  
 quod Philonium veteres & recentiores Medici ap-  
 pellant, quod variè cōficitur. Græcum hoc modo.  
 Piperis albi ℥. 20. β. seminis hyoscyami albi tantū-  
 dem, opij ℥. 10. croci ℥. 5. spicæ nardi, euphorbij, py-  
 rethri, ana ℥. 1. vniantur omnia melle cocto. Detur  
 dimidium drachmæ, scrupulus vnus. Arabicū hoc  
 modo. Papaueris albi, hyoscyami, ana ℥. 20. aut for-  
 tassè loco papaueris piperis scribendum est, opij,  
 terræ sigillatæ ana ℥. 10. lapidis hæmatitis ana ℥. 5.  
 pyrethri, castorei, spicæ, euphorbij, margaritarum  
 non perforatarum, carabæ, zodoariæ, doronici, gal-  
 liæ moschatæ ana ℥. 1. caphuræ ꝯ. 1. Incorporentur  
 omnia melle rosato colato. Dosis à ℥. 3. β. ad ℥. 1. cū  
 succo arnoglossi, in sputo sanguinis vino dulci, ad-  
 iecta parte rosarum. Rhazes aliter. Piperis, ameos,  
 foliorum méthastri, castorei, baccarum lauri, cymi-  
 ni ana ℥. 1. opij, mandragoræ, seminis hyoscyami  
 albi ana ℥. 3. β. mellis q. s. Dosis ℥. 1. aut ꝯ. 4. quia hoc  
 Philonium leuissimum est, Græcum fortissimum,

in

*Philonium  
Græcorum.*

*Philonium  
Arabicum.*



in medio verò Arabum. Nicolaus proximè describit ad Philoniũ Galeni. Alexandrinus quoq; , Actuarius, sublato castoreo. Alexandrinus aliquor descriptiones Galeni facit. Compositio describitur li. 9. Sunt & alia narcotica, Pilulæ de cynoglossa, Athanasia, diapente. & antidotum, quod & pleuriticis prodest, empyicis, tussiculosis, vt vna portione liberet. ʒ. castorei, opij ana ʒ. 4. succi baccarum lauri, mandragoræ, cinamomi, spicæ, cardamomi ana ʒ. 2. croci, cassiæ, dauci, an. ʒ. 1. ʒ. costi, myrrhæ, galbani, piperis albi an. ʒ. 1. vniuntur melle Datur castaneæ magnitudo cum tepida.

*De asthma, orthopnea, difficultate spirandi.*

**I**N his omnibus difficultas est spirandi: sed hæc in genere tres causas habet, quæ ad rectè curandum recognoscendæ sunt. Itaque difficilis spiratio est, vel propter vehementem æstum conceptum in thorace & pulmonibus, vt in peripneumonia, graui pleuritide: altera causa est, angustia partium spiritalium, quæ vel puri, vt in tabidis & purulentis, vel crassæ & viscidæ pituitæ, vt in asthmaticis, vel tuberculo aliquo, abscessu incluso in partibus spiritalibus, intercipiuntur. Tertia causa est, imbecillitas partium quæ respirationem faciunt: atque hæc distinguenda suis notis, quas scriptas inuenies cap. v. & viij. libro 4. de locis affectis. Galenus hoc libro alias differentias difficultatis spirandi relinquit. Tantum agit de asthmaticis & iis qui, quia periculo suffocationis, quasi recti coguntur decumbere erecta ceruice, orthopnoici appellantur. Asthmatis itaq; & orthopnoæ causa, angustia est à crassa & viscida materia bronchiis pulmonis: atque

*Spirandi difficultatis tres cause.*

*Asthmatis & orthopnoæ causa.*

## AD LIB. VII. DE COMP. MEDIC.

*Phlebotomia  
quando locus  
inspirandi  
difficultate.*

atque huius mali initium ferè est à perpetua distillatione. Itaque in primis habenda ratio totius corporis, deinde capitis : postremò liberandus pulmo ea materia, quæ iam inhæsit. Quòd ad vacuationem totius corporis attinet, phlebotomiæ quidem aliquando locus est in plethoricis, benè habitis corporibus, aut in quibus suppressa est solènis aliqua sanguinis vacuatio. Et quia hic morbus senibus, corporibus natura frigidis, conditione pituitosa ferè nascitur, non temerè detrahendus sanguis est. Quòd ad caput attinet, vacuandum per errhina potiùs, quàm masticatoria. Tondendus est capillus, corroborandù caput est per ea, quæ prioribus libris descripta sunt: parca cœna, vsus vini tenuis, alimètorum, quibus vis insitum incidendi, tum detergèdi. Gal. 6. Epidimion ex Hippo. sententia abstinendù putat acribus, vt allio, sinapi, iis, quæ difficulter coquuntur, vt suilla, bouilla, ouilla, alimètis mali succi, quæ descripta inuenies lib. de euchy. & cacoch. Postremò iis omnibus, quæ vehementer tendunt aut mouèt, qualia sunt exercitia, cursus, clamor, ira, vociferatio, & alij id genus affectus animi. Medicamètorum facultas incidat, absterget, sed citra insignem calorem: non adstringat, non refrigeret, non sit narcotica. Hoc quoq; vult Galenus. Medicamèta quæ natura sua siccant, diluit, vt faciliùs crassities humorum diuidant, & nec præter modum siccant. Propterea & multum potum concedit, vnde crassities materiæ diluatur. Sed talis sit multus potus, vt iuuat quidem, & non noceat. Nocet potus à quo repleri potest caput vaporibus. In remediis maxime probat, quæ parantur è scylla, qualia sunt mel scylliti-

scylliticum, acetum & oxymel scylliticū. Gal. idem mel scylliticum hoc modo comparat. Scyllas aridas vase, in quo mel repositum fuerit, reponit sub canicula, exponit soli, subinde obuertens vas calori solis, & prohibēs frigore Aquilonis, inde refudat liquor, qui melli mixtus efficacissimum remedium est, vbi cunque crassus humor incidendus, & viscidus detergēdus, vt in asthmaticis, epilepticis, & aliis id genus: Alioqui scylla coquitur, exprimitur succus & miscetur melli, vel ē cruda succus expressus concoquitur melli. Dosis à semisse drachma, vt in pueris, ad 3. 2. Acetum & mel scylliticū describuntur à Nicolao. Looth de scylla respōdet melli scyllitico. Purgationes autem totius corporis subinde reuocandæ aliquando ex cassia, catholico, sed precipuē agarico. Materia, aristolochia, gētiana, enula, centaurium, radix maioris centaurij, me<sup>l</sup>, ianthium, iris, origanū, thymum, hyssopus, saturia, pulegium, semen vrticæ, irionis, asellorum, puluis, & qui ē limacibus torrefactis, ē præparato pulmone vulpis, vermibus serici, ericio, lactæ stercore, odorato, quod vulgus moschum appellat, vermibus subiectis vrticæ, interioribus oculis philomenæ. Adde sulphur viuum, fœnugræcum. Ex aliorum decoctis oxymel fit, vel me<sup>l</sup> licratum, pulueres butyro, melli scyllitico vel l<sup>i</sup>, quidis permiscentur: alioqui decocto ficuum: aridarum. Laudatur decoctum rutæ, galli farigati lucta, cocti cum herbis esculentis, quibus vis insit siccandi, incidendi, detergendi. Cucurbitæ scapulis, cruribus, sub mammis affigendæ. Thorax primū munitur fordida lana, prius imbuta oleis amygdalarum dulcium, de lilio, & similibus.

*Mellis scyllitici præparatio ex Galeno.*

## AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

libus. Postea quoque dropaces, sinapismi, & quæ exulcerant, adhibentur. Theriacæ & mithridatij vsus conceditur interuallis: decoctum quoque satis dilutum ligni gaiaci: aut concoqui debent passulæ, ficus, glycyrrhiza. Videndum tamen ne quis fallatur, vt putet causam asthmatum crassam & viscidam pituitam, cum sit abscessus. Hic enim paucus potus conuenit: medicamenta verò, quæ incidant & siccent, in quibus maximè probantur à Galeno, quæ aromatica sunt.



## AD LIBRVM VIII.

### GAL. DE COMPOSIT.

PHARMACOR. καὶ τόπος.

### PERIOCHE VIII.

*Stomachici  
qui dicantur.*



Galenus in hoc libro 8. agit de stomachicis, & iecorariis. Stomachici dicuntur, qui imbecillitate stomachi laborant: quanquam ab accidentibus, quæ imbecillitatem sequuntur, aliquando stomachicos dicunt, qui vel subuersione ventriculi, quam vocant *ἀνατροπή*, vel suspinitate, quam appellant *ὕπρισμος*, stomachicos nominant. Atque omnino, vt antè scripsit Galenus 2. libro imbecillitas stomachi, hoc est, oris ventri-

ventriculi, & virtutis concoctricis totius ventriculi, maximam vim habet aceruandis excrementis. In his affectibus deiicitur appetétia, nauſea, quædã eſt, aliquando vomitio & diarrhæa, atque aliquando ea humiditas fluitat, nonnunquam inhibita eſt bilioſa, nunquam ſine vitio, quæ omnia ad curatio- nem reuocanda ſunt. Ac præterea, vt ventriculi af- ſectibus artificio medeamur, cognoscenda ea, quæ ſcribit Gal. 3. li. de morbis & ſymptomatis, cap. 5. lib. 5. de locis affectis, 6. de ſanitate tuenda 7. Metho- di. & ſigna in arte parua. Intéperies ſi ſola eſt, cõ- trariis euinci debet. Nam vbi æſtuat, refrigerandũ, vbi friget, calfaciendum, ſi ſqualeſcit, humectan- dum, vbi multa humiditate laxatur, ſiccantibus at- que adſtringentibus vtendum. Hæc autem omnia ſignis oſtenduntur, quæ inuenies in arte parua. At que remediorum duplex genus. Alterum in alimén- tis, quæ ſua qualitate morbo repugnât, alterum in medicamentis, quæ partim deuorantur, partim ad- hibentur foris. Quæ foris adhibêtur, liniméta ſunt. Alia cataplaſmata, quædam emplaſtri formam ha- bent. Sunt & fomenta. Atque hæc omnia partim interiori parti, vbi ſternũ eſt, partim ad 12. verte- brã dorſi applicari poſſunt. Sed quæ à dorſo appli- cantur, aliquid tenuiũ partiũ habeât, vt per denſi- tatẽ viæ penetrare poſſint. Itaque in linimétis, quæ refrigerant, ceratũ eſt roſaceũ Galeni, ex ceræ par- te vna, trib. aut quatuor partib. olei roſacei, quod legitimũ ſit, liquatis in vaſe duplici, deinde ſuba- ctis ſcũ ſucco omphacij, vel ſimili adſtringẽte. Hoc enim dictũ ſit in vniuerſũ, medicamenta quæ ſto- macho adhibentur, egere adſtrictione, quæ ſcilicet corroboret

*Stomachica  
remedia qui-  
bus partibus  
externis ap-  
plicanda.*

## AD LIB. VI. DE COMP. MEDIC.

corroboret. Quoniam in adstringendo modus esse debet. Nam quæ nimium adstringunt, nimium siccando nocent. Cõuenit & vnguentum rosaceũ, ceratum santalinum rosaceo dissolutum, recentes rosæ, vel in austero vino parum vinoso decoctæ. Item oleum cydoniorum, myrobalanorum. cõparatum ex vitium capreolis, & aliis rebus id genus, quæ & adstringunt, & refrigerât. In eadem intemperie veteres plurimũ vñ sunt medicamẽtis, quæ ex succo cydoniorum cõparantur, quæ etiã secuti sunt recetiores, vt in syrupo acetoso, de cydoniis.

*Ad calidam ṽtriculi intemperie vñ le remedium.*  
 ℥. succi cydoniorum depurati per residentiam sacchari ana ℥b. i. aceti ℥. 3. coque ad spissitudinẽ. Datur cum aqua. Cõuenit stomacho calfacto, cõfirmat, facit appetentiam. Poteris tamen inuenire modũ sacchari, vt erit calor, eiusdem generis sunt Miux, vt minæ Rbazæ, siquidem sine vino & aromatibus comparetur. Nam cum his refrigerato stomacho cõuenit succi cydoniorum depurati per residentiam ℥b. i. sacchari ℥b. i. β. vini veteris ℥b. β. Coquatur, & despumetur. In calidum autem immittatur nodulus sequens.

℥. Zinziberis, spicæ, cinamomi, caryophyllorũ, ana ℥. 2. mastiches ℥. 4. Inuoluâtur in nodulo. Alias Miux describemus in intẽperie frigida. Eodẽ modo oxysacchara, syrupo de granatis, deribes, de grossulis, de agresta vteris, hæc enim ad refrigeriũ ventriculi faciunt, corroborant & appetentiã excitant. In his autem qui abhorrent à syrups, materiam horum immiscebis alimentis, vel quod sit. coques & cõdies saccharo in vocatis vulgo. Tartina-giis. Cæterum hoc semel dictum fuerit, alimẽta & medica-

medicamenta, quæ imbecillo ventriculo adhibentur, oportere vel calida, vel frigida esse, quia tepida robur dissoluunt. Abstinedum tamen nimium refrigerantibus, ne inde natiuus calor offendatur. Et quia frigida intemperies sæpius accidit, propterea multò plura medicamenta descripta sunt ab antiquis, quæ faciunt contra intemperiem frigidam: quamquam & horum quedam contra declinantes inflammationes ventriculi, ad resoluendum videlicet scripta sunt: quale est laudatum à Galeno, & quod stomachicum Galeni vocant. Sed iam parari non potest inopia nardini vnguëti & ceræ ponticæ, aut alioqui amaræ. Hoc modo tamen conficietur vtile, & accedens ad medicamentum Galeni.

*Tepida imbecillo ventriculo non adhibenda, quia robur dissolunt.*

Comparabis itaq; optimum oleum nardinum, aut ex his aromatibus, quæ calfaciant & corroborent, vno pluribusve, cinamomo, ligno aloës, moschata nuce, macere, spica, cypero, lauendula, mentha, maiorana, rosmarino, stæchade, cardamomo, schœnuantho, & aliis id genus, quæ quidem olea hac arte conficies. Parem modum olei & vini permiscebis: coques deinceps, & ordine iniectis, quæ vel breuiorem, vel longiorē coctionem sustinent. Coques autem ad vini consumptionem, comparato oleo, hoc modo miscebis.

*Ad frigidam ventriculi intemperiem remedia.*

℞. ceræ citrinæ ℥.4. olei ℥.3. ℞. Liquefiat in vase duplici. Tum addes succi omphacij, sumach, vel alterius id genus ℥.3. aut 4. confice ceratū. Quod si videtur esse durius, aut grauius, in vsu diluetur conuenienti oleo, vt sit vel liquidius, vel spissius. In liquidiore intinges vel gossipio, vel lana dibaphatica (vulgò esscarlatte) & calidū medicamentum ad-

## AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

mouebis. In declinationibus inflammationum, loco  
 medicamento Galeni & meliloti, utemur emplastro  
 nostro de meliloto dissoluto in oleo cōuenienti,  
 ut de spica, de lauendula, & aliis comparatis ex  
 prescripta materia. Humidior ventriculus siccan-  
 tibus & adstringētibus curari debet: siccior, hume-  
 ctantibus. Meminisse tamen oportet semper inter-  
 miscenda, quæ adstringendo corroborant, quales  
 sunt rosæ, succus cydoniorum, prunorum nō dul-  
 cium, & aliorum id genus: aromata verò, ubi frigi-  
 ditas coniuncta est. Sed ferè fit, ut ad intemperiem  
 sequatur excrementorū prouentus, vnde ferè fiunt  
 & anatropæ vocata subuersio, & hyptiasmos, hoc  
 est, supinitas. Anatropæ hæc habet accidentia, cibi  
 fastidiū cum nausea, aquæ vomitus aliquando, ro-  
 sionem, voulimiam, aut caninā appetentiam, fasti-  
 dium, quale est repletis è cibo. Sepè accedit multi-  
 tudo vitiosi succi, alioqui paucæ, vel nullæ humidi-  
 tatis. Hyptiasmos aliquando ab intēperie citra hu-  
 morem: aliquādo cum humore multo quidem, sed  
 non maligno. Is humor aliquando fluitat ferè te-  
 nuis, nōnunquam crassus & viscidus imbibitur ori  
 & tunicis ventriculi: nonnunquam cum signis cali-  
 ditatis, estu, siti: aliquādo sine siti, ubi frigiditas con-  
 iuncta est. Eiusmodi humiditas appetentiā deiicit,  
 & ea commouet, quæ in anatropæ dicta sunt. Hæc  
 autem affectio dissoluit tum os ventriculi, tum ven-  
 triculum ipsum. Quo modo vincula, nerui, mem-  
 branæ, imbibita omnia multa humiditate laxa, vi-  
 cta & quasi omninò dissoluta redduntur. Eget hæc  
 affectio primū quidem vacuatione: atq; ubi hu-  
 mor fluitat & tenuis est, partim vomitu, partim le-  
 quibus



uibus medicamentis vacuari potest: deinde siccatibus, adstringentibus, & corroboratibus curari potest. Quod si crassa & viscida materia est imbibita profundius, oxymelite vel simplici, vel composito ex decocto radicis fœniculi, cinamomi, & aliorum id genus, quæ scilicet, incidunt, tenuant, præparari debet. Hiera simplex, vt medicamento efficacissimo, aliquoties vtendū erit, vt quod vim habeat incidēdi, detergendi, corroborādi, purgandi, & præsertim quæ sunt in vētriculo, & primis venis. Dētur ʒ. 2. aut eò plus cū hydromelite, vel oxymelite. Repurgata materia, corroborantibus vtendum erit. Vbi verò humiditas frigida est, siccandum, detergendūque. In humiditate neque crassa neque viscida in alto posita, sola adstringentia satis esse possunt: quanquam tutius fuerit pilulis communibus, vel ante cibū datis vacuare materiā. Alioqui pilulis ex rhab. & agarico. Alioqui terebinthina vtetur. In intemperie frigida & humida, tum quæ purgant, tum quæ adstringunt, inimica sunt, vtendūque medicamentis, & alimentis, quæ calefaciunt, & siccant. Medicamenta in hoc libro descripta ad anatropas & hyptiasmos fere composuerūt veteres ex rebus adstringentibus & detergentibus succo punicorum acido, cydoniorum, sorborum, mespilorum, myrtorum, dactylorum recentium, & quæ vulgò (prunelles) dicūtur. Adde, si vis grossularum, & similium, quorum compositionis hoc sit exemplum, addito melle, quod ad immoderatas omnes affectiones ventriculi facere scripsit Gal. nisi sint cum vehementi æstu.

Succi cydoniorū depurati sextarij duo (hoc est

## AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

nostro more semisextarioli quinque, vel librę duę cū semisse) mellis despumati optimi sextarij duo, id est, semisextarioli quinque, vel librę tertię cum 4. quartariis, aceti acris sextarius vnus, hoc est ℥. 10. vel nō ita acris sesquiseptarius, hoc est ℥. 30. Coque ad spissitudinem. Quod si frigiditas cōmunicata est, iā coctis adde zinziberis ℥. 3. piperis albi. ℥. 8. Læuigata coctis alijs permiscentur. Aliud.

Eiusdem carnis cydoniorū, mellis an ℥. i. aceti albi tantundem. Bulliant simul, & agitentur: tum adde piperis, zinziberis ana ℥. i. petroselini Macedonici ℥. β. In frigiditate cōuenit diagalāga, dianifon, diacuminū, diatriton pipereon, zinziber viride, nux moschata, condita diuitibus, vt Chebuli conditi. Confectio anachardina, theriaca, mitridatium, & maximē vbi refrigerato vētriculo plurimi flatus excutiūtur, vnde periculum hydropisis immineat. Et quia apud veteres, tū etiam recentiores Medicos absynthiū sępē memoratur, de eo sic habeto. Vtendum itaq; absynthio aromatico, nō eo, cui horribilis sapor est. Itaque decoctum absynthij biliosa deterget & subducit, si quidē aliū nō fuerint imbibita. Maior vis inest syrupo de absynthio aut melicrato parato ex decocto absynthij. Infestissimum verō absynthium, quibus pituita in ventriculo inhæsit, nisi decoctum eius cōdiatur aromaticis, incidentibus, calefaciētibus, & melle vel saccharo, quod detergeat. Emplastro vsitatissimo, eodēq; efficacissimo ex mastiche, cerato stomachico Galeni, carne cydoniorum sic vteris. Mastiche & ceratū stomachicū utrūq; corroborat, & discutit, cydoniatū, caro cydoniorū, deterget, & corroborat.

borat. Tria hæc pondere æquali permiscentur, singulorum ℥. i. iunguntur cum oleo mastichino, de spica, & aliis. Aliquando ubi discutiendum magis, neque ita adstringendum, plus mastiches & cerati minus miscetur, cydoniati aliquādo, ex sola mastiche, aut cerato emplastrum conficitur. Augendus modus cydoniati, ubi vel vomitio, vel diarrhæa vexat. Sed duplex cydoniatum est: alterū sine speciebus, quod ubi calor est, vsurpandum: alterum cum speciebus, quod in sensu frigiditatis conuenit.

*Ad dolorem stomachi.*

**S**tomachus vegetissimo sensu præditus est propter neruos illos insignes à sexta cōiugatione. Archigenes in magno dolore ventris venā secat, extrema ligat, cucurbitulas circa stomachum affigit, leniētib; fomentis vtitur, glāde aluum subducit potius, quā clystere, quia à clysteribus metuit, ne inde sublat; vapor dolorem augeat. Secanda autem interna, & perseverante malo, vtriusque brachij, & hoc magis, si grauis dolor est, si repētinus, si difficilis ructus & spiritus, si febris est, si dolor in dorsum & scapulas extēditur. Historia est apud Hippocratem lib. Epidemiō de muliere quadam, quæ in vehemētissimo dolore stomachi nullis adiuta est remediis: ducto tandem sanguine ex vtraq; manu seruata est. Cucurbitulæ, vt Archigenes, circa stomachum, vel vt alij, vmbilico, vel ad latera vmbilici affigendæ: dextra quidem parte, si ab hepate: sinistra, si à liene in ventriculum fluxio est. Sunt qui affigant ad 12. vertebam dorfi. Purgationis vsus est, si ab acri sanie, aut humorū prauitate dolor est excicatus. Atq; omninò ī affectio

## AD LIB.VIII.DE COMP.MEDIC.

*Ventriculo  
male affecto  
qua purgatio  
conueniat.*

nibus stomachi & ventriculi vbi purgandum est vtendum purgatione omninò leui,& quæ non attrahat à reliquo corpore.nifi confluyente ad vētriculum materia ab vniuerso corpore dolor moueatur. Posthæc topicis & sumptis per os leniendus dolor est,alimentis quidem ea qualitate præditis, quæ faciat contra causam morbi.Similibus quoq; medicamētis,sed odoris & aromaticis.Stomachus enim gaudet odore,subuertitur cōtrariis. Vtemur verò fomentis ex chamæmelino,meliloto, aneto, antho,rosis,mentha, absynthio, cypero,mixtis simul anodinis,& iis,quæ corroborant. Modus autem fouendi est,vt coquantur aqua, adiecta vini parte,& inculcatis in decocto linteis pars foueatur.Alioque vesica impletur ad dimidiū, & stomacho adhibetur:in æstu,frigida:in frigore,calida:oleis quoq; prius cōmemoratis.Sed vbi ardor cōiunctus est,folia vitis,papaueris,hyoscyami,mādragoræ,flores inde & semina concoquenda.Aliquando vbi à doloris vehementia periculum imminet,narcoticis vtendū,opij grano vno,leuiter feruefacto,in syrupi rosarū & absynthij an.sesquūtia.Sit autē tantū vna ebullitio,quæ deinde misceatur ʒ.3.iuris pulli.Detur in potu.Alioque Philonij in causa frigida,in causa calida. Requei descriptione Nicolai ʒ.ʒ.in vnciis duabus vini odoriferi.

*Ad vomitum.*

**V**omitum subuersio quædā est copia vel qualitate materiæ:alioqui incitatur vētriculi imbecillitate. Vacuanda copia:purgāda praua materia:imbecillitas,vt prius,corrigeāda.Ac ferè vomitus excitatur,qui perseveret,imbecilliore stomacho.

Nam

Nam si quid excludendum robusto quidem stomacho, sed imbecillo vêtre per deiectionem excluditur. Contra verò re habente, per vomitum. Vehementer cohibet vomitiones ceratum prius descriptum ex partibus æqualibus mastiches, cydoniati & cerati stomachici Galeni, iunctis cum oleo cydoniorum, rosarum, mastichino. Efficacissimum remedium contra perseverantes vomitiones est, similiter vini odoriferi potus, & in calore iulep. rosarum, adiecta parte octava vini granatorum, berberorum, & similium, quæ tantillo cinamomo condienda sunt. Plurimum quoque conferet syrupus de agresta, vel omphacomeli veterum.

*De Singultu.*

**S**ingultus ab acri & rodente, vel materia, vel sanie, à repletionem, inanitionem, frigiditate excitatur, aut, vt brevius Hipp. ab inanitione & repletionem. Itaque vbi repletio, vel acris materia est, purgare conuenit. Galenus vehementer probat vsum hieræ picræ. Arabes proprietatem quandam ascribunt rhabarbaro in edendo singultu. Post purgationem corporis vino odorifero cum tantillo cinamomi & galangæ vtendum est fomentis, quæ incendant, calefaciant, abstergeant, ex materia in dolore frigido præscripta. In inanitione, vnde singultus, etiamsi desperata res videatur, iuuandi tamen distillatis, colatitiis, iusculis expressis, gelatina, forbilibus ouis, inungendus stomachus & deorsum ad 12. vertebram hydrelæo, ex æquis partibus aquæ & olei violati. Neque tum astringentibus vtendum, sed rarefacientibus, vt materia transpiret. Conueniunt & quæ antea commemorata sunt. dia-

## AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

galanga, dianisum, & similia. Anisum peculiari ratione singultui medetur, propterea & anisum sæpè imperant, & oleo anethino ventriculum fouent.

*De vlcere ventriculi, vel œsophagi.*

**E**Xulceratur à causa externa & manifesta, vel etiam à causa interna, humore acri, pharmaco acuto, & aliis rebus acutis: tum etiam præcedente abscessu. Signa sunt, quia dolor fit vlcerata parte, *Ventriculi* sed præcipuè si quid acre, vt sinapi, si quid calidius *vlcerati* aut frigidius deglutitur, & inde facto dolore intelligimus qua parte vlcus sit. Pure etiam vel vomitu, *signa.* vel deiectione exeunte. Ardor quoque in ea parte percipitur. Lingua sæpè inficitur: sapor redit in os, angustia est spiritus & ferè fastidiû: sed vbi in orificio ventriculi grauiora symptomata commoueri solent, animi deliquia, extremorum frigus, dolor crudelior. Cap. 4. lib. 5. locorû affectorum Galenus scribit oēs ferè interire, nisi ætatis beneficio seruentur. Ad hæc legenda quæ scribuntur 4. Method. Utendû est alimentis, quæ medicamentosam qualitatem habeant, detergentibus, incarnantibus, & cicatricem ducentibus, quæ seligēda sunt ex 2. lib. de materia Chirurgica. Abstineđum omnibus acris, acerbis, falsis, acidis, quæ scilicet vlcus exasperant: mitigantibus vtendum, quæ etiam detergeant, glutinent, incarnent, cicatricem ducant. Atq; in gula paulatim deglutendum, adiungendumq; aliquid viscidum, vt vis medicamenti obiter inhæreat. Lac itaque tepidum conditum saccaró diatragachanto frigido, lac amigdalorum, hordeatum, limaces, cochleæ, gelatina. Sed maximè ouæ sorbilia, aut paulò magis cocta concipiendis medicamentis idonea sunt.

sunt. Potus quoque, hydromel, vel hydrosaccarum, syrup. viol. iuiubarum : deinde etiam myrtillorum & rosarum de siccis. Vtimur quoq; saccharo rosato, mastiche, tragachato, & aliis id genus, farina fabarum, hordei tosti, admixto puluere balaustiorū, malicorij, sanguinis drachonis. Exercitatio & frictio partium inferiorum. Sed aliquando non vlcus, sed tuberculum in œsophago nascitur, à quo defluens potus aut cibus resistit in via sine dolore. Rarū est, quod tamen post 4. mensem accidit. Puella quædā *Historia.* deuorato multo pulmone veruecino, & inde grauato ventriculo post nauseam vomuit frustū pulmonis. In œsophago restitit parte superiore, vnde grauiter cōflictata & periclitata conualuit successu, cucurbitulis affixis, & ferramentis in œsophagum inditis. Nihil deglutiebat intercepta via. Ex anteedente de malo coniectura facta est. Inflata eius pulmonis portio œsophagum obsederat.

*De voulimo.*

**V**oulimum quasi πολὺ λιμὸς appellatur: βῆ enim particula in hac voce, vt aliis multis, πολὺ multum aut magnum significat. Est autē genus quod ab ingente fame nomen habet. Vocatur & phagedæna ab insatiabili edendi cupiditate. Sub hoc genere continetur canina appetentia, affectio appetitricis facultatis, id est, stomachi in quo affectu repletus affatim ventriculus paulò post omne reuomit, aut deiicit, virtute non sustinēte. De hac canina appetentia lege 5. & 6. de locis affectis, 4. de sympto. caussis. Causa est cum os stomachi penuria, imbecillitate, & refrigeratione afficitur, 5. de simplicibus, à frigiditate & siccitate, vnde curari

*Canina appetentia.*

gg

s

putat

## AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

putat calfacientibus & humectantibus balneis & alimētis. A fame inchoat, quę postea definit. De quo lege Aphorif. 21. lib. 2. Gal. de vsu respirationis refrigeratis partibus thoracis, & quę vicinę sunt. lib. verò de Theriaca, helminthi vermi, hoc aliquando attribuit nobili historia de virgine quadā: quę cum multum comederet, perpetuò tabescebat, verme illo perpetuo exugente chylum & alimētum, quod deberet distribui corpori. Legendus commētarius aphorismi, *Famem thorexus & vini potio soluit*. Eleni vini vsus plurimum laudatur à Galeno: sed neque vacuo ventriculo, sed modico pastu, neq; multum semel, nisi vehementer sitiunt, sed breuib; intervalis. Archigenes eos, qui ingenti fame in viis delinquant, reuocat odoramentis aceti, pulegij, terrę aceto maceratę, pomis, malis, piris, & aliis, quę ad manum sunt. Dat panem intinctum vino postea suillam affatam, & eā quę multū nutriunt, & odore sunt bono. In paroxysmo extremę partes contringantur, maxillę pungantur, pili vellantur, & aures. Reuocatis, ab animi deliquiis, panem dat imbutum vino diluto. Alimenta, quę affatim nutriunt, oua sorbilia, bulbos, cochleas & similia.

### De Hepaticis.

*Hepatici Galeno qui sint.*

**H**Epaticos definit Galenus, qui ex imbecillitate hepatis aliquo vitio laborant, etiam si neq; febris, neq; inflammatio, & sine hac imbecillitas esse potest. Nascitur imbecillitas ab intemperie. Intemperies est vel visceris, vel humorum, qui venis & arteriis continentur: vnde vel alteratrix, vel retentrix, cōcoctrix, vel excretrix malè suo munere fungitur. Sed hoc quomodo distinguendum, intelligendum.



intelligendum ex libr. 6. de symptomatis, & morbis, itémque ex cap. 6. lib. 5. de locis affectis, vbi malum insistet. Galenus in vitio alteratricis, cum scilicet hepar attrahit, sed quod attrahit, non sanguificat, ait egeri similia loturæ carniū, vt in historia illa Siculi Medici, cuius meminit libr. 5. de Locis malè affectis. In calida intemperie humores visceris, deinde viscus eliquatur. vacuaturque per aluum bilis olida admodum, crassa, insigniter tincta, mordax, & spumās in frigida. Neque frequens, neque copiosa deiectio, sed longior affectus est, color pallidus tardus pulsus, vrina tenuis, vbi siccitas contracta, spissa, vbi humiditas ac paulatim retenta materia calorem succendit & febriculam, quæ vix apparet, & Medicum fallit, nisi diligenter obseruet tum quæ crassiores, sæculentæ & limosæ excretiones faci sanguinis, vel limo similes. In calida intemperie leuibus pharmacis vtendū est nō vt intemperiem cures sed vt vacues excrementa quæ per intemperie collecta sunt. Vteris ergo cassia, catholico, syrupo violato, recenti rosato laxatiuo, quibus dilutum rhabarbari misceri potest, sed non ita magna quātitate dilutum: vt 3. i. sufficiet. In calida intēperie refrigerantibus modicè, roborantibus vt edum, cichorio, endiuia, scariola, adiantho, capillis ven. fumaria & aliis id genus. Mellitis rebus non ita vtendum, quia in calida intemperie mel exsiccat, & talia promptè amarescūt. Itaq; in decocto harum rerū sufficiet decima pars sacchari alioqui dissolues decimā partem syrapi de portulaca, de limonibus, de acetositate citri, de granatis, oxyfacc. simp. & similiū. Acetosæ magna vis inest refrigerando

*Heparis calida intemperies leuiores perit cathartica*

# AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

*Electuarium  
de vino Ara-  
bum.*

refrigerando hepatis, similiter & lactucæ. Itaq; altera vel utraq; plurima incoquitur iusculis. Ius acetosæ exprimitur, in quo carnes intingantur, panis hordeatus, aqua hordei, hordeatû. Huic malo maxime cõueniunt æstiu quoque fructus, cerasa, ribes & similia. Vino non nisi diluto plurimum utendû est, elixis potius, quàm assis. In frigida verò plurimum laudatur electariû de vino Arabum, quod in hoc libro Gal. ex Andromacho describit, paululû variante formula, & syphoides appellat. Passularû mundatarum ℥. tres, croci ℥. i. calami aromatici ℥. 2. β. bdellij ℥. β. cassiæ lignæ ℥. 2. β. cinamomi ℥. β. spicæ ℥. 3. myrrhæ terebinthinæ ana ℥. 4. iunci odorati schœnuanthi ℥. 2. β. filiquarum, vel carubiarum ℥. 2. mellis ℥. 2. vini tenuis odoriferi, quantum sufficit, fiat electarium. Sed quia difficilis est hæc compositio, melius fuerit passulas mundatas ad ℔b. semissem incoquere vino subtili, odorifero, donec sit crassitudo : deinde admiscere conferuæ anthos ℥. 2. cinamomi ℥. 2. cassiæ spicæ, ligni aloës ana ℥. β. croci scrupuli dimidium. Concorporare omnia, & exhibere semunciam pondere cum vino tenui & odorifero. Materia ferè cõuenit, quæ penetret, propter angustias viarum seu venarum, cyperus, schœnuanthum, crocus, iris florentiæ : quæ aperiat, marrubium, absynthium, pistacia, radix petroselinii : quæ concoquat & leniat, passulæ, ficus, vinum granatorum dulcium, vinum dulce : quæ abstergeat, mel, saccharum : quæ roboret, eupatorium, schœnuanthum, absynthium, rosa, spica : quæ præseruet à putredine, cinamomum, cassia lignæ : quæ siccet, spodium : rasura cornu cerui, eboris, à proprietate

proprietate conuenit, velut rhabarbarú, quod inde  
 vitam hepatis appellant, spica, lupinum iecur co-  
 chlearum carnes & limachú, atque inde distillatæ  
 aquæ passulæ, quas tota substántia familiares hepati  
 etiam Galenus agnoscit. Tantùm adstringūt, quā-  
 tùm opus est visceri concoquunt, roborant, mali-  
 gnitatem corrigunt, nec facîle corrumpūtur, vino  
 quoque magna vis tribuitur: roborat, coquit, pu-  
 tredinem prohibet, intemperiem frigidam & hu-  
 midam hepatis emendat. Contra virulentam ma-  
 teriam cinamomum primas tenet: deinde cassia  
 lignea, tum aromatum omne genus, nardus iuncus  
 odoratus, calamus aromaticus, myrrha, electrum,  
 crocus, aspalathus. Ex eiusmodi materia in puluere  
 trita ad 3. 2. electaria fiunt cum saccharo, vel melle  
 quadruplo, quintuplo: alioqui in passulato melle  
 incorporatur. Mel passulatum fit coctis prius pas- *Mellis passu-*  
 sulis ad crassitudinē syrupi, coctis, inquā, in vino, *luti prepara-*  
 adiecto saccharo. Exteriora verò sunt oleum rosa- *io.*  
 ceum, aliquādo adiecto chamæmelino, vbi calida  
 intemperies est. Nā in calida intemperie abstinē-  
 dum iis, quæ nimium refrigerāt, & leuiter refrige-  
 rando laxanda cutis est, vt transpiret vapor. Licet  
 quoque vti vnguento rosato, cerato santalino in  
 rosaceo dissoluto, vel cum eodē pisto & admoto.  
 Alioqui cerato refrigerante Galeni, subacto cum  
 succo cichorij & tantillo aceti albi. In frigida oleū  
 de absynthio, de spica, de maiorana, & quæ in fri-  
 gidiore vētriculo descripta sunt. Nam in hoc cō-  
 uenit hepar cum ventriculo, quòd vtrunque eget  
 iis; quæ adstringendo corroborant; nisi quòd ma-  
 gis adstringendum in ventriculo è chamæpythi.

Medium

# AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

Medium fit medicamentum similiter ex radicibus graminis sileris. Ad quantitatem decocti opus est ℥. 10. & ℥. 1. sacchari. Duo sunt reliqui affectus, quorum meminit Galenus hoc libro, humiditas hepatis & scirrhus. Itaque immodica humiditas vires hepatis dissoluit, quomodo vincula & neruacea corpora nimio humore imbuta dissolui solent. Signa humidi hepatis & humidioris ex arte parua Gal. petenda. Curatur autem adstringentibus, & ea materia, quę prius in humidioris ventriculo descripta est. Hoc tamen differt hepar, quia minus adstringentia desiderat. Humiditati aliquando frigiditas, aliquando caliditas coniuncta est. Itaque in frigidityte aromata, plantas, & materiam, quę adstringendo corroboret, & calefaciat, miscere oportet, quale, exempli gratia, fuerit cydoniatum cum speciebus. In frigidityte & humiditate plurimum conuenire scribit Gal. vinum, sed hoc sit tenue, odoriferum & natura calidum. Vteris fotu de absynthio, irino, de spica, & aliis, in frigidiore & humidioris ventriculo memoratis, eisdem oleis malaxatis. Emplastrum de meliloto, diachylum ireatum, mixto cydoniato, cum speciebus, dabis in potu, dianison, diacuminum, diagalanga, diatrion pipereon. Institues assas carnes confixas caryophyllis, & omnino ea alimenta, quę siccant & calefaciant: caliditate vero iuncta fovebis oleo rosarum, de cydoniis, myrtillorum, aceto addito, santalis, spodio, succo earum herbarum, quę hepar refrigerant, senecionis, hepaticę, cichorij, intyborum & similium. Atque huiusmodi herbis pistis ex eisdem oleis, puluere rosarum, santalorum, spodij, addito, finges veluti cataplasmata. In potu conueniet

*Hepatis minus adstringentia, quam ventriculo conueniunt.*

niet electariū diarhodon Abbatis, rosis, fantalis & spodio additis. Videndum tamen, vt ne nimium refrigeremus. Nimium refrigeratibus læditur hepar. Cerato fantalino plurimum vtuntur, quod addita parte cydoniati sine speciebus melius fiet. Malaxabuntur cum oleis prædictis, pauco aceto albo addito. In omni humiditate hepatis & totius ventris vehemēter laudatur cochlearum caro & limacum: sed si coniuncta est caliditas, frigidis condimentis & aceto temperatur. Contrā verò in frigiditate. Contrahit schirrum hepar propter venarum angustias. Schirrus tumor est durus, dolēs: initio curabilis est, cuius materia humor crassus, viscidus, frigidus, à quo nisi curetur, periculum imminet hydrophis. Morbi regij fiūt, & longę febres, & tabes corporis. Itaq; summa diligentia curari debet, & quia durus mollientibus eget: ratione materiæ crassæ, incidentibus: frigidæ, calefacientibus: viscidæ, detergentibus. Itaq; mixtio medicamentorum contra schirros hepatis molliat, incidat, tergeat, calfaciat, sitq; tenuium partium. Verum ratione partis affectæ in molliētibus eligentur ea, quæ id moderatè faciunt, ne nimium mollientibus substantia visceris dissoluatur: ac rursus oportet propellere, quæ tenuium partium calfaciāt, & ineidant: à quibus tamen periculum est, ne parte schirri dissoluta reliquum lapidosum & incurabile relinquat. Propterea vt dictum est, mollientia misceantur, foueatur schirrus ex oleis malacticis. deinde superponantur emplastra malactica, de meliloto, ceratum œsypi, diachylum ireatū, & similia, aceto mixto aromatibus, ad 3. 1. emplastri 3. 2. aut sesquidrachma: tritorum

## AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

tritorum aromatum misceri potest. Acetum additur ut penetret, ut incidat. Materiam scriptam inuenies cap. de malacticis, nisi quod ea seruanda ratio malacticorum & incidentium, quæ perscripta est. Hoc enim habet peculiare schirrus hepatis. Veteres plurimum utebantur caricis pinguibus, ol. irino, vel simili, inunctis & tepidis admotis in fotu. Hoc aduertendum, ne nimium frequens, neue longius adhibeatur. Nam inde periculum imminet relaxationis visceris. In potu eadem ratio seruanda est, ut scilicet, aliquid malacticum misceatur iis, quæ incidunt & tenuent. In malacticis esculentis efficacissimum est decoctum ficuum pinguium & similium, passularum, recentis quoque camæpytheos. In eiusmodi decoctis miscebuntur ea, quæ in morbo regio & hydropisi describuntur. Consensus veterum & recentiorum, ammoniacum tum foris adhibendum, tum in catapotis deuoratum plurimum facere ad schirros & oppilationes viscerum. Itaque ex ammoniaco & pul. hieræ, cuius vis magna est calefaciendo, incidendo, pilulæ fingi possunt, non quæ tam purgent, quàm quæ schirro curando conueniunt: è terebinthina quoque & eodem puluere ventilia catapotia formari. Alimenta, partim quæ molliant, partim quæ incidunt, tenuent & tergeant, propterea condimenta sicca erunt ex usu. Acetum passulatum misceatur, aut in quo diu insolato ficus, vux passæ, caryophyllum, cinamomum aliquoties commutata maduerint.

### *De morbo Regio.*

**M**Orbum Regium vocat, quia lasciuiis, cætu, delitiis, mulsa, vita soluta curis, & ut ait Serenus,

renus, Molliter hic quoniam celsa curetur in aula.  
 Causæ sunt obstructio, inflammatio, intemperies  
 hepatis aliquādo lienis, vesicæ fellis, pororum, per  
 quos flaua bilis ad ieiunū descendit, aut per quos  
 fæx sanguinis ab hepate ad lienem fertur. Oportet  
 itaq; interrogare ægros qua parte vel dolorem, vel  
 grauitatem, vel tensionem sentiant. Aliquando cri-  
 ticus est hic morbus. flaua bile è vasis diffusa in cor-  
 pus, aliquando venena hunc morbum faciunt. Sed  
 in inflammatione necessario febris est, & alia acci-  
 dentia, quæ se proferunt in inflammatione. Quæ  
 est citra febrim & inflammationem, tensio est, &  
 grauitas in dextro ferè hypochondrio, excrementa  
 albicāt, cineritia sūt, & argillofa, vrina specie crassa  
 admodum, crocea, aut nigra, cum spuma eiusmodi  
 coloris. Pulsus neque celer, neque languidus, cre-  
 brior tamen, minor, & durior. Galenus morbum  
 Regium citra febrim cum grauitate in dextro hy-  
 pochondrio hac ratione curat. Primum cibus &  
 pharmacis aperiētibus obstructiones vitur, dein-  
 de medicamentis purgantib. Atque hic meminisse  
 oportet, in grauib. obstructionib. quales sunt in  
 morbo regio, periculosas esse validas purgationes,  
 nisi prius medicamentis obstructa liberātibus vias  
 aperuerint. Propterea Hippocrates, corpora cum  
 quis purgare voluerit, oportet fluida facere. Intelli-  
 ges medicamenta aperientia & purgantia aliquid  
 effecisse, cum iam pro albicātibus & cineritiis ex-  
 crementis alui, cœrulea & admodū flaua deliciun-  
 tur, cumque vrinæ ad colorem naturalem pro-  
 prius accedunt. Aperiant oxalidis folia & radix gra-  
 mē, asparagus, cichorium, eupatorium, apium

*Purgationes  
 valentiores  
 in obstructis  
 periculose.*

## AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

adanthum, herbæ capillares, calamentum, calaminta, ancusa, fœniculû, gétiana, iris, aristolochia, cinamomum & aromata, melanthium, securidaca, fumaria, chamæpythis, rosmarinus, serpillû, marrubium, asarum, anisum, hyssopus petroselinum, absinthium, cappares, radix tamarisci, asparagi, rusci, capparis. Cócocoquûtur hæc vel per se, vel cum aliis: vt inde fiat oxymel conditû cinamomo. Hinc quoque syrups fiunt, quanquam plurimû vtuntur syrups de endiuia, de cichorio, capil. veneris, de bizantiis, de duabus vel quinq; radicibus. Vtûtur quoq; vermibus terrenis, asellis, musco, qui in tegulis nascitur, & vocatis ardesiis, rasura eboris, cornu cerui, pudendo viuerræ, vulgò de furet. Sed vehementer laudant, & iusta quidê ratione, ammoniacum, cui ad miraculum vsque vim inesse volunt liberandi obstructions, vt certo euadant, quibus iâ à morbo regio imminet hydropisis. Teritur ammoniacum, datur in hydromelite, vel oxymelite. Soluitur oleis chamæmelino, amygdalarum amararû, de fraxino, & similibus, aut Alcumistarum arte oleum inde distillatur, quod illinitur, & bibitur.

Potiones plurimum probant à balneo, iubentque ægrum epoto medicamento decumbere in latus dolens. E materia quoque descripta fiunt puluisculi, qui cõditi aromate & saccharo exhibentur in potu, alioqui inde fiunt electaria, aut pars miscetur electario diarrhodo. Sunt & aquæ distillatæ, quæ conueniant endiuia, cichorij, lupulorum, cuscutæ, fumaris, capillarium, acetosa, terebinthinæ graminis, raphani, apij fœniculi, lappæ, rubæ tinctorû, tribuli, lybistici, rusci, asparagi & similiû.

In



In alimentis sæpè vtetur radicibus esculētis vt acetosæ: petroselinī, graminis, cichorio toto, cicerum decocto, capparibus, asparagis, lupulorum extremis, stipulis articanlis, quas vocant Lutetię Cardes vino tenui, quod vel aquis memoratis, vel decocto rosmarini dilui potest. Quod ad phlebotomiam attinet, vbi videbitur sanguis redundare, aut fuerit suppressa aliqua vacuatio, liberius detrahes sanguinem è basilica dextra: aut venis extremæ manus. Resistentes menses: aut hæmorrhoidas excitabit. Galenus vsu eiusmodi aperientium & pharmaco purgante sæpè vno die curauit ægros. Quod si cōtumax videbatur malum: vtebatur validius tum aperientibus, tum purgantibus. Constat experientia decoctum ligni sancti multis profuisse. Color fœdus relictus frequenti balneo curatur, vbi iam causa interior sublata est. Galenus vtebatur dacrydio. Vtemur agarico, puluere hieræ diacolocynthidos, rhabarbari, mistis & diaphenico & diapruno: in intemperie, aut morbo regio, qui est à crisi, neque purgantibus, vacuantibus aut aperientibus vtendum est. Redeundum verò ad ea remedia, quæ descripta sunt in imbecillitate hepatis. Ab intemperie calida in crisi res est committenda naturæ: nisi quod balneis laxantibus & detergentibus cutem, humidiores victu & diluente vtendum est. In primo genere quidem ab obstructione clysteres acres plurimum possunt, qui scilicet, naturam trahunt, vt iam non effundat bilem in corpus, sed ad intestina mittat. Aliquando est hic redeundum cōtra schirrum hepatis. In venenis initio quidem vomitus, si eò vertit natura, si ad intestina,

*Color fœdus  
frequenti bal-  
neo curatur.*

## AD LIB.VIII.D E C O M P . M E D I C .

clystere acri. In habitum corporis, cucurbitulæ cū flamma & scarificatu. Danda autem per os, quæ contra genus veneni faciant.

### *De splenicis.*

**S**plenicos vocant, quibus lien induruit, addunt Alij ab humore melancholico. Multa sunt indicia, quæ splenicos arguunt, grauitas & circumscriptus tumor in sinistro hypochondrio, difficultas spiritus, sitis, siccitas oris, pedum & pudendorum inflatio, color malus, plumbeus, decubitus in sinistrum latus, grauis dolor ad iugulum sinistrum tendit, vbi grauior tumor. Quibusdam scatent pediculi, noctu sudor grauis, halitus foetet, erumpit sanguis è naribus, & aliis partibus gingiuæ & dentes corrumpuntur magis parte sinistra, venæ ad lienem nigricant, scaldior cutis est, maximè ea parte vlcera maligna, in cruribus cicatrices nigre, aluus adstringitur. Horum aliqua vel omnia splenicos ostendunt.

In primis leui pharmaco, vel clystere mollienda aluus, detrahendus sanguis, repetita bis vacuatione in duos dies (inquit Galen.) è basilica sinistra, satis amplo foramine, alioqui è vena medijs digiti, vel minimi. Alij venam post aures diuidunt, voluntq; plurimum prodesse, si eo sanguine, qui effluit, statim illinatur regio lienis. Cõstat quoque raro quidem experimento venas apertas, quæ ad lienem turgent & nigricant, splenicis plurimum profuisse. Distingendum quoque qua parte visceris tumor constiterit. Nam si superiori parte, pharmacis purgantibus per interualla vtendum erit, si inferiori, clysteribus acribus vti conueniet.

*Lienis tumor  
superiori par  
te consistens  
purgantia  
pharmaca,  
inferiori, ene  
mata postu  
lat.*

Sed

Sed pharmaca & clysteres per intervalla imperantur, quibus intervallis, medicamentis aperiendis, incidentibus, mollientibus utendum erit, ut præparata materia melius sequatur. Itaque & ea, quæ prius descripta in scirrho hepatis, & hæc peculiariter cōvenient, & cortex radice capparis, radix tamarisci, polypodium quernum, scolopendrium, & omnes capillares, rosmarinus, semen agni casti, endiuia, scariola, portulaca, acetosa, cuscuta, semina frigida maiora & minora, cortex & radix salicis, fraxini, genestæ, flores hyperici rosmarini. Abstinentium deinde iis, quæ nimium calfaciunt, nisi frigidis temperentur.

Ex omnibus in aqua coctis oxymel cōparetur. Purgationes ex epithymo, cuscuta, foliis senne, polypodio, diasenna, catholico, agarico, diapruno, cōfectione hamech, electario Indo, syrupo de fumo terræ, in oxymelite, sero lactis, decocto scolopendrij, ut melancholicam purges & pituitam. Laudatur aqua fabrorum consumendo scirrho, in qua ferum fuerit sæpius extinctum, præterea aqua depurata, & benè colata, quæ collibus defluit in alueolos eorum, qui acuunt gladios & enses, lixivium farmentorum, oxymel, acetum scylliticum, syrupus acetosus, capillorum veneris, de duabus & quinque radicibus, de fumo terræ, de scolopendria, de pomis, de epithymo.

Diluuntur syrapi in oxymelite simplici, vel Galeni: in sero lactis, in aqua cuscute, acetosæ, borraginis, fumiterræ. Conuenit frequens capparū vsus, asparagorum, extremitatum lupuli conditarum, florum genestæ & violarum, cardorum, sunt autem

## AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

cardi, caules cynaræ, qui per hyemen eduntur. A proprietate conueniunt lien bouis, asini syluestris, vespertilio decolatus & siccatus, splen asini domesticici, pulli egurini cremantur in testa, puluis drachmæ pondere, potionibus, quæ conueniant, inspergatur. Laudant poculum ex fraxini ligno. Quod autem ad topica remedia attinet, ea arte fient in molliendo & resoluendo scirrhum, quam inuenies capite de Malacticis. Peculiariter conuenit ammoniacum dissolutum aceto, deinde pistum cum oleo de capparibus, vel liliorum, quo quidem ammoniaco eo modo vtendum, qui dictus est in scirrhophepatis.

Vteris similiter emplastro de meliloto, dialtheas, æsypi cerato, diachylo descriptione Philagrii. Solet conspergi puluis ceterach, corticis radice caparis, limaturæ chalybis leniter remollito scirrhophepatis, ad vsum aceti descriptum capite de malacticis, ad vehementem dolorem splenis, tumorem, punctiōem, duritiem. Mirabilis puluis diacapparum. ℞. corticis radice caparis ʒ. i. seminis acetosæ ʒ. ʒ. corticis radice tamarisci ʒ. ʒ. terantur in puluerem. Datur media nocte, & inter paltus cum oxymelite. Oportet ægrum in sinistrum latus decumbere, quemadmodum in aliis potionibus spleniticis, tres horas à medicamento sumpto ieiunare. Conueniunt trochisci de eupatorio, & de capparibus. Quod si videbitur rugitus quidam & flatus, intermiscendum quæ flatus discutiunt, piper, cuminum, ruta, daucus, anisum, apium, carum, petroselinum, lybisticum, galanga, & alia id genus.

*De colicis remediis.*

**Q**VÆ hic scibuntur vel anodyna sunt vel ad dolores colicos à frigore & flatibus referuntur. In narcoticis plurimus est vsus Philonij, quod antea descriptum est capite de sputo sanguinis. Vrimur quoque pilulis de cynoglossa, quæ contra omnes istiusmodi morbos valere dicuntur. Ad hæc floccis suspensis de filo, & immixtis recto intestino, glandibus seu suppositoriis, in phlegmatica materia vtendum incidentibus, detergentibus, & calfacientibus, qualia descripta sunt in frigidioris vetriculo & hepate. Plurimum laudatur quod sequitur parabile. ℞. piperis grana 3. salis ̄. i. trita dentur cū vino in iure veteris galli. Allia coquuntur, & adiecto pipere sorbetur ius. Sunt qui vel capū, vel pionem, vel alaudas, nucleis alij infarciant, & ita iubeant edendas aues. Alexandrinus tres bulbos alij vespere sumptos flatibus discutere, & phlegma deducere scribit. Sunt qui plurimum tribuāt vino maluaticio diluto aqua maioranæ aut nepithæ, additis ̄. 2. castorei. Alij lauri baccas nouem aut vndecim terunt, & cum vini tenuis & odoriferi ̄. 3. 4. β. facto experimento propināt, item folia raphani cum septem granis piperis decoquunt, & inde melicratum parāt, quod mirabiliter facit nephriticis, colicis, & quibus vrinales viæ obstructæ sunt. Ol. ruta. nardino, laurino, de cado, raphanino, napino, de piperibus lanas inculcant, & calidas admouent ventri: alioqui in eisdem ol. quartā partem galbani dissoluunt, adduntq; aliquid ciuetæ & croci. & ita illinunt, in flatuosa eadem remedia conueniunt, & affixæ cucurbitulæ vmbilico in calida, & biliosa;

# AD LIB.VIII.DE COMPO.MEDIC.

inedia,quæ alios colicos iuuat, vehementer lædit, vbi narcoticis potissimum vtendum est, clysteribus mollibus ex radice althææ & foliis, malua, violaria, mucaginibus seminis lini, althææ, psyllij, cydoniorum, adiectis capitibus papaueris, vitel.oui, violato, vnguento rosato. Aliquando clyster iniicitur ex hordeato liquidiore, adiecto syrupo violato de papauere, nenuphare. In horum colico dolore cataplasma conuenit Alexandrini. ℞. farinæ lini & hordei, vel fabar. ana M. 2. coquantur in ol. chamæmel. fiat cataplasma. Alioqui.

℞. ol. chamæmelini & ros. ana ℥. i. ceræ ℥. β. fiat ceratum. Muccaginis seminis lini ℥. i. cum farina fabarū subacta ex vitellis oui fiat cataplasma. Sūt qui experimento laudant hanc potionem. Seminis viol. ℥. 4. dantur ex vino diluto, Physica remedia sunt coralli triti cochleare, dandum ieiunis per tri duum cum vino: item stercus lupi cum aqua repida, cornu cerui vstum particula incisi vmbilici infantis nuper nati, aurea vel argentea armilla induitur & circumfertur, cingulum è corio lupi gestatum, masculi maribus, fœminæ fœminis, stragulæ quoque lectorum inde fiunt. Alij pellem gestant, aut eiusdem lupi stercus nucula includunt, suspendunt è collo, vt ad ventrem perueniat. Suspendunt autem ligula è corio ceruino aut filo texto ex ouil la lana, sed ouē volunt interfectam à lupo. Alij vero euasisse à lupo. Laudatur & anguillæ sanguis, & cristatū alaudæ genus, stercus gallinæ, quæ exeretur & nutritur pabulo sicciore, tunica interna ventriculi erinacei, masculi quidem in viris, fœminæ in fœminis & mulieribus. Hæc quidem scripta à

Græcis

Græcis & Arabibus trita in puluere aliis miscen-  
tur, quæ aperta qualitate iuuant piperi, castoreo,  
& aliis id genus. Dantur ex melicrato.

*De priapismo.*

**P**riapismus, qui & Satyriasis dicitur affectio  
est, cum minusculum pudendum inuito tumet  
& inflatur, vel vt 6. de locis affectis, cum colis in  
longum & circuitum augetur, nullo desyderio ve-  
neris stimulante. Addit Galenus, oportere inflatio-  
nem eiusmodi esse stabilem. Quibusdam enim su-  
pinè decumbentibus, aut aliter concalfactis reni-  
bus, inflatur colis, sed affectio non est permanens.  
Nomen ductum à Priapo deo hortorum, cuius co-  
lis ita fingeretur. Causa mali spiritus insinuaturs fi-  
stuloso nervo, qui penem constituit. Addit quo-  
que 6. de locis affectis amplas & parentes arterias,  
quæ ad pudendum perueniunt, concepto multo  
spiritu hoc symptoma efficere. Aliis locis Galenus  
generationem huius ita describit. Materiam facit  
humorem crassum & viscidum, qui à calore lāgui-  
do motu resoluitur in crassum spiritum, licet ali-  
quando tam crassus, & viscidus humor sit, vt vel à  
calore naturali in crassum spiritum nō resoluatur,  
initium huius mali præcedente palpitatione intel-  
ligitur. At vbi ab arteriis amplioribus malum est,  
nō præcedit palpitatio. Sed vsu alimentorū acriū,  
longa abstinentia veneris assuetis, diutius præcin-  
ctis, tētigo frequēs mouetur, & hinc flatib. deorsum  
motus arteriæ ampliantur. Idem accidit acrimonia  
humorum, sed præcipuè iis, qui multum sanguinis  
& seminis colligunt, atque imaginationibus vene-  
ris indulgēt. Sic iis, qui iam à pubertate veneri in-  
hh s dulgent

## AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

*Priapismi  
remedia.*

dulgent, & sæpiùs imaginantur, frigidior colis esse solet, contra verò robustis athleticis. Rarò aut nunquam coëuntibus, vel venerem imaginantibus rugosus & exiguus colis esse còsuevit. De priapismo 14. Methodi, 6. de symptom. & morbis, 6. de loctis affectis, & hoc libro. Initio sanguinem detrahes præsertim iuuenibus, quibus hoc malum familiarius. In humorum acrimonia purgabis. Vteris clysteribus, ad hæc frictionibus, inedia, balneis, vomitionibus, quas præfert Galenus purgationibus, ac breuiter eo genere vacuationis vteris, quod & morbo & naturæ ægri magis conuenire videatur. Iube bis ægrum defugere omninò imagines veneris, & quæ venerem excitant. Initio non oportet mēbra calfacere, sed leuiter refrigerare, primùm quidem cerato rosaceo in aqua soluro, vnguento rosato, cerato còparato ex cera, oleo nenupharino & chamæmelino. Ex quo tum lumbis, tū pudendis illini debent, & perinæo. Institues tenuatē victum citra caliditatem manifestam, & ea quæ incidunt materiam crassam, & viscidam detergent, quale est oxymel, & alia iam multis locis descripta, imperabisque ea, quæ à proprietate contra morbum faciūt, nympheam, eius semen vel radicem, semen viticis, id est, agni casti, & post aliorum vsum, rutham.

*De hæmorrhoidibus excitandis.*

**H**æmorrhoidibus non est assuescendum, nisi Had curationem, vel cautionem grauioris mali, epilepsiæ, melancholiæ, incubi, quartanæ & morborum id genus. Si quando tamen excitandæ sunt sanguifugis benè purgatis & electis facilè irritantur, exasperatibus medicamentis, vt folio ficulneo, pumice



pumice, medicamentis acribus, cępa rubra, præfer-  
tim pipere, nitroſis, ſale torrefacto, alumine: vel ter-  
gentibus & acribus felle taurino, ſtaſiſagria, ab-  
ſynthio, centauryo, ciclamino, athanaſia, matricaria  
& aliis id genus. Talia teruntur in puluerem, alia  
teruntur & exſiccantur, pulueres ſuccis permiscē-  
tur ad craſſitudinem iuſtam luti, aut melle concor-  
porantur, & circulo ſedis illinuntur.

*De vitis ſedis & pudendorum.*

**V**Lcera harum partium iisdem medicamentis  
ferè egent, ſed in ſede difficilis curatio, & q̃a  
vegetiore ſenſu prædita eſt, non fert, quę vel auſte-  
ritate vel acrimonia exaſperant, quia humida & ca-  
lida facilè putreſcit, deinde quia eo peruenientes  
venę multę ſunt, quę illic deſinunt. fluxiones reti-  
net, vnde humidiora vlcera, calloſa & fiſtuloſa ſiūt.  
Præter hæc naturalibus excremētis ſæpius ex par-  
tes madescunt, propterea quę illita excrementa de-  
tergent: vnde omnino difficilis curatio. Commune  
eſt auxilium ſedis & pudendi vlceribus à medica-  
mentis quę ſiccant citra morſum. Ea materia iam  
deſcripta in ocularibus medicamētis, & quę pecu-  
liariter conueniat, c. de ſarcoticis & epuloticis. At  
in vlceribus malignis partim ad ea quę ſupradictis  
capitibus, decurrendū contra maligna, depaſcen-  
tia, & putrida vlcera, partim ad ea, quę iam vſitata  
ſunt, ad ægyptiacum, puluerem mercurij, vnguen-  
tum de Vigo, miſta parte vel ægyptiaci, vel pulue-  
ris, mercurij: ſimiliter ad aquas fortes, ad illitum  
quoque in ſine ſpinę & inguinibus ex vnguentis  
mercurialibus.

*De*

## AD LIB.VIII.DE COMP.MEDIC.

*De iis, qui noctu permingunt stragulas.*

**A**B infirmitate musculi, qui vesicam claudit, mollitie neruorum, accidit pueris, vt noctu permingant stragulas. In quibus remedia sunt, partim quæ qualitate muscolum corroborant, partim quæ occulta proprietate morbum tollunt. Itaque & perinæum, & spinæ extremum, & radix colis decocto earum rerum, quæ corroborant, fouenda sunt. Deinde vnguentis & emplastris, quæ id efficiant, vtendum. Itaque decocto menthæ, rosarum, absynthij, calamynthæ, saluię, stœchados, lauendulæ, maioranæ, rosmarini, pulegij, polij, chamæmeli & similibus fouendæ partes. Decoquantur vino ex eadem materia, vino & ol. cocta ad vini consumptionem. Linimenta comparantur ex oleis: addita cera subquadrupla, mastiche, thure, suboctuplis, cerata fiunt. Iisdem oleis molliuntur emplastra de meliloto, diachylum, iride adiecta: & mollia in aluta prædictis locis affiguntur. Proprietate cōueniunt eritij caro, cerebrum aquilæ, renes & testiculi leporis, quæ omnia edi possunt, vel vino incoqui, vt bibatur vinum. Adhęc pulmo hædi, lingua anseris, guttur galli, vesica tauri, caprę, ouis exsiccata, tritaque in puluerem. Dantur ex vino dormituri. Probant & enulam, & calamintham, thus, ben, cyperum, coriandrum præparatum, myrrham, mentham, galbanum, castoreum, seseli, lac ouillum & caprinum. Vulgare remedium est esus murû. Sunt & qui cinamomum, lignum aloës, spicam, saccharum rosatum, rosas, pulueribus à proprietate iuuantibus permisceant.

*De*

*De praefocatione vteri.*

**P**raefocatio vteri grauissimum malum est & periculosum: nasciturq; ferè tribus de causis, quæ <sup>Vteri praefocatio tribus suscitatur ex causis.</sup> in vnam coeunt, hoc est, vehementem refrigeratione totius corporis. Primaria causa suppressio menses: altera suppressio feminis, iis praesertim, quæ prius omnino veneri indulgebant: tertia causa, cum quæ antè concipiebant, iam non concipiunt. De praefocatione vteri lege c. 5. lib. 6. de locis affectis. Sensu motuque priuari solent & respiratione, aut certè tam obscura est respiratio, vt non appareat: vox quoque deficit. In leuiore malo motus, sensus ratio, vox, & respiratio seruantur. In paroxysmo extremorum vincula & frictiones maxime crurum, cucurbitulae inguinibus affixæ, odorata vtero, grauiter olentia naribus admoventur, vt castoreum, galbanum, gages lapis, bitumen, pix liquida, pili combusti, cremati paniculi, cornua vsta, plumæ crematæ, euphorbium, quo ferè vulgus vtitur, veteres soleæ calceorum crematæ, quas & potui dare solent: frequenti experimento rutham, naribus admovent, quam & Galenus probat: capam & allium. Odorata verò, quæ vtero adhibentur: ciueta, gossipium moschatum, ol. de spica de costo, caryophyll. gallia moschata, alipta moschata. Hæc in puluerem trita oleis dictis permiscuntur: vt fiat luti crassitudo, & ita sinui pudoris illinuntur. In suppressis mensibus sanguis detrahi potest. In potionibus post paroxysmum veteres probant agaricum ex vino. Datur & terebinthina & puluis hieræ dialococynthidos. Laudantur semen & succus platanis, semen agni casti, rutha, radix nimpheæ, in iis, quæ

## AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

quæ nimio semine abundant. Præterea vomitiones imperant, sternutationes, cucurbitulas inguinibus coxis, ilibus, deinceps affixas cum multa flamma. Hypochondria fasciis ligant: & constringunt, globuli filii inculcati oleo anethino calido alternatim pectini apponuntur, propinant puluerem blattæ bizantiæ. Post alia quoque remedia dropaces & sinapismi extremæ spinæ appositi, balnea naturalia, frequens coitus.

### *Ad Rhagadas.*

**R**hagades vlcera sunt vteri & sedis diducta in fissuras. Sed alia humida & saniosa, alia collofa, quædam cancrofa sunt. Saniosa abluuntur sero lactis, mulfa, deinde tetrapharmaco dissoluto in rosaceo illinuntur. Postea medicamentis consolidantibus: quæ paratur è lithargyro. Collofa egent mollientibus, æfypo, radice lilij, terebinthina, admista parte iridis florëtis, alioqui vitellum oui assum cû lacte muliebri pistû appones. In suspitione canceri diapompholygo Nicolai mollito, liquido cerato, rosaceo illines. Quòd si callus est coniunctus, adicies aliquid mollientium, butyri, adipum, & mucaginum: vbi calor, vitellus oui permiscetur: vnguento quoque de cerusa, de plumbo, tuthia, & aliis, quæ contra canculos scripta sunt, vteris.

### *De Nephriticis.*

**N**ephriticis propriè vocant, quibus calculus in renibus concreuit. Galenus hoc loco extendit nomen ad eos, quibus renes inflammantur, aut exulcerati sunt. Dicemus primùm de calculo; atq; vt distinguatur nephriticus dolor à colico, legendus est liber de locis affectis, caput primû & secundum.

& secundum sexti libri eiusdem operis. Sæpè enim fallit colicis dolor, ut putetur esse nephriticus, & contrà, propter connexionem communem renum & coli per peritonæum, itaque ex dictis locis distinguere oportet. Calculi signa & curationem, breuiter describit Hippocrates 6 epidim. his verbis. *In renem dolor grauis, cum cibo, hoc est stercore, repletur.* Stercus enim resistens in cæco intestino & colorem opprimit. Sequitur, *vomuntq; pituitam*, exasperatis doloribus. æruginosa pituita primum euomitur quæ in ventriculo generatur, & ad primos impetus educitur, deinde dolore commotis humoribus non solum æruginosa, sed & biliosa. Subdit Hippocrates, *facilioresque sunt*, subducta, scilicet parte materiæ, quæ ad dolentem locum confluebat. Sequitur, *soluuntur, cum cibo vacuantur*, hoc est, stercore, iam non oppressis renibus, ut prius, arenulæ fulvæ subsident, sanguinolentum mingunt, eiusmodi arenulæ ferè rufæ ac rubentes, certissimum signum faciunt calculi. Mingunt sanguinolentum, iam renum facultate retétrice imbecilliore, vel renibus exulceratis, femoribus, quod è directo est, stupor per consensum, non neruorum, ut quidam voluerunt, sed venæ cavæ, & propterea dolor stupidus. Subiicit curationem Hippocrates. *Quiescere non conferi, sed exerceri*, mediocriter, scilicet, ut materia, quæ calculum cogit, & concoquatur, & celerius vacuetur. *Non repleti*, repleto enim corpore cruditas ad dolentem locum confluit. *Iuvenes elleboro purgare*, nunc non helleboro, sed leuioribus medicamentis & clysteribus purgamus. *Poplitis venam secare repleto corpore*, basilicam prius secamus, & maxime

# AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

maximè ubi magna imbecillitas renum est. *Cientibus* *urinam purgare* non perpetuò, sed iam benè purgato corpore, & ubi nulla inflammationis suspicio est. At *tenuare crassam, viscidā. & coactam materiam emollire*, hoc est, mollia & laxa reddere tum renes, tum corpora, per quæ calculus deducatur foras, sic enim laxatis viis & mollitis, facilius & nulla vi vel minore, exhibet calculus atque in iis duobus tenuando materiam calculi molliendo corpora, per quæ excludatur, non solum efficies ut exeat calculus, sed ut ne postea regeneretur. Hæc ex Hippocratis & Galeni sententia, qui post Hippocratem molli- bus, & anodynis clysteribus leniunt dolores, & aluum subducunt, Phlebotomia similiter & purgationibus utuntur, nunc cassia, catholico, rhabarb- ro interim addito, similiter tenuantibus, inciden- tibus detergentibus & mollientibus medicamētis utuntur, balneis quoque vias molliunt, cucurbitulis detrahunt calculum, quas ilibus affigunt. Ad hæc omnia syrupis utuntur, potionibus & pulueribus, qui tenuant, incidant, & molliant, in quibus pluri- mum conuenit syrupus comparatus ex floribus, fo- liis, seminibus & radicibus althææ, additis radicibus graminis, acetosæ, seminibus cucumeris, saccharo, & melle. Laudatur & conserua ex iisdem floribus & foliis comparata, oxymel, decoctum glycyrrhizæ, be- tonicæ, lupulorum capparis, scolopendriæ, herba- rum capillarium, quibus fortiora sunt, quæ paran- tur è scylla, iride, enula, aristolochia. A proprietate iunat sanguis draconis, lapis hæmatites, ol. de scor- pionibus, bestiolæ, quæ in lapidariis fodinis, quasi verrucæ, lapidibus hærent, pellis leporis cremata, lepus,

*Calculo quæ  
conueniunt à  
proprietate.*

lepus, vel decolatus, vel integer crematus, eiusdem  
 renes cremati, cinis vngulæ equi, testa cochleæ &  
 cancrorum, terreni vermes, aselli, anis. quæ cauda  
 tremula dicitur, calculus, quem quis primum exclu  
 sit, vrina capræ montanæ, lac excornis & nigræ ca  
 præ, cicadæ aridæ, decoctum galli lassati. Hæc à  
 proprietate conueniunt. Qualitate verò manifesta  
 parietaria, valeriana, succus portulacæ siccatus, cu  
 curbitæ semen, perforatæ, lini, cucumeris, maluæ,  
 fœnugræci, apij, seseleos, radix damazonij, cyperi,  
 asari, rusci, asparagi, capparis, tamarisci, cynosbati  
 fructus detracta interiori lanugine, fenellæ vocatæ,  
 gummi & nuclei cerasorum, persicorum, cortex  
 viridis corili, testa auellanæ, farnēta vitis vītæ, ex  
 tincta in oxymelite, vt colatura bibatur, electrum  
 lapis spongiæ, saxifragium, & alia propè infinita.  
 Ex decocto aliorum paratur oxymel, hydromel,  
 sacchar. alia trita in puluerem. Addantur decoctis,  
 vel per se bibantur ex ol. de scorpionibus, & cuni  
 culorum adipe, lumbi, perinæum, ilia, pubes illi  
 nuntur, conueniunt aquæ chamæmeli, betoricæ,  
 genistæ, parietariæ, fabaceorum, raphani, &  
 ex materia commemorata. Aqua & ole. è terebin  
 thina, è ciceribus & bismalua. Et hæc quoque pilu  
 læ laudantur. ℞. lapidis Iudaici, lyncis, spongiæ ana  
 3. i. nucleor. mēspilorum 3. β. tragacanthæ, gummi  
 cerasorum & persicorum tantundem. Teruntur  
 omnia & incorporantur in 3. i. terebinthinæ, pro  
 tribus dosibus. Conuenit & lithontribō vocatum,  
 & Iustinianū, alkekengi semina, bacca lauri & iu  
 niperi. Coguntur hæc cum glycyrrhiæ & radicis  
 enulæ decocto, ex melle vel saccharo propinantur.

*Calculo quæ  
 conferant ma  
 nifesta quæ  
 litæ.*

## AD LIB. VIII. DE COMPOS. MEDIC.

*De inflammatione & exulceratione renum.*

**I**N inflammatione renum clysteribus potius, quam medicamentis purgantibus utendum. Parantur autem initio ex remollientibus, scilicet, decoctione remolliuina, deinde etiam mistis lenientibus, ut chamæmelo & similibus. Olea sint violaceum, nenupharinum, papauerinum, postea quoque butyrum recens. Oportet autem modum clysteris esse ad quartaria tria, aut **℥.i.** Mollita aluo detrahendus sanguis è basilica, quæ inflammato reni respondeat, atque aliquando procedente malo phlebotome iteranda est. Arabes iterant è cephalica, vel poplite. Cataplasmatibus primum utendum è decocto maluæ, bismaluæ, rosarum, violariæ, in quo postea coquatur farina hordei ad crassitudinem, deinde cum ol. rosaceo, oui albumine & vitellis o-morum, tantillo aceto adiecto, fiat cataplasma. Procedente morbo puluis chamæmeli farina lini & scenogræci, puluis absynthij & alia, quæ leniunt, coquunt, discutiunt, miscere cõuenit. Postea quoque cucurbitulæ affiguntur lumbis & ilibus cum scarificatu. Utendum foci è vesica hidrelæo plena, quod hydrelæum ex decocto & ol. conuenientibus paratum est. initio quidem iis, quæ circa initia conuenire dicta sunt, postea verò mutata, ut prius, materia. Initio abstinendum vino & mellitis, quales sunt syrupi, hydromel, oxymel, &c. Atque diureticis nutriemus iusculis è pullastro, lactuca, acetosa, portulaca, borragine & hordeatis. Biber aquam hordei. Postea apparëtibus iam vrinis crassis & sedimenti boni, quæ prius tenues, æquosæ vel rubentes apparuerint, diureticis utemur, applicabi-mus



mus emplastrum de muscillaginibus, pistum ol. chamæmelino vel irino, poitea quoque emplastro de meliloto. In exacerbationibus dolorum, incessionibus ex decocto brimaluæ, maluæ, violariæ, chamæmeli, anethi, meliloti, fœniculi, atque vrgentibus doloribus nimium & vigiliis decocto papaueris, cuius semen miscebitur hordeatis, philonio item & aliis potionibus narcoticis vtendum erit. Sed aliquando non coquitur, per vrinas scilicet, sed suppurat. Itaque signis apparentibus suppurationis, fotu, incessione, emplastris, cataplasmatibus, clysteribus vtetur ex materia suppurante institutis, quam scriptam inuenies capite de suppurantibus. Atque contingit aliquando suppurationem resistere, vbi acrius clysteribus irritare oportet, dandumque in potu hydromel comparatum ex decocto fœnugræci, parietariæ, althææ, semine cucumeris. Quod si dolor vrget, incessionibus vtendum ex materia mitigante, hordeatis, lacte vel emulsione amygdalarum. Iam et tunc pure animaduertendum quale pus sit. Nam si liuidum & grauius olens, pauca spes est, alioqui bene sperandum. vtendumque syrupo de althæa, de iuiubis, lacte asinino, melle, diatragacantho frigido, diaireo simplici, alphenic, & similibus, vt vel dolor, vel necessitas vrget, lacte amygdalino cum multo saccharo, tum purioribus vrinis euntibus, lacte bubulo & ouillo potius, quam aliis, vtendum est, atque aliquando asinino, equino, caprillo. Bubulo quidem vtendum est, sed adiecta quarta parte feri. Conueniunt quoque forbitiones vsitæ ex lacte & vitellis ouorum, atque omnino multus sit vsus lactis, nisi corrumpatur.

## AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

Vbi sanguis fluit, iis quæ sanguinem sistunt & adstringunt, vtendum erit. Resistente aluo pilulis ex aloë, & rhubarb. terebinthina, cassia, cū multo diatragacantho vtendum. Et quia dolores sæpe vrgent, femicupia, id est, incessiones, comparanda ex decocto rerum, quæ leniant. Simili foru & sacculis vri oportet. Pulveres quoque, quos cordiales vocant, alimenta boni succi omnino instituenda sunt, quia animi deliquiis sæpè capiuntur, & plurimum emaciantur. Itaque ad animi deliquia, morbum & maciem plurimum faciet decoctum ex passulis, adiectis aliquot iuiubis, ficubus, glycyrrhiza, semine cucumeris. Coquantur autem ad crassitudinem syrupi. Deinde misceatur diatragacanthum frigidum, diatris simplex, tabulæ vtriusque diamargariti, de gemmis, lætitia Galeni, & similia, eoque vtatur sæpius, è cochleari. Quod si vrgetur siti, optimum hordeum coquatur ad putrilaginem, deinde emulsio aliquot tritarum amygdalarum, adiecta parte eius aquæ, decocto misceatur. Condiuntur omnia saccharo & diatragacantho frigido. Poterit vis augeri adiecto nodulo ex seminibus cucumeris, medulla feminis cucurbitæ. In remissione mollibus frictionibus vtendum mollibus stragulis, & omnino alimentis boni succi.

### De Arthritide.

Arthritidis  
causæ.

**N**omine Arthritidis podagram, chiragram & morbum coxarium includimus. Nam aliquando hæreditaria. Perè autem eius causæ intemperies, imbecillitas partium, & affluxus humorum

morum. Itaque in vacuando & roborando curationis summa posita est, ac præcedit quidem vacuatio totius corporis, in plenitudine per phlebotomiam, quæ in coxario morbo, primum in cubito, deinde in malleolo fieri debet. Arabes initio coxarij morbi phlebotomiam laudant, & intervallo annularis & parui digiti. In podagra & chiragra opposito membro è directo vena secanda est. In cacoehymia purgationibus vtendum, vomitionibus, clysteribus, deinde etiam sudorificis & diureticis. In topicis, initio repellentibus vtendum. In coxario morbo abstinendum iis, & statim mitigantibus vtendum, quæ neque multum calfaciant, neque refrigerent. Repellunt ceratum rosaceum, nutritum solutum rosaceo, vnguentum rosatum, ceratum de psyllio, & alia quæ scripta inuenies cap. de repellentibus, quemadmodum & quæ mitigant dolores, forus, ol. cerata, acopa, myracopa, capite de dolore. Aliquando narcoticis vtimur, primum quidem leuioribus, deinde fortioribus eadè ratione, quæ eodem capite de dolore præscripta est. Celebratissimum epithema Asclepiadis, quod illic scriptum inuenies. Sed quia humor in iis morbis ferè crassus est & crudus, viscidus, paulatim mitigando, incidendo, attenuando, discutiendo, & in coxendice etiam attrahendo, malum euincendum est. Vacuato vniuerso corpore, præparata materia, plurimum confert comotus sudor, præsertim ex ea parte, ex qua malum est. Facile repleto vase mouebitur aqua calida & vino pleno, in quib. ea coxeris, quæ sudores moueant, discutiendi & roborandi vim habeant, chamæmelum, melilotum, anethum, ebulus, cha-


## AD LIB. VIII. DE COMP. MEDIC.

*mæpytis, hyssopus, salvia, rosmarinus, origanum, calamintha, absinthium, folia & bacca lauri & iuniperi, semen anisi & fœniculi.* Materia cocta cum oleis anodynis & discurrentibus contundi potest, & linteo composita, calidaq; admoueri parti. Decoctum autem inclusum vase bene clauso & constricto orificio plantæ pedis, vbi in crure vel ischio dolor est, volæ manus, vbi in brachio, admoueri debet, donec inde comotus vapor attingat partem: & moueat sudorem. Detergendus sudor diligenter, & locus affectus lanis sordidis inculcatis ol. mirigante, resolvente, corroborante contegendus est. Vacuata materia corroborare conuenit emplastro diachylo ireato, thure addito, mastiche, sanguine draconis, pistis & vnitis omnibus cum ol. anethino, laurino, de absinthio, & aliis id genus. In inueteratis, vbi iam dolor quietus est, salvia, sal, vino austero & ol. chamæmelino incoquenda sunt, fiat fortis expressio, seruetur ol. quo sepe articulus infirmus affricetur. Multi longa abstinētia vini curati sunt. Sunt, qui plurimum probant decoctum baccarum iuniperi, glycyrrhizæ, vocatarum fenellarum, radicis enule & ebuli. Decoctū guaiaci incidendo, mouendo sudores, atque ita vacuando conferte potest. Pellis lanina bene macerata & comparata cum materia adstringente, galla, alumine, & aliis, quæ coriariis vsitata sunt, gestata plurimum facit ad præcautionem. Græci & Arabes plurimum tribuunt hermodactylis, ac varias pilulas inde conficiūt mistis seminibus anisi, fœniculi, zinzibere. Apud Nicolaum maiores sunt in frigida causa, minores, in causa calida. Ut edum erit descriptionibus adiectis

*Arthritici  
multi vini ab-  
stinētia cu-  
rati.*

iis, quæ conuenire videantur, vt agarico, maioribus, rhabbaro, minoribus. Contingit curatione malè instituta tophos concrefcere in articulis, quibus conueniunt, quæ incidunt, tenuant, molliunt. Emplastrum de Vigo, de meliloto, de muscillaginibus, mista parte cerati cæsi descriptione Philagrii, galbano pingui & aliis, quæ scripta sunt cap. de malacticis, de vitiis ossium, de pyroticis. Sciendum tamen eiusmodi tophos aliquando ita induruisse, vt nullis remediis cedant, aliquando quoque figuram membri commutare in ὀρθόκυλον καὶ ἀγκυλον, quorum affectum remedia inuenias capite de vitiis ossium & neruorum. Sciendum quoque, quod scripsit Hippocrates, dolores eiusmodi sæpe protrahi ad diem 40. vt nihil sit mirum aliquando, adhibitis conuenientibus remediis, tardiùs curari.

F I N I S.



# IACOBI HOLLERII

STEMPANI, MEDICI PA-

RISIENSIS CELEBERRIMI

de Materia Chirurgica

## LIBER I.

### PRÆFATIO.



E materia remediorum, quæ ad Chirurgum pertinent, plurima quidem Hippocrates, Galenus, & ante hunc Anazarbæus Dioscorides memoriæ tradiderunt. Quædam posteritas addidit non fraudanda laude, sua enim veterum, sua posterorum gloria est. Atque iniquum decreti genus est, quod omnem fructum laudis & gloriæ huius disciplinæ vni Græciæ detulit, ut Arabum ac posteritatis studia perpetuis tenebris opprimantur. Illaudato solo laudatæ fruges sæpenumerò proueniunt. Vixerunt Græci in media luce literarum. Extiterunt Arabes, & inde ductæ familiæ, iam desertis ac sepultis melioribus disciplinis, digna tamē luce, æternaque memoria nobis reliquerunt, E viuis fontibus Græcorum remedia primum petenda sunt, sed

*Interpretes  
materia chi-  
rurgorum.*

*Laus aliqua  
Arabum &  
posterorum.*

*Vnde peten-  
da materia.*

## INSTIT. CHIRVRGIC.

ita, vt nec Arabū riuos, nec posteritatis ingenia cō-  
tēnamus. In his hauriēdū quod saluū & incolume,  
repudiādū, quicquid fecerit cōenū, & disciplinæ ve-  
terū malè cōuenerit. Atq; omninò hac parte perlu-

*Natura fer-  
tilitas in ma-  
teria chirur-  
gorum.*

strāda nobis naturæ fertilitas, à qua omnis vbertas  
& quasi sylua remediorum ducta primū est, Nus-  
quam natura magis luxuriat, nulla in re pariter at-  
que his chirurgiæ opibus ambitiosa est, in quibus  
tam prolixè numen suum explicat, vt πρόνοια illa

*Pronaa chi-  
rurgos potius  
quam Epicu-  
ræ.*

non tam Epicurea, quod quidam ait, quā χερσπρος  
fuisse videatur. Plurima quidem ad voluptatem &  
delicias hominis, omnia verò ad salutem eius &  
conseruationem chirurgo comparauit. Nam quæ-  
cunque tota rerum facie exposita, quæcunque ca-  
uernis terræ ac visceribus latent, quicquid est aqua-  
rum, stirpium, animalium terra, ignis, maria, chirurgi  
inferuiunt. In facie rerum & excrementis, in ca-  
rie, in rebus minimis, absoletis, ac prope nullis, re-  
media condita sunt. In re vnā multiplex natura va-  
rio genere remediorum foeta est. In apicula quam  
variè lufit, quā multas diuitias chirurgo condidit,  
mella, ceram, metyn, sandarachā, fauos, propolim,  
quicquid denique locuples illa alueorū respublica  
continet. Quin & apes ipsas ad auxilia transtulit.  
Et in homine multa sunt, quæ profunt homini, vt  
quocunque animum aduertat, quocunque oculos  
cōiicias, remediorū turba sese offerat. In quo sum-  
mopere probanda est maiorum diligentia, multo-  
que magis imitanda studia, qui in ea vastitate re-  
rum nihil intentatū, nihil inexpertum reliquerūt,  
omnia elaborata & summo iure existimata, literis  
consignarunt, quibus iam perfrui datū est, alienis  
scilicet

scilicet bonis. Primum ergo consuetudine, natura,  
 & maiorum historia, infinita nobis materia com-  
 parata est, quæ iâ deserta ac suppressa iacet, quia ne-  
 glecta. Satis est capsula pauculis alueis distincta, sa-  
 tis pyxidicula, hic vno atque altero remedio con-  
 tētus est, quæ scilicet accepit oraculo, nec vlli reue-  
 landa putat. Sed ego sic arbitror, optima esse reme-  
 dia, quæ plurimis cognita, plurimis probata sunt.  
 Alteri elemēta sordent, & quicquid elemētare est.  
 Hinc noua elementorū soboles, hinc æther & cœ-  
 lum ipsum ad remedia exprimenda sunt. Vernacu-  
 læ sunt nobis atque domesticæ naturæ opes, quib.  
 vulnera cōiungas, repurges sordida, sinus impleas  
 & cicatrice tegas, cæteraque præstes omnia, quæ  
 chirurgi opere continentur. Verum suis cuique stu-  
 diis frui liceat. Nos ex immensa, omnibûsq; expo-  
 sita naturæ sylua & maiorum historia, quæ iam pu-  
 blica vel multorum fide consent, remedia transfe-  
 remus. e. hibebimûsque rudimentum operis, suis  
 quidem lingis descriptum, quod alius impleat, in-  
 formet, suis denique numeris absoluat. Nos speciē  
 aliquam & formam argumenti adumbrabimus, se-  
 quuti Cosmographos, qui totius orbis ambitum  
 angusta tabula contrahunt. Idem enim condonan-  
 dum nobis, cum non alios fines imperij, alios ma-  
 teriæ, de qua præsens instituta oratio, natura po-  
 fuerit. Genera quædam rerū & præcepta artis pri-  
 mum explicabimus, vtendi methodum, & leges  
 aliquas instituemus, ex quo censēbitur particularis  
 materia, & formulæ describentur, quas partim ars  
 ipsa reperit, partim optimorum medicorum vsus  
 atque experientia comprobauit. Antidotarium in-

*Taxatur no-  
stri homines.*

*Argumentum  
libri explica-  
tur.*

*Antidotarium.*



## INSTIT. CHIRURGIC.

scribunt hoc genus argumenti , nulla ratione aut  
 vfu veterum, sed, vt fuit annorum licentia, è Græca  
 voce Latina analogia nomen detorserunt. Multa  
 nobis, plurima aliis reliquimus, ne volumen, quod  
 quinque libris Ioannis Tagaultij, & hoc de mate-  
 ria chirurgica commétario cogendum erat, in ma-  
 iorem molem accresceret, deinde non plus operæ  
 hac in reliquit collocare nobis, quàm à quodidia-  
 nis studiis , statâque interpretandi cura relictum  
 fuit, idque breuiori tempore, quàm hoc institutum  
 nostrum breue quidem , sed varium , expostulet.  
 Ideoque dignum venia , si contracto ambitu ver-  
 borum, pressâque periodo , quædam describentur,  
 & in tam, numerosa medelarum turba potior est  
 verborum moderatio , breuibûsque sententiis res  
 premenda est. Ad hæc ponimus idoneos esse huic  
 doctrinæ , qui iam intincti fuerint præceptis artis,  
 quam Ioannes Tagaultius singulari ingenio atque  
 incredibili studio informauit. In qua genera mor-  
 borum diuisa sint, circumscriptæ formæ, designata  
 indicia, notata præfagit institutæ leges, scriptæ me-  
 delæ plurimæ, in qua quæcunq; collabebantur in  
 disciplina vetere, constituta, quæ vitium fecerant,  
 reformata, tota denique ars, quasi rediuiuo lapide  
 instaurata est. Vnicam hanc partem operis inter-  
 ceptus negotiis in nos trāstulit, quam ideò recepi-  
 mus, ne & publica ratio deferri à nobis, & officium  
 necessitudinis repudiari videretur. Multa igitur è  
 Græcis, quædam ex aliis transtulimus. Quæ à Gui-  
 done, eiusque notæ scriptoribus rudiùs tradita  
 sunt, paulò puriùs reddere contendimus , etiamsi  
 intelligamus vitia corporum nō curari eloquentia.

*Laus, operis  
 Ioannis Ta-  
 gaultij.*

Sed

Sed nec barbarismo depelli possunt. Probamus quidem omnem orationem, modò sententiis rerū, quasi suo succo & sanguine condita sit. Melior tamen hæc, si neque neglecta, neque ambitiosa, sed mediocriter culta est. Adde quòd barbarismus illè multas sæpe tenebras rebus attulit. & optima quæque sordescūt plurimis, quæ sordidis, nec ita puris vocibus describuntur. In dānandis quibusdā rebus authores Græcos adhibui, in remediis ea selegi, quæ præceptis artis congruerent magis, quæque ut res præsto sunt, facilius comparentur. Atque hæc præfati, ad institutum opus veniamus.

*De repellentibus. CAP. 1.*

**A** πορρετικὰ Græci vocant, quibus & initiis fluxionum, & post initia utendum est, quando videlicet humor affluit, hinc enim phlegmones ortus atque incrementa, hinc vomica, maligna ulcera, febrium, dolorumque causas, alia denique permulta vitia corporum declinamus. Ideoque principiis obsta. Sed vacuandum prius corpus est, si quidem postulat casus, ac ferè postulat, quia in plethora & cacochymia, rheumatismi plurimum commouentur, quanquàm etiam in mediocri vitio humorum & copia, ubi phlebotomo vel pharmaco natura leuanda est. Idem remedium sæpius innouandum, si quidem metus est, ne cùm incaluerit mora, affecta inde pars nimium recaleseat. Vis quoque remedij vitio conferenda. Leuius enim pharmacum ut lactuca, in graui ardore frustra est, fortius, qualis est succus è pomo Mandragoræ, iuore inficit, indurat scirrhum, & aliquando ita

*Vitias repell.*

*Vacuatio.*

*Modus.*

*Repellētia cur-  
sepius inno-  
uanda.*

## INSTIT. CHIRURGIC.

*Repellētia vt  
conuenienter  
adhibeantur  
quæ ad con-  
siliū adhi-  
benda.* reprimat, vt in viscera fluxionis impetus rapiatur. Ad consiliū adhibenda hæc omnia, natura, situs, figura, sensus, robur partium, humoris copia, qualitas; corpus, viæ præterea per quas is illabitur. Neque perpetuò satis est infirmo loco repellens auxilium adhiberi, aliquando enim superius collocandum, vt veluti præmissa manus vias intercipiat, nequid

*Conuersa re-  
pellentium.  
natura.*

transfluat, vbi venarum ductus atque coniugia animaduertenda. Cæterum reprimentium natura admodum controuersa est. Arabibus repellunt quæ influxū prohibent, refrenant, crassant, illinunt, oppilant, quæ denique robur partium confirmant. In Græcorum libris astringentiū materia cum repellentibus ferè cōmiscetur. Apud Latinos Cor. Cels. scripta reliquit, quæ simul repellant atque refrigerent, & rursus quæ sine frigore repellāt. Aurelianus in Chronicis alia scribit vna astringere atque reprimere, alia astringere quæ non reprimāt. Sed vtriusque, vt aliquot locis Arabum in censenda materia

*De repellen-  
tibus Græco-  
rum sententia.*

non sine vitio est oratio. Iustissima Græcorum sententia, eaque nobis explicanda est. Repellit perpetuò quod frigidum est. frigidum aliud aqueum natura molli ac soluta, aliud terrenum crassiore materia, quod quia astringit & magis contrahit partes, efficacius reprimat. aut certè solum id efficit, si quidē ab actionis vehementia repellentibus nomen indi-

*Frigidorum  
medicaminū  
alia natura  
aquea &  
molli, alia ter-  
rea & dura.*

tum est. Ac certè in rheumatibus præstârissima medicamenta sunt, quæ cum quadam astrictione vehementer siccant, vt non mordeant, qualia terrena sunt. Quanquàm & alterum genus, quod aqueum est, vtcunq; reprimat, & ex æquo frigidum vel terreno frigidius est, ac refrigerio magis cōuenit. Ve-

rūm

rum præterquam quod humor frigore repercuti-  
 tur, si quidem accessit constringendi vis, quod iam  
 coit, loco exstringitur, magis etiam si tenue est, & *Cautio in d-  
 stringentib⁹:*  
 si quid reliquum sit, sæpenuerò reficcatur, con-  
 firmatur pars, ut sine pharinacorum ope quod po-  
 steà influat, possit retūdere. Verūm hac parte pro-  
 uidendum, ne quid nimis, ne cutis grauius contra-  
 hatur, crassescat humor, dolor exasperetur, fluxio  
 increascat, grauius denique incendium irritetur, at-  
 que ut initio quidem te iuuise putes, reliquum ta-  
 men & scirrholes & contumax persistit, quod im-  
 posterum ægerrimè discutias. Ac grauior metus, si  
 quid viscerum infirmius est. Excipit enim celeriter  
 quicquid retunditur, vbi omnia firma sunt, in ma-  
 gnas venas & viscera circa periculū aliquid refluet.  
 Videndum quoque ne vitra modum contrahas in  
 materiæ copia, crassitie, vitio, molli vegetoque feri  
 su corpore, dolore graui pariter & calore, vbi laxā-  
 da potius via est, ut diffuat calor, ac dolor tempe-  
 retur, qui, vbi cruciat vehementius, ad laxatia & a-  
 nodyna omninò confugiendum est. Adstringenti  
 simul atque repellenti auxilio vis efficacior est, si  
 quid tenuium partium vel natura insitum, vel arte  
 cōmixtum est, modò non mordeat. Iusto enim ca-  
 lore temperari potest, multò magis, si (quod ferè  
 fit) ab infirmitate fluxio, à frigore infirmitatis orta *vbi non res-  
 pellendum.*  
 est. Pestiferæ materia non occurrimus, vbi in su-  
 perficiem diuertit, sed potius illicimus, atque rapi-  
 mus vi maiore, si tardius mota resistit. Neque dissi-  
 milis ratio est in criticis apostematib⁹, coxariis, lue *Oppillantiæ.*  
 venerea, vbi nō repellenda in corpus, sed foras po-  
 tius materia trahenda est. Iam verò quæ illinunt  
 4 4 oppilant,

## INSTIT CHIRVRGIC.

oppilant, offarciunt, alias quidem dolorem leniunt, alias acrimoniam hebetât, viasque intercipiūt. Ex quibus si vis, reprimant ac reuera nonnunquam reprimunt, oleum rosaceum, omphacinum, myrtinū, oui candidum, aliaque id genus. At gummi genera resina, gluten, farina pistrinalis, gyris tritici, hydrelæo, oxelæo, Rhodino, repellente succo, austero vi no dissoluto, non tam sponte sua quā aduentitia vi reprimant. Adstringunt calida, folium, casia, cinna momum, spica, aloë, crocus, cyperus, calamus aromaticus, myrrha, absynthium, marrubium, polium, saluia, centaurium, vina quidem austera, & aromata plurima. Reliqua verò tum austera, tum acerba in proximū ordinē referemus. Leniter repellūt aqua, vinū, lactuca, intiba, polygonium trifoliū, auricula muris, lenticula palustris, psylliū, liquor oui, vmbilicus veneris, semperuiuū, portulaca. In summa, quæcunque frigida aqueo elemēto soluta sunt Omphacium adstringendo efficax. Solanum ambigit, hoc potentior rubus est immaturo fructu & floribus, mollioribus autem foliis & asparagus plurimum aquæ cōtinet, ideoque leuius contrahit. Adstringunt vitium folia, & capreoli, plantago, sorborum, cornorum, mespilorū, pirastorū, cydoniorum, myrtorum, spinorum fructus & folia, rhodonia, rosarū capita, obelisci, deinde, sed minùs, semina, flores, & folia, oxyacantha mediocriter, malicorum magis, cytinus, balaustia, rhus acacia, bolus Armena terra sigillata, quercus, cupressi folia, germina & nuces, vehementer refrigerant pomi mandragoræ, hyoscyami & papaueris succus, quæ reliquis interdum temperari possunt, vbi acrior inflāmatio est, sed

*Quæ calida  
adstringunt.*

*Materia re  
pellentium.  
Aquea.*

*Omphacium.  
Rubus.*

*Quæ vehe  
menter refri  
gerant.*

sed prius auferenda, quàm inde partes liuorem ducant. Spongia è frigida expressa partim contrahit, fluxum inhibet, dissipatque in viciniam, quod iam coit. Eodem modo lana succida & splenia austerò vino insuccata. Magis etiam, si aqua prius, gallia & <sup>Aqua.</sup> <sup>Vinum.</sup> similia incoxerint vinum aquæ præferendū, & maxime austerum, vbi reprimendum est. In deligationibus, fasciæ vino insuccantur. Acetum repellit, adstringitque vehemèter. Caphura repellit, & tenuitate partiū faciliè permeat. Oculis populi veteri- <sup>Acetum.</sup> bus Græcis calfaciat. Repellit gypsū oxycrato maceratum. Olei rosacei frequens vñ est, sed sit ex oleo omphacino, in quo rosæ sæpius muratæ maduerint. Quod annum superat, exoletum est. Oleum omphacinū si desit, recenti oleo & vix acerbæ succo vna coctis, dum succus omninò exhalauerit, fringito & ad ignem saligno ramo, vel simili assidue commoueto, oleum verò nec sit cõditum sale, nec ætate rancidum, in myrtino, melino, lentiscino, & similibus eadē vitia fugienda sunt, vetustas, rancor, salugo. Mastichinum, nardinū, costinum, adstringendo roborant, & calfaciunt, vitiosum oleū cum integrum desit. tandiu eluatur dum virus exuat. Eluat- <sup>Olea factiua.</sup> tur aqua vel simplici, vel rosacea. Descriptæ materiæ oleum vim cõbibet, si vel materia ipsa, vel succus eius oleo incoquatur. Plātaginem, gratia exempli, oleo recenti & pari aqua aut vino coques dum solum oleum reliquum sit. In ardore nimio periculo- <sup>Cautio.</sup> sus olei vsus est, quia calore incenditur & frigit. Expressis succis melius vtimur in lana succida pāniculis, ac splentis. Portulaca, sēperuiū, vmbilicus <sup>Succorum</sup> <sup>vñ.</sup> veneris, ægrè succum reddunt, nisi in mortario tri-

# INSTIT. CHIRURGIC.

*Cataplasma-  
ta & cerota  
qui s'ia nt.*

*Ceratum  
e psyllio.*

*Ceratum ro-  
faceum.*

*E coriandro.*

*Cerata ma-  
gis adstrin-  
gentia.*

tis aliquid omphacij, vel liquoris similis affūdatur.  
Cataplasmata sūt farina in succo pista. Ex oleis  
cerota coeunt, & succis imbuuntur. Remedia neq̃  
dura sint, neque grāuia, ne presso loco dolores au-  
geant. Cerusa cichorij succo & aceto leniter dilui-  
tur. Ceratum à psyllio, psyllij vnc. quatuor in aque  
lib. quatuor macerentur percoquanturq̃ue, expres-  
so succo, adde rosacei libram vnā, ceræ vnc. sex,  
contra articulorum rheumata. Non absimile cera-  
tum rosaceum. Duplice vase cera cū oleo liquefit,  
vbi refrixerint, conspersa aqua commouētur, aqua  
reiicitur, succus plantaginis affunditur, vt quantū  
fieri potest, absorbeant. Inflammationes, sinus vl-  
cera genitaliū quæ serpunt, adiuuat. In teneris cor-  
poribus idem ceratum coriandri succum imbibat.  
Coriandrum leniter adstringit, aliis refrigerat, Ga-  
leno calfacit, vt ere incrementis. Ceratū myrtinum  
& melinum magis adstringunt. Herpetibus, & ni-  
mio humore flaccidis vlceribus conuenit, Myrtini  
lib. vna, ceræ 3. duæ pollinis myrtorum vnc. vna.  
In ceratis vtendum cerā quam adolescentior apū  
populus confecerit, ceram virgineam apiarij nomi-  
nant, eaq̃ue è nouis fauis separanda. Alioqui cerā  
alba vtendum erit non sponte quidem nata, sed fa-  
ctitia, qualis olim Tyrrenica, quia sauior est, &  
acrimonia hoc genus remediorum carere debet.  
ideoq̃ue præferēda cera è dulci ac diluto melle. In  
coagulato lacte & inde nascente inflammatione fari-  
na fabacea hydrelęo vel rhodino pista māmīs impo-  
nitur. Idem opitulatur testibus inflammatis δια-  
χαλκίτεως contra rheumata hoc modo temperari  
debet, Adipis suilli recēti, exemptis fibris, 3. duæ,  
olei

olei recentis, lithargyri, ana  $\mathfrak{z}$ . tres, chalcitidis vnc.  
 dimid. Conficiendum arte medicamentum, vsus  
 tempore,  $\mathfrak{z}$ . duas medicamenti, olei rosacei  $\mathfrak{z}$ . tres  
 colliquabis, vbi refrixerint, aqua frigida, succo por-  
 tulacæ, psyllij, lactucæ, vino austero, vt res postu-  
 lat, subiges. animaduertens quantum repellendum,  
 adstringendum, refrigerandum, siccandum, lenien-  
 dum, vt modò rhodini loco myrteum aut melinū  
 misceas, oxycratum hunc vel illum succum aliis  
 præferas. Quod sequitur, exprimit vlcereb, quod in-  
 fluxit, & quod influat, repellit. Lithargyri  $\mathfrak{z}$ . qua-  
 tuor olei dulcis vel rhodini  $\mathfrak{z}$ . quatuor, aquæ  $\mathfrak{z}$ . tres,  
 lithargyrum die vno hydrelæo coquitur, difficilius  
 enim illiquefcit, teneris corporib. & paruis vlceri-  
 bus conuenit. Defensiuæ vocant è boli Armeniæ  
 parte vna, terræ sigillatæ dimidio, rosacei triplo,  
 aceti vel succi repellentis dimid. Liquidis reliqua  
 infriata commiscetur, vel è bolo Armena liquore  
 oui conleuata, deinde affuso succo è capreolis vi-  
 tium, aut omphacij. Fasciæ ritè conuolutæ in re-  
 pellentibus censerì possunt, quales in fracturis, &  
 qui ab vlcere sursum adducuntur, vt adstricta parte  
 & ita ductis orbibus paulatim laxes. Similiter cum  
 altero membro atrophia intabescente, alterum de-  
 ligamus. Vincula quoq; superioribus partibus in-  
 iecta, qua videlicet materiæ cursus est. Aliquando  
 etiam inferiores illaqueamus, vt cum è cruce exha-  
 lat virus quod viscera appetat, ex quo & epilepsiæ  
 & syncopæ causa præciditur. Sed in vlcerebus plu-  
 rimùm & fracturis, vias laqueo cõprehendere o-  
 portet, ne si quid transfluat, dolor, phlegmone, pu-  
 tredo, syderatio, aliæque id genus concitentur.

*De litha. &  
hydrelæo.*

*Defensiuæ.*

*Deligatio.*

*De*



# INSTIT. CHIRVRGIC.

De attrahentibus. CAP. 2.

*Attrahētium  
materia.*

*Attrahētium  
vsus multi-  
plex.*

*Differentia  
attrahētium.*

**E**Λκτικὰ & ἐπισπαστικὰ Græcis appellata, vsu quidem repellentibus conferri possunt, sed natura plurimùm dissident calida, tenui substantia, quæque vi quadam rapiant, quæ in alto corpore posita sunt. Ideoque viscera, internùmque corpus exonerant, foras translata materia, venena in cutim euocant. Criticos abscessus accelerant, desperatos pleuriticos & fortasse attonitos releuât, inguinum tumores amplificant, quòdque vel pestiferum, vel nimis vitiosum medio corpore cõceptum est, aliò pertrahunt. Tabidas ac velut syderatas partes vitæ restitunt, perfrigeratas spiritu resouent, vitiosam saniem exhauriunt, quæ neruis & cuniculosis vlceribus laet, squammas ossium detrahunt, coxarios iuuant, hydropicos exugunt, paxillos, clauos, spinas, sagittas reuocant, multò magis, si locus vlceris periculo inciditur, nec patitur æger angustio rem plagam ferro ampliari. Quod in vomicis, strumis, panis, ægilope, oculis, auribus, reliquisque partib. altiùs decedit, eliciunt. Multiplex ergo attrahentiũ vsus, sed nihilominus varia materia est. Alii ea vis à natura insita est atq; in his modò manifesta qualitas elementaris, modò occulta quædã proprietas & naturæ familiaritas attrahit. Aliud genus hoc habet aduentitia qualitatu ex putredine cõtracta acrimonia. Calor Galeno omninò attrahit, sed quod attrahit, non protinus calidũ est. Aphrodisæus aliud sensit. Attrahunt cucurbitulæ, sanguisugæ, pyulcus, suctus, dolor, vincula, frictio, cauteria. In attrahentium vsu aliquãdo quod fuerit attractum, corpore excludimus, sed hic modus est, ne cum vitio partem

partem frugi materiæ eripias. Nonnunquã tantum attrahimus, nõ etiam discutimus, vt cum in partem emortuam calor & spiritus attrahitur. Argeti spumam, ceram, resinam, picem, oleũ, epispasticis veteres miscuerunt, vt & temperarent, & magis emplasticum pharmacum efficeret. Quidam etiã adstringente materia obtundi voluerunt. In primo genere sunt dictamnus, propolis, ceram virginẽam vertit Scribonius. Rudis est & crassa materia in apum officinis, nõdum cera, odore graui, vt qua pro galbano veteres vterentur. Ea mellatione verna, se parari potest fauorum pars quẽ cellas obstipat. Sed iam exemplis fauis, posteaquam mella diffluerunt, quicquid est in fauis, vna confundunt, vt nihil syncerum haberi possit. Magna verò synceræ propoleos virtus est, spiritus crassos & vitiosam materiã ex alto elicit. Recens per se satis est mollis & pinguis. Sic in puncto neruo agricolæ Galenus vsus est quẽ etate induruit, oleo veteri molliri debet. In mollioribus corporib. oleo illiquatur. In duris lacte multo tithymali, cũ terebinthina satis attrahit. Thapsia recens vtilis, cimula & vetustior exolefcit. Cerato misceri solet, quã quia, vt viscum, plurimum aquẽ continet, quatuor & quinque horas insistere oportet. Radix arundinis cum melle. Saggapenũ, galbanum, ammoniacum, opopanax, calx viua, cinis è facie vini vel aceti, quã loco nitri est, struthion, aristolochia longa, quã & spicula, & squammas extrahit, lepidium, sinapi, nasturtium, tithymallus, dracontium, pyrethrum, ranunculus, sales, tum qui edi possunt, tum ammoniaci. Quẽdam infriata affricantur, aut gũmi & resinis concorporantur.

*Quæ miscenda attrahentibus.*

*Particularis materia. Propolis quid sit scribonio.*

*Propoleos vsu punctum neruum curauit Gal.*

*Thapsia & viscum.*

*Loco nitri fex cremata vini vel aceti.*

# INSTIT. CHIRURGIC.

ratur. Lixiuium in subtili calidâque materia extil-  
 latum, ex eadem cinis Anemonæ, calamintha, nar-  
 cissi radix, cyclaminus. Sparthi quo vites alligant  
 fructus, & è foliis succus. Acetum, sed hoc suspectū  
 vbi siccitas, dolor, inflāmatiō, vlcus adstrictio, &  
 à neruis dolor est. Cantharides ex polenta & melle  
 pistæ. Medullæ & adipēs ætatē acrimoniā cōtra-  
 hū, vrsinus adeps hyēninus, pardalinus, leoninus,  
 & alij. sed hi maximè. In alopecis & profluuiis ca-  
 pillorum vitium discutiunt, attrahūntque quod ad  
 capillitium vtile sit, Oleo & oleæ flore, tela sibi re-  
 figere elephātos, testis est Ælianus. vetus sit oleum  
 tenue & calidum. Sulphur infiatū melle, oleo, te-  
 rebinthina, salua hominis, axūgia. Idem in œno-  
 stagmate feruescit dum enatet lentor quidā (oleum  
 appellant) quē concha excipere oportet aliquoties  
 cōmutanda aqua, dum satis olei collectum sit, quo  
 demersum corpore hydrargyrō foras elici volue-  
 rūt statim illito à balneis. Euphorbiū recens acrius  
 est, bimum trimūque paulatim remittitur, quin-  
 to & sexto anno exolescit. Cerato tēperatur, quod  
 vel decuplum vel duodecuplum oleum habeat, &  
 triplam ceram. Modus est vt tantū erubescat lo-  
 cus, & pruriat, non vratur nec vlcus contrahat, nisi  
 & hoc etiam necesse sit. Cerato largiore dilui po-  
 test quod est acrius, quod verò languidius pharma-  
 cum, aucto euphorbio. cerato imminuto augeri de-  
 bet. Eadem lex in reliquis eiusmodi seruanda est.  
 Ardor affusa aqua: aceto (quod vim thapsiæ effica-  
 cissimè diluit) cerusa è rhodostagmate lota extin-  
 guitur. Succus Cyrenaicus inedicus opobalsamum  
 & alia, quæ partim exoleta sunt, partim vsui esse  
 possunt.

Acetum vbi  
 suspectum.

Medulla &  
 adeps.

Oleum.  
 Sulphur.

Euphorbiū.

Modus eu-  
 phorbi & si-  
 milium.

possunt, ex 3. de comp. pharmacorum  $\alpha\tau\tau\iota\gamma\epsilon\nu\eta$ , & aliis Græcorum libris repetēda. Aduentitio calore *Attrahentia a duentitio calore qua.* trahunt, fermentum, stercus anserinum, gallinaceū columbinum, arietinum, humanum, & quæcunque talia sunt. Scatebat quidam è grege mendicabulo-  
rū lue venerea, aliquot diebus vniuersum corpus *Lue venerea curatur men- dicus vniuer- so corpore e- quino fimo obruto.* equino fimo obruit, vt tantū esset qua respiraret. Erat stercus stabularium, equino lotio sæpius per-  
fusus, quodque iam computruerat. Effecit ille hac arte, vt totum virus exprimeret, addidit aliquoties enchriston ex axungia, larigna, & hydrargyro. Nec alia vitæ lex seruata est, quam mática offerebat, at-  
que his remediis curatus est. Fermentum oleo in coquitur, fundit, liquat, furculos trahit, pedes cōtu-  
sos sanat, mollit, discutit. Axúgia veteri, larigna, te-  
rebinthina & resinis liquidis pistū efficacissimū est  
alias cum cepa cocta subigitur, coquit, trahit, discutit, aperit. Coagulū quo vetustius, eò efficacius. *Fermenti fur- culas.*  
Ex echino animalium (quæ  $\pi\epsilon\lambda\acute{\upsilon}\kappa\omicron\iota\lambda\alpha$ ) lepore & vitulo marino colligitur. Lac est in lactatiū ani-  
maliū vētriculo, vel omaso ita cōcoctū. Aritoteles *Coagulum quo vetustius eo efficacius.* ad alui profluuiā vtile facit magis leporinū, equi-  
nū Diosc. Arabes & quidā è Græcis astringēs frigi-  
dū, ac reprimēs auxiliū faciunt. Alij acrimoniā ele-  
mētis, reliqua occultæ qualitatī attribuūt, hoc cer-  
tò habet, q̃ dissipata cogit, & coacta dissoluit. Ma-  
gnes ferrū attrahit, repellit Theamenes. Succinū il-  
licit festucas ignorata vi. Cácer fluuiatilis trit<sup>9</sup> tela  
extrahit, lacertæ caput, rana sūmis partib. resectis.  
Cochlearum & limacū carnes, alias per se, alias *Cochlea,*  
cum suis volutis tritæ, ac mixto interdum coagulo  
tela rapiunt, atque hydropicis aquam exugunt, nō  
prius

# INSTIT. CHIRVRG.

prius soluere oportet, quā tot<sup>9</sup> humor exudauerit.

*Ostrea viua  
Scorpio.*

Ostrea viua pestiferos bubones loco transferūt, & ad se trahunt. Scorpio tritus & impositus, quod infixit virus, retrahit. Oleum quod ex eo fit, idem efficit, & calculos educit illitum grandi, si in cole restiterint vel pubi, ac perinæo, si superius inhæserint. Cucurbitula summa vi rapit. Hirudines superficie sugūt. Pus, vrinas, calculos, suctus elicit, ore mūdo, ac prius loto sit, qui exugit. Pyulcus, catheter iisdē vtilia sunt, vincula, frictio, phœnigmus dropax, sinapismus, ferrum candens, vel admotum, vel impressum, calore trahunt. Sed hoc violentum remedium est. Verū quæ non sanant pharmaca,

*Pforicum.*

sanat ferrum, quæ nec ferrum, sanat ignis, quod Hippocratē in Aphorismis scripsisse volunt. Mixta remedia sunt theriaca. Pforicum dupla chalcite &

*Quomodo re  
mouenda metal  
lica exci  
pianur.*

lithargyro, aut æquis partibus cadmiæ & chalciteos, vel duabus chalciteos, & tribus cadmiæ, fortius est quod cadmiam, quam quod lithargyrum recipit, minùs acre locis metallicis. Ex acerrimo aceto trita & fictili clausa sepeliūtur fimo. Hac arte macerata, triplo. duplōve cerato excipiūtur. Ceratū sesquialtera ratione dupla, tripla olei, ad cerā cōficitur. Ea metallicorum cura pharmaca tenuiora sūt, facilius penetrant, & inde trahunt. Oleum sit vetus, ricinum, sinapinum, sicyonium. Raphaninum, è terebinthina, larigna, strobilina, pinea, picea, abietina, arte chymica, si vis efficacius distillatum quæ resinæ etiā è profundo trahūt, sed in primis terebinthina, deinde strobilina, in quibus non modò calor, sed tenuitas partium in attrahendo spectari debet. Formulæ sunt, ℥. cerati 3. 3. tere-

*Olea com  
moda.  
Resina &  
inde olea.*

*Formula ex  
Gal. Orib.  
Aet.*

binthinæ

binthinæ. ℥. β. liquatis immisce puluisculi euphorbij. ℥. 3. interioris fermenti ℥. 1. terebinthinæ liquidæ ℥. 1. concorporata plurimum valent in punctis nervis. Propoleos acris & pinguis (nam cera virginea abutendum non est) ℥. 2. olei veteris ℥. 4. galbani ℥. β. coeant ad ignem. ℥. picis liquidæ, picis aridæ, propoleos, partes æquales, lithargyri, cerussæ, salis ana ℥. 10. seorsum tusa, & cum olei quant. suff. in mortario pista, ad ignem diu versentur, paulatimque decoquantur. Lithargyri, cerussæ, nitri, ceræ Colophonæ, ammoniaci, ana ℥. vna, olei veteris vnc. sex, reliqua vnciis sex lixiuij ficulnei, dum non inquinent, concoquuntur. Deinde cera Colophonia, ammoniacum, deinceps quidem ac paulatim adiiciantur.

*Punctis nervis mistio utilis.*

Nucleorum è dactylis crematorum, nitri rubri, salis ammoniaci, vel gemmæ, aristolochiæ rotundæ, radicis cucumeris agrestis, terebinthinæ ana ℥. 20. piperis nigri & albi, ammoniaci, amomi, xylobalsami, myrrhæ, resinæ siccæ, capituli lacertæ, lactei succi mori, ceræ, ana ℥. 10. adipis caprini ℥. 15. olei irini quod sufficit ad emplastrum. Vix parari potest, nisi ad vocata *ἀντίβαλλονία* confugas. Quod sequitur admirandum ad strumas, ramicem gutturis, parotidas, omnem duritiem, & œdemata. Cupressi folia neque teneriora, neque duriora in pulverem comminues, tortiuo vino consperges, atque ita volutabis, dum in fæcis corpus coëant. Inde struma vel ramex inducitur, tertio primū die soluitur medicamentum, contractum, locum inuenies, qui digitis exprimi debet. Rursus ad tres dies idē pharmacum applicabis, eodemque modo solves & ex-

*Relatum ad Andromachin.*

*Necepsionis e cupresso. Admirandum ad strumas remedium.*

## INSTIT. CHIRVRGIC.

primes, septimo die, uel ad summum nono, strumæ velut miraculo abolebuntur. Exugit hoc saniem per poros affectæ partis. Olei antiqui ℥. 22. ceræ albæ ℥. 5. nitri vel salis torrefacti, aut facis crematæ vini ℥. 3. tereb. ℥. 12. lixiuij querni, vel ficulnei ℥. 18. cera cum oleo liquatur, terebinthina adiicitur, refrigeratis nitrum conspergitur. lixiuium paulatim affunditur omnia pistilo conuoluuntur. Plurima ex tertio & sexto de compositione pharmacorum *ϕιγερν*, & 13. Aet. repetenda. De sinapismo, dropace, phœnygmo & aliis alio loco. Addunt Apostolicon Nicolai, Oxycroceum, & alia.

*De resoluentibus. CAP. 3.*

**I**ncrementis rheumatum discutiens materia cum repellente misceri debet. Inclinate vitio diaphoretica pura sint, & horum vnicum fortasse genus est, sed clarior doctrina fuerit, si duplici differentia separemus, vt alia quidem leuiora, quæ ἀραιωτικὰ, alia fortiora, quæ διαφρεντικὰ, si vis, appelles. Aræotica mediæ naturæ vicina sunt eo calore, quem humiditas temperet ex quo minimè siccant dolorem leniunt, relaxant cutem, spiramenta corporis rarefaciunt, tenuitate partiū intrò penetrant, quodque inhæsit parti, liquefaciūt. Hinc ex humore vapor fit, qui subinde expirat, dum omninò locus detumeat. Et adhuc quidem satisfaciunt, vbi tumor in superficiem exponitur. Locusque mollis est ac rarus. materia verò calida, humida, & tenuis est. Quod si in alto corpore humor deponitur, si idem frigidus, crassus, glutinosus, si dura, densa que curis, si verò longitudo quedam est flexus & anfractus, iam vi maiore opus est, videndumque

*Consilia in  
usu resoluen-  
tium.*

dédumque non quale in præsentia, sed quale futurum sit medicamentum, cum eò peruenierit. Ex quo nec acribus quidem parcendum erit. Etenim pars exterior perferet, quæ ægra, dolensque tolerare nō potest. Maiora verò remedia in diaphoreticis numerentur, iam vicina epispasticis, quanquam utraque virtus euocandi atq; digerendi plurimis rebus insita est, sed ut in vnoquoque vis altera superat, ita genera distincta sunt. In hepate, liene, vetriculo, atque id genus partibus, à relaxantibus metus est ne dissoluant vires. ideòq; adstringens materia, qualis est aromatum, misceri debet. Frigida crassaq; materia, incidente auxilio prius comparanda. Mollienda quoque vbi durior cōcreuit, ex quo à leuioribus ad maiora remedia gradus paulatim fiat, ut sine periculo discutias. Alioqui dissabit tenue lapidescet quod crassius est. Cum parte stupida, durius, cum ea quæ vegetius sentit, clemētius agēdū est, quāquam stupore partis abutendū nō est, ut ea imperes, quæ exulcerent. Sic enim sensile corpus intabescet, contrahetur, nō rarefcescet; cogetur materia, non liquefcescet, horror, dolor, fluxio, irritabitur, dehiscēt venæ, omnia in deterius cōmutabuntur, multò magis si pharmaca crassiore consistēt materia, & siccent. In phlegmone quæ vetus est, videndum nunquid affluat, id ferè accidit tumoribus qui inueterascūt, vbi medela quæ reprimat, commiscenda est. Posteaquam verò subsedit tumor, ac nihil quod exhalet reliquū est cōfirmāda pars, quæ lōgo vitio elāguīt, multò magis si statis periodis, rheumatismo, vexari solet. Aræotica sunt, chamæmelū, lini semen, in maioribus, efficacissima, althæa, sequitur agrestis, domesti-

Cautio.

Ab acrioribus  
quid continet  
gar.Particularis  
materia.



## INSTIT. CHIRVURGIC.

cæ vis nimio humore elanguit. Aqua calida vtitur Hippocrates in fracturarû exolutione, quam vocat *ἐπ' λυσιν*, vinum exiccat, reprimit, & digerit, lana fordida bene carminata inebriatavino, & inde pressa. ceratum similiter. Butyrum digerit molliû corporû parotidas, bubonas, oris phlegmonas, aliâque innumera, vt per se satis esse possit. Oleum dulce, calens, & in quo illa efferbuerint. Sicyonium è foliis, fructu & radice cucumeris agrestis. Crinelæon intinctum croco, omnes inflammationes discutit. Oleum caryi non efficacius è rancidis. Nux rancida per se, vel cum melle trita efficacissimè suggillata rapit, inuritur, aut cādente ferro premitur, vt reddat oleû, quod optimè discutiat. Omne oleû concalfactû igne, quale est lucernarû, vel ignito ferro extortum, efficacius est. Oleum vetus, ricininum, canabinum, anethinum, quod è rosmarino, maiorana, zambace, leucoio, hyssopo, aliisque eiusmodi œnelæo coctis, dum omninò expiret vinum. Rhanthinum, sinapinum, melanthinum, terebinthinû, hypericinon, potenter digerunt. E radice bryoniæ, & vocati sigilli Mariæ, cnico, grano gnidio, hydro-picis & œdematis olea comparantur. E galbano, ammoniaco, & similibus quæ molliant ac digerant. E dauco, caro, cumino, ruta, vt flatu excutias, cui galbaninum vtile est. Si quid incidendû, detergendûve, aliquid aceti vel oxymelitis affundi potest, quo tempore absynthium, poliû, centaurium, iris, aristolocia, gentiana, vrtica, hyssopus, & similia œnelæo incoquantur. Hîc vinum melius non adstringens, giluum, tenue & odorum. In phymatibus & parotidibus duriorum corporum talia ex v-

fu

*Olea.*

*Oleum liliorum cum croco.*

*Nux rancida.*

fu sunt. Brassica per se, vel cum axungia trita, induratas phlegmonas & vetera erysipelata discutit. Adipe & medullis recentibus laxando, veteribus discutiendo vtendum est. Mastiche, furunculis: Ammoniacum & similia choeradibus & articulorum tophis conueniunt. Fermentum oleo pistum, & cum cocta cæpa mixtum, potenter coquit, mollit, ac digerit. Pellibus animalium recens detractis, in cõtus verberumque plagis vti conuenit. Fœnugræcum duris phlegmonis adhibendum. Acetum achoribus & œdematis vtile est. Agrippa concalfacto acetato pedes immerfit, vnde intolerabili pedum cruciatu liberatus est. Oxycrato quoque tepido & oxymeliti vis inest discutiendi. Mel in diaphoreticis censetur, magis etiã quod rosmarino & similibus conditum est. Butyrum mollit ac digerit tenellorum corporum parotidas, bubonas, oris phlegmonas, aliãque innumera, in quibus per se satis esse possit. Melius est initidum in aqua rosacea lotum, & modico intinctum croco, conditum melle coquet, detergebit & digeret. Oleum dulce, calens, & in quo diaphoretica illa efferbuerint, spondylium, serpillum, pastinaca, pulegium, calamyntha, menta, & similia, quo genere olei vtendum erit in crassiore materia, & ubi robur partium firmandum est. Sicyonium est foliis, fructu & radice cucumeris agrestis multum digerit, ac ferè loco veteris vsurpatur. Vix enim reperias vetus, quale olim tricenarium, quadragenarium & eo antiquius seruabatur. Crinelaon, id est, oleum li-  
 liaceum intinctum croco omnes inflammationes discutit. Efficacius est nucibus rãcidis, & in hoc genere efficacissimum, quod in lucernarum ellychniis concaluit.

Agrippa acetato  
liberatus.

Mel.

Butyrum

Olea

Sicyonium.

Oleum e liliis.  
Caryoph.

# INSTIT. CHIRVRGIC.

luit, quo gangrænas, ægilopas, carbunculos quidam  
*Nux rancida.* persanant. Nux rācida per se efficacissimè sugillata  
*Oleum lucernariorum &* delet, leuiter exurit, flāma, aut candenti ferro ex-  
*extortum cā-* primitur, vt reddat oleū, quod efficacissimè discu-  
*denti ferro.* tiat. Omne oleum concalfactum igne, quale est in  
*Oleū e tritico.* ampullis lucernarū, vel ignito ferro extortum, effi-  
caciū est. Ex quo feruefacto nouo oleo dulci pro  
veteri vti licebit. E tritico & nuce quā moschatam  
vocat, contra lichenas cādentibus laminis extrin-  
gitur. Ex assis ouis premente cochleario, in figulari  
*Ex ouis.* sartagine cōcalfacta igne, quæ plūbo vel vitro in-  
crustata sit, cōtra impetigines, lentigines & fœdas  
maculas oris. Alia quoque propè infinita, quorum  
*Olea alia ma-* cōficiendi ratio à Mesue & aliis descripta est. Oleū  
*gis digerētia.* vetus, ricininū, canabinū, anethinū, quodq; è ros-  
*Efficaciora* marino, maiorana, zābace, leucoio, hyssopo aliisq;  
*prioribus.* eiusmodi conficitur. A qua & oleo, vel hoc & vino  
materia incoquitur, dum omninò expiret humor,  
& oleum reliquum sit. Rraphaninum, melanthi-  
num, sinapinum, terebinthinum è resinis pressum  
potenter digerunt. Hypericinū mollius est. E radi-  
*Efficacissima.* ce bryonię & vocato sigillo Mariæ, cnico, grano  
gnidio, hermodactylis, anacardiis, arida vini fāce,  
calce hydropicis & œdematis. E galbano, ammo-  
*Vt molliās.* niaco & similibus quæ molliāt simul ac digerant, è  
*Cōtra flatūs.* dauco, caro, ruta; cumino, lauro, vt flatus discu-  
tias, cui rei & iuniperinum & galbanum vtile est.  
E sambuco & ebulo iuuat hydropicos, œdemata,  
*ebulo.* podagricos. Si quid incidendum atque detergen-  
*Vbi incidendū* dum, aliquid aceti vel oxymelitis affundi potest,  
*& detergen-* qua in re absynthiū, polium, cētaurium, iris, enula,  
*dum.* gentiana, aristolochia, vrtica, hyssopus & similia  
& nelæo

Vinū qualē.

cenelæo incoquantur. Hic vinum melius, nō astringens, ætate vetus, colore giluum, tenue & odorum. In phymatibus, bubonibus, parotidibus duriorum corporum talia ex vsu sunt. Ac bubonibus peculiariter è maiorana factū. Chamæpytis in oleo cocta mammarum duritias discutit, & articulorum vitia adiuuat. Cypero vtendum, vbi resoluendum & leniter astringendum, cui rei olea croco intingantur idque curandum magis in viscerum causis, & cum iā propè nullæ reliquæ sunt tumoris, & hic totus ferè euanuit. Brassica per se vel cum axungia trita induratis phlegmonis & erysipalatibus idonea est. Affectas partes oleo fouebis, materiā tufam, in cataplasmate foto prius loco fasciis alligabis. Adipe & medullis recētib. quidē laxādo, veterib. discutiēdo vtendū erit. Sed de his alio loco. Mastiche furūculis, ammoniacū & similia choeradib. & articulorum tophis conueniunt. Mulsā prodest, in qua hyssopus, thymus, organū & similia coxerint. Fermentum oleo pistum, & cum cepa cocta tufum potēter coquit, mollit ac digerit. Pellibus animalium recēs detractis in contusis, præcipitatis, verberumq; plagis vti conuenit. Fœnugræcum oleo coctum duris inflammationib. adhibendum. Caricæ acres incoctæ mulsæ idem præstare possunt. Pinguibus autē, vt coquas, lenias, & leniter digeras, vtendū est. Mirum est quod affirmāt. Coluber fluuiatilis feniculo à caudā præligatus suspenditur, subiecto vase aqua pleno, in quod dehiscat, ore aliquot post horis vel dieb. lapidē eructat, qui exceptus vase q̄ subiacet, totā aquam ebibat. Alligatur lapis hydropicorum ventri, atq; in totū exhausta aqua liberat. Fo-

E maiorana.  
E chamæpy-  
ti.

Brassica.

Adeps &  
medulla.Mastiche.  
ammoniacū,  
&c.Mulsā.  
E fermento  
& cepa.  
Pelles anima-  
lium recens  
detractæ.Caricæ.  
Mirum de  
lapide co-  
lubri.

## INSTIT CHIRVRGIC.

*Fomenta.*

*Sacculi.*

*Cerata.*

*Olea arthri-  
tica.*

*Oleum ex  
erinaceis.*

menta fiunt è mulsa, aqua calida, vino, hydrelæo, oxymelite, in quibus, si vis digerēs pharmacū, præcoxerit. Sacculi similiter è florib<sup>9</sup> anethi, meliloti chamemeli, rosmarini, calendulæ, maluæ, althææ, feminibus lini, fœnugræci, furfure, aliaque id genus materia infarciūtur. In fomentis ex eodem genere remediorum incalescūt, atque inde succū rapiunt, exprimuntur, & calidi adhibētur, vt leniāt, coquāt, laxent, discutiāt. E materia sedulò confusa, laxior sacculus & leuior esse debet, ne quid grauitate lædant, & exasperent, idque multò maximè in molli parte, & vbi dolor est. Modus est quū inde quiescit dolor, & minuitur moles. Nimiū est, si quod resoluas, in pus veritur, quod discutias, in scirrhu cogitur, si denique robur partis immoderato vsu dissoluitur. Cerata simplicia oleo minùs digerūt, sed firmitus herēt. E cera fulua triplo vel quadruplo oleo digerente, 10. vel 12. resinę parte, & reliqua materia, quæ digerat, infinita cerata cōficiēs. In superficiali vitio & materia tenui fatus ex oleo satis esse potest, vbi cōtumacior humor est, & altius latet, nō modo ceratis crassiorib. sed malagmatis & emplastris vti oportebit. Idq; plurimū fit in querelis articulorū, vbi in ceratis acopis, malagmatib. emplastris seligenda olea quæ conueniant, qualia & antè multa notata sunt, & nūc dicētur. E resinosis seminibus & affulis abietis, pini, picæ, tenax & vnguinōsum oleū elicitur. Cōueniente oleo & vino erinaceus coquitur dum putrescat, putrilago capta rariore linteo in ollam, quæ reliquum oleum habet, magno conatu exprimitur, & oleo mista articulis vitiis seruatur. Idē è vulpe, lutra, meli, cygnorum

rum pullis, testudine, ranis cato veteri & emascu-  
 to fieri potest. Quæ animalia digerenti materia, si  
 vis, infarcias, & ira coquas. Possunt etiam eo modo  
 facta & in veru fixa exassari. Excipitur pingue quod *Oleum e li-*  
 diffluat. Lignum sanctum pingue ac succosum, nō *gno. sancto.*  
 obductum siccū, aut cariosum, in fragmenta diuides,  
 vt inde hac arte exprimatur oleū, quæ & ex aliorū  
 lignorū assulis ac ramentis, omniq; materia, in qua  
 sit pingue aliquid & vnguinosum, olea deducas.  
 Duas figulares ollas satis amplas, quæ interiore ven-  
 tre plumbo vel vitro inducæ sint, ita cōparabis, vt  
 utræq; ore respondeāt, & planis labris non promi-  
 nentibus, neque rotūdis, exactē committi possint. *Ars deducēdis*  
 Atque cōueniet, alterius vasis margines intro proii- *olei e rebus*  
 ci, easq; rectas, nō decliues, nō elatas, his ergo mar- *pinguibus.*  
 ginibus craticula ænea, vel reticulum incūbat. Erit  
 hoc ad escariæ lancis imaginē conformatū, & con-  
 nexo gibbo deorsum spectabit, caua parte vertetur  
 fursum, extremo ambitu rotūdo, rectis labris vasis,  
 quæ intro prominent, infidebit. Assulæ lignorum  
 ita struētur, vt craticulæ marginibus extrema parte  
 nixæ quasi parallellos fingāt, ac rursus aliæ transuer-  
 so, aliæ in decussum superdabūtur, & ita attolletur  
 materiæ moles. Alterum vas, quod est reliquū, ore  
 & labris subiecti vasis marginibus aptabitur, utrū-  
 que argilla vel chymicorum luto compingetur. Ita  
 cōpositis fictilibus reticulo & assulis, totū vas in-  
 ferius terra defodi debet, vt extrema facie solo ad-  
 æquetur. Alioqui ædificiū aliquod luto, calce, gyp-  
 so & tegulis extruēdū in ambitu iusto pede latuare  
 equabili, in cuius medirullio quasi labellū sit, quod  
 deorsum hiet, in quod vas inferius deponi possit,

# INSTIT. CHIRURGIC.

atque tam cauum sit, quantū videlicet altitudo vasis est. In area ædificij mollis ignis è puro carbone paulatim succenditur, vnde superior olla, quæ tota extra fornacem eminet, concalescat, & ex eo materia quæ intus latet, exudabit liquor pinguis, qui per craticulę meatus in vas subiectū diffluet, isque sedulo colligendus, & vsui seruandus est. At lignem paulatim augeri necesse est, qui vbi senescere videatur, noua iniecta pruna foueri debet. Qua ratione veteres *καπνισμός* suū exprimebāt. Ex lini semine oleū trusatili mola exprimitur, cū farmētutio lixiuio subigitur, modicū terebinthinæ ad lentorē additur, mollit, lenit, digerit. Panis cibarius conditus sale è ricinino pinfitur, sugillata debet. Cataplasmata è farina fabacea, hordeacea, è panico, milio, lupino, orobo, cicere lolio, fœnugræco lini semine in putrescentib. & cōtusis ex oxymelite & lixiuio in aliis ex oleo farinæ subigūtur In putrescēti articulo cōtusoq; neruo circa initia fabacea & hordeacea ex lixiuio, pestea eruina ex eodē Galenus vsus est. Aliquādo etiā cōtusis simul & vulneratis neruis fabaceā oxymelite iūctā vsurpauit. In cataplasmatibus, quæ discutiāt aliquid misceri cōuenit, vt ne lēto offarciāt, multò magis si quid pestilēs ac malignū, vt in bubonib. & carbūculis pestilētib. ex quo Gal. puriores panes in carbūculis reiecit. Orobi farina diluto oxycrato cōcta, & in calido cataplasmate adhibita crassa viscidaq; secat & discutit. Eodē modo vsurpatur è lupinis, cicerib. & lolio, mitior est è fœnugræco & linospermate. Miliū egrē infriatur, & cataplasmata fingit. atq; hoc vt panico, sic cādo magis q̄ digerēdo vtēdū est, vtrūq; refrigerat

&

*È lini oleo  
& lixiuio.*

*Cataplas-  
mata.*

*Farina.*

& in oleo coctum discutiendo leniter facit. Cata-  
 plasmatib. miscetur puluisculi è spica, vocata lauā-  
 dula, chamemelo, meliloto & aliis. Modus ferè est,  
 vt farina ad puluisculos dupla sit, quāquā & tripla  
 & quadrupla, equalis etiā, vt corpus & vitiū exigit.  
 Fauos mellis è vino friges cū farina loliacea vel si-  
 mili, buthyro & terebinthina vel larigna subiges.  
 Bdelliū cum melle teritur, calx cum veteri axūgia, *Sales.*  
 lacserpitiū cū sulphure, molliunt, terget, discutiūt.  
 In durioribus phlegmonis sales cōmiscetur. Astring-  
 unt marini & digerunt, sed vstura tenuiora fiunt,  
 & vim astringendi deponunt. Cineribus ostreorū, *Cineres dia-*  
 buccinorū, crematis cochlearū cauis & testulis pe- *phoretici.*  
 ctunculorū vtimur inueteratis in scirrhum vergen-  
 tibus inflātionib. & parotidibus, triplo butyro,  
 œsypo, adipe concorporantur, cera interdū addita,  
 aut in ceratis adhibetur, quale fuerit butyri, œsypi,  
 cere. cinerū ostreorum ana semuncia. Eodem mo-  
 do salibus, sulphure, pyrethro, cardamomo & aliis  
 id genus vti oportebit, vel caricis in marina coctis  
 tuisq; ea commiscēda. Caprillum stercus ex aceto *Caprillū ster-*  
 tufum inueteratas parotidas discutit. Sed his omni- *cus.*  
 bus vtendū iam sedatis dolorib. & quieto fluxu, sa-  
 tis deniq; purgatis corporibus. Sulphur cū oleo ve- *Sulphur.*  
 teri, axungia, molli terebinthina, saliuā mistum, vel  
 in vrina & lixiuio maceratū venenatis morsib. con-  
 uenit, terget, attrahit, discutit, nōnūquā aceto prius  
 conspergitur. Calx lota in recenti axungia tenellis  
 corporib. adhibetur. Lapis calaminaris & quæcūq;  
 metallica acria sunt, vsta discutiūt, cruda mordicāt.  
 Sinapis m<sup>9</sup> vulgaris discutit. Sapo soluitur oleo. Sed  
 acribus nō vtendū, si quid doloris & caloris reliquū  
 est. Ac tumorib. qui in scirrhum abeunt, adhibentur.

Manè



# INSTIT. CHIRURGIC.

Manè & vespere commutantur, videndumque, vt ne nimium calfaciant. *Διὰ χαλκίτεως* neque vino, neque astringente succo pistum subduplo oleo veteri, ricinino, raphanino diluitur, vt sit liquidi cerati corpus. Atq; aliquando modū olei superare oportet, vt sint pharmaci ℥. 10. olei 12. In teneris corporibus & lacunis vicerū oleū paulò vincere melius est. In vigore & ante declinationē oleo dulci ætate media dissoluitur, in declinatione vetus oleum idoneum est. In contumaci vitio & minus calente, olei chamæmeli ℥. 3. ceræ ℥. 3. adipis anatis & gallinæ ana ℥. 1. chamæmeli & anethi ana ℥. 2. omnia lento igne cocta percolentur, vt fiat vnguentum. Al. Olei sicyonij ℥. 3. ceræ ℥. 2. In frigidiorē materia seminis fœniculi, anisi, anethi an. ℥. 2. farinæ lupinorum, farinarum fœnugræci & seminis lini ana ℥. 1. coquuntur vino, contunduntur affuso oxelæo, & ita applicantur. Papaueris cornuti folia, propoli pingui, vel pice molli strumas, bubonas, & similia emolliunt atque discutiant. Loco propoleos, pice liquida vel arida, sed soluta oleo, vt discutiat, vti licebit. Aliud. Colophoniz lb. 1. ceræ sesquilibra, olei lb. 3. simul liquatis addito salis torrefacti subtilissimè triti ℥. 6. vbi refrixerint, manibus conuoluto, cylindros quas Græci vocāt *μαγδαλίας*, nostri magdaleones, fingito, in vsu alutæ intendito, & adhibitum dolenti loco finito. Pus exugit emulgetque quasi miraculo, quod cum emplastro herēs deraferis, deintegro pharmacum induces, idque aliquoties repetendum. Medicamentum hoc durius dolor non sustinet. Idem præstat picis aridæ, ceræ nouæ ana lb. 1. olei lb. 2. blando igne fusa coniungantur. Al.

Picis,

*In contumaci vitio.*

*Aliud.*

*In frigida materia.*

*Pus exugans.*

Picis, ceræ nouæ, axungię suillæ, saponis nigri ana  
 ℥. 2. liquata transcolato, hydropisimos vacuat, & do- *Ad hydropis-*  
 thienibus medetur. Al. quod vehementer discutit. *mos & do-*  
*thienas.*

℥. galbani, castorei an. ℥. 1. liquefiant in olei ricini- *Vehementer*  
 ni sesquilibra, expresso & colato pharmaco adde *discutiens.*  
 picis terebin. an. ℥. 4. ceræ quod sufficit, vt fiat so-

lidū pharmacū. Hæc autē pertinacibus vitiis & in-  
 duratis phlegmonis imperanda sunt, in quibus est  
 quod molliat, coquat, trahat, discutiat. Inflamma- *Chalasticis*  
 tionum reliquiis si quidē nihil durum habeāt, satis *quādo ven-*  
 sunt chalastica. Rhodiaceum Asclepiadis curans & *dum solis.*  
 discutiens mammas induratas. ℥. lithargyri, ceræ *Asclepiadis*  
 amaræ ana ℥. 3. axungię benè purgatæ, cerusæ ana *mammis &*  
 ℥. 3. myrrhæ ℥. 2. olei ℥. 7. Lithargyrus oleo coqui- *sedis conueniēs*  
 tur, axungia colliquatur, & cera, ex quo cerusa im- *remedium.*

mittitur, sublatis igne myrrha inspergitur, translatis  
 omnibus in mortarium vitellus oui assatus commi-  
 scetur, vsus tempore conueniente oleo diluitur. In  
 sedis vitiis rhodino vel myrtino dissoluendum est.  
 Plura. 6. & 7. de compositione medicamentorum  
 γένν, & 15. Aēt. Et quæ vehementer trahunt, dia-  
 phoretica redduntur cerato, dulci oleo, vel adipe. *Ratio videri.*  
 ac breuiter pægoricis temperata, medię naturæ  
 medicamentis. Partem chalasticis fouebis, quæ re-  
 laxent, & spiracula rarefaciant, fundantq; materiā,  
 ex quo diaphoreticon induces, liquidum quidem  
 & molle initiis vbi dolor aliquis est, lenius etiam  
 & sistenti pharmaco mistum, atque hinc ad paulò  
 fortiora, nec tam liquida transeatur. Postremò vt  
 mitescit dolor, & fluxio minor est, ita ad efficacissi-  
 ma, si fuerit opus, & emplastri forma compacta  
 paulatim veniatur.

# INSTIT. CHIRURGIC.

De mollientibus. CAP. 4.

*Malactica  
quæ.*

*Vfus.*

*Scirrhi gene-  
ra.*

*Vnde infla-  
matio in scir-  
rhum trāfit.*

*Alia genera  
scirrhi.*

**M**ΑΛΑΚΤΙΚΑ sunt quæ modicè calida nulla vi-  
siccandi vel humectandi manifesta indurata  
corpora emolliūt, quanquam vt omnia ferè multi-  
plici natura coierūt, in malacticis censentur pluri-  
ma, quæ primo ordine calfaciant, secundo siccant  
ac tertio. Sed quæ malactica sunt, humido calidq;  
elemento temperari necesse est. Plurimus vsus est  
in tumoribus quos σκίρρωδεις medici appellant. Hi  
in musculorum finibus ferè concreſcunt, aliquan-  
do in mediis musculis, glandibus, visceribus, vlce-  
rum labris, ex materia crassa, lenta & frigida, qua-  
lis est pituita, & melancholicus succus. Sed è me-  
lancholico succo omninò canerosi sunt, & malag-  
matis exasperantur. Inflammationes in scyrrhum  
cogi contingit, si materia crassa & lenta est, si adhi-  
bita pharmaca quæ nimium siccant & calfaciant.  
qualia sunt ἐπιπρωστικά & ἐξίπρωτικά. Hinc enim  
tenue exprimitur, reliquum occalleſcit. Sic enim  
tophi in articulis, & calculi in renibus lapideſcunt.  
In tenui serofaq; materia nō ita metuitur scirrhus  
tota enim facilè exhalat, in crassa & viscida omni-  
nò declinanda, quæ siccant, discutiunt, astringunt,  
ſiquidem ſola molliendi cura est. Atq; omninò tū  
phlegmonæ, tum eryſipelata quæ cum duritie de-  
clinant, malacticis curanda ſunt, quæ citra hanc la-  
xantibus remediis & diaphoreticis vacuentur, Ma-  
lacticis quod clementer digerat interim commiſ-  
cemus, ſed quo iam tempore tumor durior cœpe-  
rit edomari, phlegmone & eryſipelata in ſcyrhum  
degenerant refrigerante nimisq; astringente ma-  
teria, ſed à phlegmone ſcyrhus amplior est. In  
vfu

vſu malagmatum certæ ſunt leges. Primùm enim <sup>Leges in vſu malagmatum.</sup> cognoscendum quantum pars ægra à ſua ſymmetria reſceſſerit, quãtò ſeipſa ſiccior atque humidior euäſerit, quantum denique vitiũ increuerit, ex quo æſtimandæ remediorum vires. Tum naturas partium diſtinguere oportet, poſtremò artiſcioſè colligendũ qua ratione emollias, nunquid admiſceas <sup>Deſperatus ſcirrus.</sup> quod detergeat, incidat, diſcutiat. In quorũ omniũ vſu modum & occaſionem animaduertas. Deſperatur ſcirrus, qui ſic occaluit, vt iam nõ ſentiat, & inde glabreſcat locus, deſperari dico, quia nullo malagmate domari poſſit. Etenim reſcindi ferro, & ſeptis exedi poteſt, niſi à ſubiectis nervis, venis arteriis metus eſt. Scirrus cui ſẽſus aliquis vel obſcurus, vt magis minũſve induruit, ita lenius aut efficaciũs auxiliũ requirit. Mulierib. pueris, eunuchis vrbaniſ hominibus, ocioſam atque vmbraſilem vitam degentibus lenior medela, nautis, meſſoribus, foſſoribus, duris omninò & laborioſis corporibus fortiora malagmata conueniunt. In lenta & con- <sup>In lenta matena.</sup> tumaci materia miſcendum aliquid, quod incidat atque detergeat, id in chordis & tendonibus fieri conſuevit. Tale eſt acetum muſſum, aut ſi ab aceto metus eſt, melicratum, in quo hyſſopum, thymum, pulegium aut calamintha præcoxerint. Eſt & hoc <sup>Differentia ſcirri.</sup> animaduertendum. Scirrus quidam ſimplex, alius φλεγμονώδης, vt quidam inflammatio σκισπρώδης eſt. Scirrhum malactiſ & diaphoreticis excuties, phlegmonem lenies, concoques, & in halitum vacuabis. Vbi vtrunque coit, vt hoc vel illud ſuperat, ita remedia temperabis. Malagmata in cerati <sup>Conſiſtentia malagmatis.</sup> craſſioris formã & corpus compingãtur, quæ inde

κρηστομα

# INSTIT. CHIRVRG.

κρᾶτομαλάγματα appellant, quanquam aliquando cerelæi, aut cerati liquidi, nonnunquam emplastri compage permiscantur, ut videlicet molle ac tenerum, squalens, durumque corpus est, & vitium habet. Cataplasmata sunt è farinis hydrelæo coctis. Quod si hydrelæo lini semē, althææ radices & liliorum ficus pingues, aliaque id genus prius incoceris, deinde in expressa mucagine farinas subegeris, magis emolles. Cataplasmata ita consistere oportet, ut mollia quidem sint, sed non diffuant. Adduntur cataplasmatibus, oleum, resina, quæ quasi vinculo pharmacū retineant, adduntur pistæ herbæ & semina, quæ vim malagmatis inaugeant. Sed modus sit, ne inde durius euadat, aut contra solvatur corpus cataplasmatibus. Integrum enim permanere, & compage iusta necesse est. In calore, phlegmone, parua duritie & natura molli paulò liquidius cōfingi potest, & rursus crassius, ubi omnia contraria sese offerūt. Ac diutius insistere pharmaca vtile est, neq; vno die sæpius absolueri oportet, nisi exaruisse videatur, ac ne exarescant celerius, oleo, adipe, mucagine ferè coniunguntur. Leniter emolliunt butyrum, œsypus & lana succida, hæc oleo inculcanda, amygdalino, lirino, chamæmelino, oleo, in quo semen lini, althææ, scœnogræci, in quo maluæ, althææ, cucumeris agrestis, & liliorum radix, tenella maluæ agrestis, & liliorū folia, vel viridis anethi cacumina præcoxerint, in quo aliquid illiquatū fuerit galbani, ammoniaci bdellij. Molliunt & hæc, lentiscinum, terebinthinum, mastichinum, quæ tum peculiariter vsurpantur, quum præterea digerendum ac leniter repellendū. Hyosciamino, violaceo, nentharino

Cataplas-  
mata.

Particulariū  
materia.  
Olea mala-  
ctica.

Vtendi mo-  
dus.

pharino locus est in ea inflammatione, quæ iam videatur indurescere, hæc ergo olea in lana sordida molliter apprimuntur, ex quo malacticum impingitur. Omnia verò prius intepescât. Etenim frigida omninò vitanda sunt. Expressa oleorum materia & cū adipe pista aut cataplasmatibus cōcorporata, malagma finges, ut liliorū radice cum adipe anserino mista. Olea quæ tenuitate parviū celerius permeât, ex emplastris mollientibus Chymicorum arte educuntur. In malagmatis censenda sunt vitellus oui, crocus, cera vnguinosa, carice pingues. *Κηέλαιον* è duplo oleo ut sit liquidissimū, æquali, ut sit medium. Iam crassum est, quod ceræ partes quatuor & olei tres continet, magis emolliet quoddam ceræ pingui, dulci oleo lirino vel simili tēperatum sit. Cera alba recens, mollis, cum æquali pōdere butyri, resinæ liquidæ vel colophonix pulchrè emollit. Caricæ pingues cū irino, lirino, capparino, trite scirrhis hepatis & lienis opitulatur. Id habet peculiariter scirrhus hepatis, quod leniter mollientia desiderat mistis aromatibus, quæ calefaciāt & tenuent. Sed hæc vincere oportet. *Σίραον* è pinguibus caricis ad mel lignem coctis, molli, terget, digerit Adeps & sebum. Vtrunque coquit, laxat, & molli quæ quia materia vnde generantur, genere animalium & loco ubi con crescut, natura deniq; (adeps enim mollior est) differunt, cum Aristotele distinguas licet, ut in natura molli, adipe, in dura, sebo potius utendū putes. Rur sus quia nimium est quod dissidet, misceri possunt. Vtrunque genus natura & specie animalium, ratione vitæ & pabularione, sexu & ætate, deinde quia hæc recentia, illa vetusta, alia sincera, alia cōdita sale & aromatate

*Frigida vitanda.*

*In scirrhis hepatis & lienis.*

*Σίραον. Adeps & sebum.*

*Ex quibus adipēs & sebi genera distinguas.*

# INSTIT. CHIRVRGIC.

Aromate vel externa imbuta qualitate, distinguendum est. Lenissimus suillus adeps (axungia vocant) in qua mirum est, & experimento constare veteres scripserunt, quod ea genibus alligata redit in os sapor, vt etiam expui videatur. Ex quo fortasse non vnus hydragryri qualitate, sed totius misturæ ex eo & axungia illitis in lue venerea os grauius exhalat, & salua madet. A suillo sunt vitulinus hœdinus, caprinus, bubulus, quib. si lubet, vulpinum & leporinum adiciēs, atq; hi leniunt magis & concoquunt. Efficacissimus est leoninus, cui proximi sed inusitati, hyæninus, pardalinus, deinde vrsinus, & hi duriora corpora molliunt. In medio sunt taurinus, hircinus, ceruinus, quibus ascribi possunt arietinus, equinus, asininus, caninus admodū efficax est. Taurinū sebum omniū domesticorum animalium pingua, siccādo superat, tenuitate partium à leonino, pardalino, & hyænino superatur. In volatiliū genere efficax anserinus adeps, anathinus, olorin⁹ siccior ē gruibus & prædatoriis auibus suauis gallinaceus, calidior colūbinus. Ex anguillis & fluuiatib⁹ piscibus, lāguet, ē marinis ferē siccior & calidior est. Humanus mediocriter habet ad omnia. Domesticorū animalium pingua humidiora sunt, vtsuū quā apro rum, ē maribus sicciora & calidiora. Caltrati mares fœminis respōdēt, ideoq; veruecinus adeps arietino languidior est. E iuuenibus animalib. humidior est vnguedo, ē senioribus siccior. Adipes oleo magis emolliūt, etate calefaciūt magis, tenuiores fiūt, acrimoniam contrahunt. Purgatur adeps exemptis venis, quas fibras vocāt. Salsus vel cōditus aromate siccior est. At cōstat pepticis & malacticis aduer-

sari.

Tres ordines  
adipum.  
Pus  
Efficacissimi  
adipes.  
Medij.

Taurinum  
sebum.

Volatiliū  
adipes.  
E piscibus.

Salsus adeps  
& qua sic-  
cant.

fari, quæ nimirum siccant, quanquã Plinius cõuenire scribit iãlsam axũgiã mollire magis. Id in suillo adipe fortasse concedi potest, qui alioqui parum emollient. Recēs adeps si deficit, & vetus ad curã reuocandus est, liquifieri prius oportet & purgari fibris mox frigida sæpius lauari, postremò etiã vino quã odorantissimo. Eo modo sæpius liquatur, cogitur, lauatur aqua & vino. dum omne virus exuat. Quod grauiter olet ferè odiosum est, ex quo odoratis aquis arte chymica illectis (*γαλαγματα* vocant) sæpius lauatur, aut ex odoro vino subigitur. Infumatur etiam iisdem aquis, quæ momentũ moschi, vel ambaris cõceperint. Medulla in sebalib. in adipos animalibus adipi respondet, viscera, chordas, tendines, musculos emollit, ex ossibus humidior, è spina siccior est, Prima laus ceruinę quę nullis malacticis inferior est, vitulina sequitur, tũ ouilla & caprina. Acrior taurina est, quàm vt emolliat. Atq; hæc leuiora sunt. Iam verò durioribus corpqrib. conueniunt ammoniacum, quod aceto liquari potest, leniter decoquendũ ne effervescat, id si menitur, ex aceto leuigatur in mortario, & reliquis in cacabo coctis permiscetur. Bdelliũ molle & pingue saliuã hominis subigitur, mollit, coquit, modicè digerit. Styrax idem efficit, verũ liquido, aut melliginoso vtendũ est. Nam neque styrax aridus, qualis est, quam calamitẽ vocat, neque ammoniacũ, neq; denique quicquã generis eiusdẽ malactico est, vbi iam exuccũ inaruit, & discutiẽdo vsurpandum est. Galbanũ præterquã quod mollit, coquit, discutit, etiã septicon est, & dolorem lenit, purgatur sordibus hoc modo. Mundo linteo raroque cõuoluitur,

*E vetere adipe quomodo recens paratur.*

*Medulla.*

*Que magis emolliunt. Ammoniacũ.*

*Bdellium. Styrax.*

*Galbanum.*



## INSTIT. CHIRVRGIC.

& ita feruidæ immiērgitur, vt pendeat quidem, ne fundum attingat. Nā per raritatē linthei colatur galbanū, sordes in lintheo retinentur. Liquefit vino vel aceto, aliisq; modis, & coctionem non sustinet. Efficacior opopanax. Ladanū mollit ac repellit. Propolis ammoniaco vicina est, & qua (vt antè dictum est) pro galbano veteres utebātur. Sint hæc omnia mollia & pingua, pro sua quæq; natura, quæ si ætate inaruerint, nec ad magnum fuerint molliora, pingui oleo instaurare oportet. Malacticis, quæ amplastica esse conuenit, resinæ coniunguntur. Resinæ sint quæ acrimonia careāt, chia mastiche, larigna picea. abietina. terebinthina. Pineæ nimium siccant, strobilina acrior est, bitumē & pix aridiora sunt. In summa, quæ nimium siccant, quæq; acria sunt, reicere oportet. Neque enim iuuare possunt, nisi aliis tēperantur. Pix mollis & bene pinguis, qualis olim Brutia, utilis est. Neque verò pix, neq; resina molliēdo idonea est, nisi vel liquida, vel ita mollis, vt tracta facile sequatur visco similis vel ceræ, quæ vt paulò firmior sit, q̃ vt sequatur, pressa tamē digito concedir. Acrior & siccior repudianda est, quæ liquidior videatur cera, ceratis & magis corpulentis malacticis colligatur. Durior pingui & oleo macerari debet. Butyrū, pingua, atq; omninò liquabilia, vesica suis includuntur, demergitur hæc aqua calida vase cocepta, in quo coxerint quæ emolliēt. Sic illa paulatim eliquantur, & ascititiā vim transpirante halitu per vesicā combibunt. Succedit his miraculosum ex aceto remediū, quod nō temerè, sed summa ratione adhibendū est. Scirrhus malactico oleo fouetur, ex quo inducitur malagmate, hoc diebus aliquot permittendum.

*Opopanax.*  
*Ladanum.*  
*Propolis.*

*Malagmata*  
*emplastica*  
*sunt.*  
*Resinæ.*

*Pix.*

*Aceti vsus.*

mittendum loco, neque prius reuellendum, quàm exuccum solutumq; videatur, hic ergo detrabi potest. Quòd cū feceris partim oleo, vt prius, fouebis malagma nouū & bene succosum impinges, quod priore paulò sit efficacius. Mora igitur dierum aliquot interposita pharmacū reuelles, animaduertens, quantum emollierit, vt si lenius videatur, vim eius inaugeas, ex quo gradatim ad ea quæ acetū cōbiberint, peruenias. Quæ omnia posteaquā profecisse animaduertentis, & mollior tumor extiterit, pyritem lapidem molarē, aut silicē, vnde scintilla decutitur, candentē igne, acerrimo aceto merges. Exhalabit plurimus vapor, quo scirrhus aptè infumandus est circūsepta parte, ne dissipetur fumus, sed totus in scirrhu cōeat. Locū iam satis infumatū oleo tepido fouebis, & reuocata prima illa curandi via malagma applicabis, atque ita bidui vel etiā tridui interiecta mora aceti vsum & igniariū lapidem reuocabis, vt sit aceti vicissitudo & remediorum quæ molliunt. Verū, neque diutiùs, neque sæpiùs habitu aceti, pars vexanda est, ne in lapidē concreascit, & neruosum genus grauius laceffatur. Sed vt molliendo profeceris, ita acetū & effumantem lapidem repetes. In malacticis quoque vsus aliquis interpellari debet, primū enim (gratia exēpli) ē pinguibus caricis, medullis, adipib<sup>9</sup>, cera & oleo exigua resina mista malagma conficies, aut parygron vsurpabis. Tum vt res succedet, ad ammoniacū & similia veniendum, ac primū quidē hęc citra acetū, deinde cum aceto lenioribus cōmiscebis, quibus quū vno vel altero die fueris vsus, ad ea quæ leniora, quæq; sine aceto fiunt, curam reuocabis, vt veluti circulo

*Infumatio ex  
pyritice & ace  
to.*

c 3 quodam

# INSTIT. CHIRURGIC.

*Remedia  
composita*

*Ex ammoniac  
co splenicis.*

*E fermento  
hepaticis.*

*Aceti vis  
quomodo in-  
tendatur.  
Lenia mala-  
ctica.*

*Rudicula  
malactica.*

quodam & è re nata auxilia transmutentur. In m-  
sculis & liene tutior aceti cõsuetudo est, in chordis  
& tendonibus, neque diutius, neque frequentius  
utendum erit, vbi scirrhi magna ex parte coalescunt.  
Atque hæc de aceri vsu breuiter dicta sint. Ammo-  
niacum aceto fufum manibus diducitur, vt sit luti  
crassitudo, tum ex irino, sirino, capparino pinfitur,  
terebinthinæ sextula coniungitur, puluerentur ora  
cumino trito, aniso, sale torrefacto, & in alutâ expli-  
cata splenicis affiguntur, fermentû coquitur aceto,  
hæpati duro & lieni, potest oleo vel butyro cõdiri,  
& terebinthina colligari. Fortius acetum est in quo  
thymum, hyssopum, pulegium, & similia tusa ma-  
duerint. Lenæ malacticum est butyrum, cera, resina  
æqualiter mista. Eodẽ modò adeps cum cerato iũ-  
ctus & resina. Caricę pingues in sapa coctę, & vino  
dulci cum lirino tustæ. Lini semen hydrelæo coqui-  
tur, & cum adipe infringitur. Althæę radix arida in  
pollinem resoluta, malagmatis inspergitur. Eadem  
radix qua parte pinguis & quasi medullacea est, era-  
ditur, & resina colligatur. In conficiẽdis malagma-  
tis rudicula utendum est è resinosis arboribus, nec  
astringetib. è caule maluaceo ex affulis tedæ. Alio-  
qui malux folia extremæ spathæ alliganda, vt inde  
verses, volutes, ac deniq; cõficias malagmata. Licet  
etiã more nostro & exẽplo veterũ rarũ linteum  
infarcire lini semine foliis althææ aliisq; id genus,  
& extremo veruculo velut caput alligare inde phar-  
macũ circumagere, nõdũ caput hoc nostri, veteres  
κροκυφάντιον appellarunt. Quod si fuso butyro,  
adipe, oleo intingas, idque sæpius repetas, dũ me-  
dicamentum in cacabo vel mortario conuoluitur,

μαλακτι-

μαλακτικώτερον hoc est magis emolliens pharma-  
cū relinques. Atq; hoc semel quasi exemplū positū  
sit, vt in aliis pharmacis. spatha, veruculo, capite, as-  
ferculo, aliisq; id genus instrumētis conuenienter  
vti possis. Parygron Heræ & veteribus laudatū re-  
cens dolorem lenit, phlegmonas mitigat, paruis in-  
flammationibus medetur, id quod lenioribus ma-  
lagmatis omnibus cōmune est. Parua vlcera cica-  
trice claudit, si coctis prius metallicis comparatur,  
recens liquidum est, vnde nomen habet, ætate verò  
cōcrescit, recētis vsus in paruis inflāmationib⁹ quę  
doleant, cōcreti & vetusti in phlegmone declināte  
non dolente quidā, sed iam durefcēte, quę vt ma-  
gis min⁹ve induruit, ita vel vetustius, vel min⁹ ve-  
tustū parygron requirit, quanquam eò vsque occa-  
luisse cōtingit, vt nē vetustissimo quidem parygro  
iuuari possit, tūmq; maioribus auxiliis certādum  
erit. Itaq; vt mollias, parygro vtendū non ita liqui-  
do, nisi fortasse in mollioribus naturis. neque con-  
creto, nisi in callosis corporibus, omninò verò mo-  
dicè durū sit quod emolliat. Vetustius oleo, butyro  
adipe dissolui potest. Est autē mistura hæc. ℞. adi-  
pis suilli recētis & bene purgati ℥. 44. cerę pinguis  
℥. 24. cerusæ litharg. an. ℥. 6. liquabilibus confusis  
metallica trita colligūtur. Al. mediocriter emolliēs Perniones ad-  
uans.  
callosas rimas calcaneorum & perniones adiuuans  
℞. lithar. cerus. ana ℥. 3. succi seminis lini, olei an.  
℥. 20. cerę ℥. 8. adipis suilli ℥. 14 colophonis ℥. 18.  
Similiter priori cōparetur διαλθαίων clauis, car-  
bunculis, furunculis ℞. lithar. olei an. ℔. 1. galbani  
℔. 1. semiss. cerę terebint. ana ℔. 1. radicū althææ  
fasciculos 4. lithargyrus ex oleo diu teritur in mor-  
tario.

# INSTIT. CHIRVRGIC.

tario, cera & terebinthina fusa comiscuntur, galbanum purgatum & ut antè, fufum colatúmque adiungitur, postremò radices tusæ ligneo pistillo incorporantur. Aliud *διαλθάνων*. ℥. radices altheæ & liliorum ana ℥. 2. coquantur in hydrelæo ad aquæ consumptionem, ex quo in olei expressi lib. 1. lithargyri lib. 1. coques, dum nō inquinet, & adipis suilli lib. 1. commiscebis. In his omnibus vis efficacior est oleo & adipe veteribus, aucta & magis cocta lithargyro, utrisque pingui & oleo recentibus mitior est. Media verò altero recenti, altero veteri, Mediocriter mollit. ℥. colophonix purissimæ ℥. 2. ceræ albæ ℥. 4. mastic. ℥. 1. olei quod sufficit. Al. terebint. ceræ ana ℥. 9. galbani nitri ana ℥. 1. thuris pinguis sesquuncia, medullæ cerui ℥. 2. propolis pinguis sesquuncia, olei laurini, sepi vitulini ana ℥. 2. vel eo plus vehementer mollit & discutit. Violentū quod sequitur rusticis corporibus accommodatum, in ueteratis hac iam dolentibus scirrhis, tentatisq; prius lenioribus remediis adhibetur desperatis splenicis & parotidibus, *διανομαγγία* vocant. Caprillum sterqus aceto solues, vel ut ne tā acre sit, oxycrato, mitius etiam si dilutum pharmacum polentæ iunges & effuso oleo cataplasma finges. Aliud. ℥. stercoreis caprilli ℥. 2. radices cucumeris agrestis, ficuum immaturarum ana ℥. 1. herbæ pedicularis, bdellij farinæ fabarum; amygdalarum amararum ana ℥. 1. facis olei antiqui quod sit satis ad emplastrum, tuis omnibus medicamentū in mortario conficies. Est & hoc potentissimum. Subigitur caseus putris & vermiculosus è iure in quo suilla perna diutius coxerit. Arthriticis tophorum particulas sine ferro detrahit

Ex caseo putri.

detrahit & sanat. Eadem præstat quasi miraculo  
coctum cnidum cum myrrha & aceto tritum. Sed  
horum multa non tam mollire, quàm secare, & vi  
discutere, videri possint. Celebre iā olim ac veluti  
per manus traditum Menecratis emplastrum, quod  
Democrates metro reddidit, & διαχυλῶν ex au-  
thoris instituto appellauit, quod nomē leuiter mu-  
tata voce ætas nostra retinet. Recentia vulnera in-  
flammatione vindicat, vel (vt alij) νεύρωτρωτα ner-  
uorum vulnere, sæpè enim νέωτρωτα & νεύρωτρωτα  
alterum pro altero in Galeni libris, vbi medicamē-  
tum hoc describitur, supponi solet. Diuisa glutinat,  
& quæ inflāmantur curat, optimè pessis adhibetur,  
diuturnis & recentibus vteri inflāmationibus, im-  
plet cauernas vlcerū pistum rosaceo vel bono myr-  
teo, & cicatrice tegit. Olei estate lib. 7. aliàs lib. 7. &  
semis. hyeme libr. 9. axungia recentis lib. 7. lithar.  
subtilissimè triti lib. 6. scænu græci heminam vnā,  
aliàs vncias 9. feminis lini viti tantundem, radicis  
agrestis malue recentis & succosæ vel althææ lib. 3.  
Habeatur olla amplo orificio, in quam fundantur  
aquæ sextarij octo. Sic enim notatur Græcè per li-  
teram x. quanquam fortasse substituendum x. quæ  
viginti significat. Ac viginti sextarij mensura Pari-  
sienfi 15. pintas implent, sextarii octo sex pintas. In  
aqua, purgata radix & concisa coquitur, semina im-  
mittuntur, exprimitur succus in linteo, eius succi li-  
bræ quatuor cū oleo coquuntur. Maiores primum  
bullæ existent, deinde minores & crebriores, hic  
lithargyrum insperge, coque omnia molli carbo-  
ne, dum succus omninò confectus videatur, ac me-  
linum & bene coloratum fuerit emplastrum, non

## INSTIT. CHIRVRGIC.

inquinans, neq; nimis durum. Sic enim apud Gal. 7. de compos. pharm. *ἡ δὲ ὅλη*. Orib. habet aquæ sextarios 12. id est nouem pintas & radicum lib. 4. & seminis vtriusque sextarium vnū, vel  $\mathfrak{z}$ . 18. & lithar. lib. 2. Radices alij purgant, tundunt, & prius quam coquant, diem integrum macerant in aqua, post tri-die foenugræcum lotum fideliter & purgatam adii-ciunt, tertio die lini semen similiter lotum eadem aqua, vbi reliqua etiamdum madent, immergunt, quarto die coquuntur omnia ad crassitiem, expres-sus & colo traiectus succus vsui seruetur, vt videli-cet cum oleo, vt prius, coquatur, & addita lythargi-ro pharmacum conficiatur, quod deinde conuol-uatur rude, subigatur manu, & in pastillos confor-metur. In vsu capiunt pastilli  $\mathfrak{z}$ . 2. ceræ, olei an.  $\mathfrak{z}$ . 1. & omnia colliquant. Ex eadem materia magdaliæ officinarum emplastri diachylon fiunt sed non ea-dem ratione, iam remollita parte vbi discutiedum, ireos tritæ pars duodecima plus minusve adicitur, si sedandus dolor est, muccago è meliloto, si etiam calor adest, è psyllio, potest etiam intingi croco. Potest diachylon aliis malacticis commisceri, tam efficax, vt vnū sine aliis charurgo satis esse possit. Superficialia vlcera giutinat solum rosaceo vel myrtæo. Liquatum chamæmelino vulnera neruo-rum inflammatione prohibet. Podagricis quouis tempore opitulatur, veteres vteri phlegmonas per-sanat indutum pessario. Potest & alia præstare, quæ vt intelligas, describendum pharmacum, quod an-te diachylon Democrates memorauit, vt obfessa inflammaione liberes musculos, neruos, perioftion membranam punctam (vnde dolor, inflammatio febris

febris, sitis, vigilia, atque id genus accidentia vindices, vt podagricos quouis tempore adiunes; & *Emplastrum Democratis.* prohibeas collas. Accipe litharg. auri in pollinem triti lib. 2. axungia vetustissimæ lib. 4. libram verò & 3. quaternas olei veteris & crassissimi, non foetidi, non nigri, non asperi. Axungia liquefcit igni, purgatur fibris, in vas aliud satis amplum transfunditur, adduntur olei 3. 10. vt simul ferueant, relinquuntur olei 3. 6. quas, si fuerit opus, & medicamentum crassius appareat, postea affundes. Crasso iam pharmaco lithargyrus inspergitur, coquuntur omnia blando igne, & assidue versantur spatula è picea, atq; vbi emplastri forma fuerit, auferatur igne, paulò durius ætate, hyeme mollius, sed vt non inquinaet. Sublatum igne mouetur, dum refrigerat, atque hic rursus duriter versatur manu, iungitur atque reponitur. Vfus tempore molliri debet, & aluta intenditur, permagnaque splenia super accommodantur. In neruis crassis & musculis, durioribus mammis, & tumentibus articulis radicis althææ purgatæ sordibus: & in taleolas cæfæ lib. 1. medicamento indes quo tempore reliqua iam ad focum feruēt, priusquam lithargyrus inspergatur. Vtriusque vires tum illius quod sine althææ radice, tum huius quod cum ea radice fit, emplastrum illud diachylon continere scripsit inuentor Menecrates, quod & alij aliter conficiunt. Aliud diachylon, vt Oribas. è semine lini, fœnugræci, hordei, radice althææ, vt prius maceratis, coctisq; succus exprimitur, libris duabus succi adduntur lithargyri olei ana lib. 2. ceræ 3. 8 Lithargyrus cum oleo diu teritur, & cum cera leniter incoquitur affuso oleo postremo

*Aliud diachylon.*



# INSTIT. CHIRVRGIC.

postremò succus adiicitur, versantur omnia, & se-  
culò permiscantur. Sūt & alia *διαχυλῶν* malagma-  
ta, vt Alexandri è psyllio quod Aetius describit, &  
magnum Mesuæ sine gummi, & cum gummi fa-  
ctum, quòdque album, paruum & magnum confi-  
citur. Paruo vtendum in duris inflammationibus,  
album mediocres scirrhus adiuuat, magnum reli-  
quis efficacius est. Giluum Haliei cruētis vulneri-  
bus, præcisīs neruis & nudis remedio est, inuetera-  
ta vlcera cicatrice tegit, digerit, venenatis hominū  
& animalium moribus medetur, duritias maximè  
mammarū mollit ac discutit, atq; omninò eo vete-  
res vsi sunt, vt optimo & admirabili medicamento.  
Descriptū est tertio & 5. lib. Gal. de compositione  
pharmach. *ἄλγυν*, ℥. ceræ, argenti spumæ ana 3.  
100. terebinth. mannæ, galbani, rubricæ sinopidis,  
terebinthinæ ana 3 1. ol. sextariū 1. vel li. 2. Oleū &  
litharg. dum non inquinant, coquito, hic ceram, re-  
sinā. que iniicito, sublatis igne rubricam, galba-  
num, mannā deinceps adiungito, Quidā myrrhæ  
3. i. miscuerunt & ceræ non centum, sed tantū  
octo denarios scripserunt. In præcordiis tensis, dif-  
ficili motu articulorum, vetus ac nobile est. Amy-  
thaonis emplastrum quod omnem duritiā soluit.  
℥. ammoniaci 3. 36. ceræ 3. 36. terebin 3. 8. bdellij,  
galbani ana 3. 3. thuris. mirrhæ ana 3. 4. cyprini, vel  
olei terebinthini alioqui mastichini heminas qua-  
tuor, myrrha, thus, bdellium vino madefiunt, am-  
moniacum aceto diluitur, omnia contunduntur pi-  
stillo, quod oleo inungendum, quousque perfectè  
dissoluantur. Et hoc etiam fortius est Cathegeræ  
malaeticon ad contractos articulos, & ita occupa-  
tos,

*Giluum ad-  
mirabile.  
Haliei, seu  
piscatoris ex  
synopide.*

*Amythaonis  
emplastrum*

tos, vt non moueant, internos abſceſſus, opifſtho-  
ricos, neruos dolentes, inueteratas & contumaces  
duritias.  $\mathcal{V}$ . bdellij ſeui vitulini, ammoniaci, iridis  
illyricæ ana  $\mathfrak{z}$ . 2. opopanacis, galbani, canchryos,  
vel baccarum lauri, ſtyracis, thuris ana  $\mathfrak{z}$ . 1. piperis  
gran. 160. ceræ, terebint. ana ſelibra. vini & fæculę,  
irini vnguēti quod ſufficit loco huius, vel oleo iri-  
no cōdito aromatibus vtendū erit, vel aliquod ex  
iis quæ apud Meſuem cōpoſita ſunt, ac cōdita aro-  
matibus vſurpandum. Conſcitur vt prius  $\kappa\omicron\pi\lambda\alpha$   
hæc, quaſi tuſilia, ex conſcindi ratione veteres ap-  
pellabant. Plura ſeprimo de cōpoſitione pharma-  
 $\mathfrak{C}$   $\gamma\epsilon\nu\kappa$ , & 15. Aetij deſcribuntur. Sed & oſtauo  
 $\mathfrak{C}$   $\tau\omicron\pi\alpha\varsigma$  malagmata ſunt quæ ſiccāt, cōtrahunt,  
indurant, atq; emolliunt, quanquam Aſclepiadi &  
Andromachō malagmata appellata, quia videlicet  
non ſolæ vires, ſed & compages, ac corpora medi-  
camentorum in ratione nominū ſpectata ſunt. Ac  
ferè malaſtica corpulenta ſunt & emplaſtica, ſi ne-  
que dolor, neque phlegmone, neque mollities cor-  
poris prohibet. Locus oleo fouendus, ex quo ſubii-  
ciatur malagmata remollitū pingui vel oleo, ne ce-  
leriùs exareſcat. Tunc enim reuellendū eſt, & aliud  
imponendū, alioquin pluribus diebus hætere con-  
ueniet. Iam verò in malaſticis, quæ noſtra hac me-  
moriam in vſu ſunt, emplaſtrū de meliloto, aliud ab  
eo quod veteres  $\delta\iota\alpha\mu\epsilon\lambda\iota\lambda\omicron\tau\omicron\varsigma$  deſcripſerunt. Eo  
vtendum eſt, in craſſa ac frigida materia, incidit,  
mollit, attenuat, calefacit. Quod de muſcillagini-  
bus appellant, molliēdo magis idoneū eſt, & dolo-  
rem lenit. Dialthæas mollit, lenit, coquit, incidit, di-  
gerit, ceroneum repellit, coquit, mollit, incarnat, &

Malagmata.

Cenſura re-  
mollientium  
quæ nūc vſi-  
tata ſunt.

multiplicis

## INSTIT. CHIRURGIC.

multiplicis vsus est. Resumptiuum mollibus corporibus cōuenit, optimè mollit ex folis muccagini-  
bus. Emplastrum filij Zachariæ parabile est, & mediocriter mollit. Arthanitæ emplastrum strumis & lieni duro cōuenit, vnguentum de bdellio mollit, incidit, discutit, diachalciteos soluitur lirino. Oleo è maiorana aliisq; id genus molliiri possint, & adiecto galbano, bdellio, ammoniaco & similibus fortiora reddi. Priuatim conueniunt duris inflammationibus mammarum. Violariæ & althææ folia hydrelæo cocta adipe vituli conteruntur, ouorum vitelli duo infecti croco commiscuntur. Hædina capita, veruecini pedes cum althæa & violaria percoquuntur, in expresso succo oryza bene munda & asperiore linteo attrita decoquitur, butyrum recēs iniicitur, postremò cum iam corpulenta pulicula est, ouorum vitelli croco intincti commiscuntur. Al. In Caricarum decocto fabacea farina subigitur adiecto oleo violaceo & aceti momento cataplasma fingitur. Multa ad mammarum duritias & abscessus. 7. de comp. pharma. xxi. yviii. Caterum grauius peccatur cum emplastra malactica è galbano ammoniaco, opopanace, resina & aliis squalidis comparantur, & aceto multo diluuntur. Sic enim tenuant, incidunt, discutiunt, non molliunt.

### De suppurantibus      CAP. 5.

**I** Am hoc genere vtendum nobis, quum ab aliis remediis desperatio est. Verum in fracturis capitis contuso pericraneo relicta alia medendi cura, ad suppurationem statim conuertimur, specillo vulneratio perioition diducimus, labra vlceris in decussè ducta nouacula ampliamus, cōscalpimus  
cranium

*Ad mammas  
duris inflam-  
mationibus  
obfessas  
Aliud.*

*Cautio obser-  
uanda in ma-  
lactica.*

*Quando sup-  
purantibus  
vtendum*

*Quæ meden-  
di cura inueni-  
da in fractu-  
ris capitis cō-  
tuso pericra-  
neo.*

craniū, & abradimus medicamenta quæ quàm celerimè suppurent adhibemus, suppurata diligenter repurgamus, siccamusque, vt iusta nascatur caro. neque mollior quàm oportet, neque durior, & quæ non excrescat, vt denique conquassati ossis testula à viuo osse maturè deducatur.

Venereos bubonas, quicquid; abscessus in articulis & ad articulos confederunt, celerius maturamus, ne inclusum virus, aut latens fanies periculum aliquod admoliatur.

Alioqui tumor omnis prohibeatur, aut discutatur potius quàm suppuret, nisi iam eo conuerti natura videatur, excessitque tempus, in quo conuenienter discutias. Ac ferè maiores phlegmonæ suppurant, pulsant, dolent. Dum pus conficitur (inquit Hippocrates) dolores fiunt ac febres. Suppuratis omnia ferè conquiescunt. In suggillatis hæc eadem remedia sæpè conueniunt. Imbecillæ parti, putri ulceri & tumori, cancroso, rheumatico, Telephio, Chironio, atque omninò maligno frustra maturantia adhibeas, putrescunt enim illa tum malaëticis, tum pepticis medicamentis. Ad scarificarum igitur & remedia acria decurrendum, vel quæ plurimum siccant. Sint autem quæ suppurent, natura modicè calida & humida, iisdem limitibus circumscripta, quibus temperiem hominis definias. Ideoque eligenda materia, quæ naturæ corporum elementari familiaritate cōsentiāt. Emplastica sunt

*In venereis  
bubonibus &  
articulis celerius cur maturamus.*

*Hippocrat.  
aph. 47. li. 2.*

*Natura suppurantium  
qua sit.*

*Emplastica sunt, quæ suppurent.*

διανυτήρια, ( sic enim appellant ἐμπύρινα καὶ πεπλικά ) vt præclusis inde spiraculis natium calorem inhibeas, in quo cōcoquentis naturæ robur est. Ita substantia quidem calor augebitur, neque qualitate crescet. solidæ partes cōfirmabuntur, in-

situs

## INSTIT. CHIRURGIC.

*Pus quomodo  
generitur.*

fitus humor saluus persistet, dissipabitur verò qui inanibus spatiis alienus est. Ex quo vitium concoquetur, & consuetudine partium simularium exalbescet, fietque tandem pus album, leue & vniforme, quod quia alimento esse non potest, exesa cute vias sibi faciet, atque ita effluet. Nò absimili ratione χαλαστικά vocata ἐκφυτικά fient, si accesserit crassities partium. Eodem modo quæ leniunt, calefaciunt & adstringunt. Emplastica modicè calida omnia concoquant. Præit in his quod est tenue, reliquum verò vel cōtracta, vel illita cute vias intercipit, ne quid spiritus exhalet. Contrà verò si expirat, & aliquando alienus calor succenditur, vnde putredo. Echecolla, quæque tenaci & viscida materia temperata sunt, per se inhærent, reliqua verò vel gummi, vel resinis mollibus implicanda, alio-

*Malactica  
quid differat  
à peptico.*

qui commodè alliganda sunt. Malactica calidiora sunt, & leniter siccant, insitumque humorem paulo minuunt, quo nomine à peptico distinguenda, ne similitudine fallant. In peptico vitanda quæ detergent, & quæ vehemèter calefaciunt. Nihil enim

*Vitanda.*

quòd validè discutiat, pepticon est, & quod deterget, porros expurgat. quos illinere oportet. A siccantibus metuitur, ne frugi materiam exorbeant, multò magis si præterea excalfaciant. In summa modicè calfaciant, atque adeò emolliant potius, quam siccant. Neque verò contra nos faciet, quod in historiis medicorū permulta peptica sunt quæ mistis diaphoreticis deterforiis atque desiccantibus temperentur, quin & simplex pharmacū est, quod concoquat & discutiat, vt galbanum, maturet, digerat, detergeat,

detergeat, vt terebinthina: qualitas enim rerum mixtura retundi potest, & multa vitia eodem tempore interdum cōeunt, vnde varia miscerīne cēsse est & iis semel vti, quæ πολυχρηστὰ veteres appellant. Ac sepe facit abscessus natura, vt etiā acria misceamus. *Aqua temperate calida pepetica.* Qualis est, qui lenta & contumacia materia concreuit, & eo nomine tardius suppurat. Peptica sunt, aqua réperatè calida affusa parti, modus est, vt inde erubescat locus, ac leniter extumeat. Nimum sit si inde subsideat aut expalleat. Hydrelco, oleo pingui acdulci modicè calido, similiter & butyro vtendum est. Butyrum phlegmonas concoquit ac digerit, in iis quæ molli aut certè non ita dura carnē præditi sunt. Et ad parotidas, bubones & oris phlegmonas, aliàque innumera omninò satis est dentiētibus pueris & inde calentibus gingiuis atque tumentibus medetur. Lingitur per se in coquendis expuitionibus peripneumonicorum, pleuriticoꝝ, & iis omninò quæ in thoracem defluerunt. Vtus est, quo iam tempore fluxio restitit. Insectum croco nihilominus coquit, & inde pharmacum leniter repellit, & tempestiuum est incrementis. In more fuit veterū tubercula foris enata & contumaciā calido pane fouere, vel cera subinde calefacta, sic vt ne sit nimius is calor, sed facilè ea parte sustineatur, cera sit natura pinguis, panis recēs & ex optimo tritico comparatus, hac enim ratione tuberculum sepe discutitur, interdū concoquitur. Tussilago sub cineribus cocta celeriter maturat, idē oxalidis foliis vulgus doctum experiētia tribuit. *Triticum & inde farina et panis pepetica.* Triticum ore præmansum, salinaque hominis commolitum, rusticis corporibus cōuenit. Leniora sūt farina tritici per-

d purgata

# INSTIT. CHIRVRGIC.

purgata furfure, & inde panis, diffoluitur aqua, oleū vel butyrū additur, coquūtur omnia, vt fit cataplasma quod lenit inflammationes vulnery, & celeriter maturat. Eadē farina hædrelæo coquitur, coloratur croco, vbi calor aliquis superest, parum cocto pane ac recenti, quem vel hydrelæo, vel pauciore oleo insperferis, vtendum erit. In contumaci virio, nec ita calente, panis siccior, vberiore oleo molliri debet. Panis conditus sale efficacior est. Farina hordeacea per se inutilis est, verum quæ bene purgato grano extunditur, & castratur furfure eodem modo quo triticea, cōparari potest hydrelæo cocta, conspersa oleo mista butyro, infecta croco, sic enim pus faciet, & calidioribus phlegmonis cōferet, præsertim cocta hydrelæo. Tale fuit cataplasma veterum ὠμύλης vel ὠμύλυσιν ex farina hordei, quod prius tostum nō fuerit, quanquam etiam licentia quadam ad alia farinarum genera nomen transtulerunt, Archigenes hoc modo parotidas celeriter suppurabat assiduē calida conspergebat, & ὠμύλυσιν imponebat. Est & aia ὠμύλυσιν anti- quis vsurpata ex farina hordei, fœnugræci, seminis lini in sapa coctis ad glutinis corpus, adiectis interrim duobus vel tribus vitellis. Adeps suillus, phlegmonæ familiarissimus, deinde vitulinus, taurino & caprino in duris, frigidisq̃ue tumoribus vtendum est, leoninus & reliqui eiusmodi inutiles, gallina- ceus & hoc paulo acrior anserinus vsurpari potest. Pix & resina in feruenti phlegmone rosaceo, in frigidiore, veteri oleo sicyomo, vel simili colliquāda sunt. Pix arida qualis Coracina & Colophonia, vberiore oleo dissoluitur, pauciore quæ liquida est, mediocri:

Farina hor-  
deacea.

Ad parotidas  
Archigenis  
remedium.

Adipes.

Pix.

mediocri quę natura & ætate mollis, digitis cedit, lentoris est particeps, qualis olim Brytia & Lycia. Picatum ceratum dolorem lenit, & pus generat, *Picatum ce-  
ratum.* ideoq; inflāmati vlceribus conuenit. Resina uten- *Resina.* dū, terebinthina & lentiscina, cera languidior, resina acrior, confusę ad suppurandū valent. Elnantur prius si quid acrimonię conceperint, molliātur oleo vel butyro, cū exaruerint. Oesypum veteres *Oesypus.* in pēpticis censuerunt, similem vim habet atq; butyrū, digeritq; leniter. Lana sordida modica aqua maceratur, tertia pars vini dulcis affūditur, coquūtur omnia quod superfluit pingue maturādis carnibus cōtusis, colligit Hippocrates. E flore lilij succus exprimitur, suppurationes concoquit, & vuluas mollit, quod mel & syrion veteres appellarunt. *Syrion.  
Syrion.  
Decoctum  
caricarum.* Si rēo verò melligo ē coctis caricis, detergēdo emolliendq; idoneum est. Decoctū caricarum, lenissimum est, quod maximē coquit ac digerit. In aqua sextariis sex pinguiū caricarū librę quinque decoquendę, dum sextarij duo reliqui sint, magis maturabis; si inde pista farina triticea, adiecto oleo vel butyro, cataplasma finges, vbi verò digerendū magis ac refrigerandum hordeacea melior est. Atque omnino caricę pinguiore coquendo, acriore detergendo atque digerendo magis cōueniunt. Ficus recens digerit & lenit, sed non coquit. Cataplasma ē ficu recenti & hordeacea farina in dulci vino coctis lenit & discutit, ē carica pingui & triticea oleo iunctis, lenit, coquit discutit. Ex acri carica & pane deterget, incidit, digerit & contumacia maturat. *Ex althea  
& inde cata-  
plasma.* Eodem modo althę decocto & vuz passę partes fouebis, farinas aut panem incoques, cataplas-



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Crocus.*

*Melligo una  
passa.  
Efficaciora  
remedia.*

*Thus.*

*Cataplasma  
furunculosis &  
parotidas  
molliens &  
suppurans.*

mata compinges. & si vis, intinges croco. Crocus maturat, leni attritione confirmat partes, & poros contrahit. Pinguissimas passas exemptis nucleis per noctem aqua macerabis, post tridie coques ad melliginem. Id in sapa dulci factum magis concoquet & leniet, sed aqua potius utendum, si quid caloris reliquum est. Inueteratis & callosis tumoribus conueniunt, colla librariorum quæ sit e farina purissima viscum aucupatorium, styrax pinguis, ladanum, galbanum. Thus in corporibus temperatis molle album, pingue, dumque manditur, minime friabile. Rhodinum & myrtum in calidiori & dolenti phlegmone misceri possunt, ut pix, resina, viscum, colla & similia, ubi perucax malum, & platysmata diutius hærere necesse est. Miscentur quoque sterces suillum columbinum, caprillum, nitrum. Et iam notum mulierculis remedium, pueri sterces calidum, duris & inflammatis mammis aliisque partibus impositum. Sed cum aliis remediis uti liceat, iis sordibus abstinendum, quanquam certum experimento est breui tempore concoquere, & in foeditate excrementorum certa auxilia inuenta sunt. Furunculos & parotidas mollit ac suppurat cataplasma e ficibus, calce, iridis radice vel nitro atque omnino, si nitrum deficit, quod iam antea dictum est, sale torrefacto in mollioribus, fœce vini, vel aceti in durioribus utendum erit. Fæx sit recens, nam celeriter exolefcit. Vulgo etiam nota est medela e capis cineribus coctis. In pepticiis ponenda est confectio e cera & resina, quod *πρωτόκρητον* appellant. Ex ceræ semuncia resinæ frictæ ielsquencia, in olei modico liquatis. Alias ex æquis omnium partibus, aut una ceræ, resinæ duabus, Aliquando

Aliquando etiā cere ratio & resinæ conuertitur, vt minor sit resinæ quā cere modus. Hoc pepticis miscetur, vt Aniceto celebri medicamento veterū.

Tetrapharmaco primas tribuit mouendo puri non

*Tetraphar-  
macum.*

aspernabilis author Cornelius Celsus. Idē remediū à Græcis suppurādo vsurpatū. Constat pice, resina, cera, & adipē, vsus tēpore, oleo vel butyro subigatur. Pix sit mollior, resina fricta, vel Colophonia, quæ in teneris corporibus oleo molliari potest, cera pinguis, adeps in mollioribus naturis, vel suill<sup>9</sup>, vel vitulinus, in durioribus, taurinus vel hircinus. E sic ciorē materia cōparatum mollioribus corporibus

sarcoticum est hoc tētrapharmacō Paulus basilicon, quo nomīne à Græcis ferē omnibus inscriptū est. Scribonius emplastrum Aristi nigrum appellauit, & aliud basilicō descripsit. Tetrapharmacō thus

*Macedonicū.*

additum facit Macedonicū, quod & pepticō est. Basilicon minū recentiorum hoc imbecillius, cōmutatō adipe in oleum, quantō adeps oleo efficior est, sic oleum quoque variē commutare licet.

Oleo rhodino, myrtino, vel simili tētrapharmacū durius molliatur, vt corpus & affectus natura exigit. Mirabilē hoc ad molliendū ac suppurandū.

*℞.* cere, terebinthinę, medullę cerui, adipis vituli, anserini, bubuli, butyri recētis, mellis optimi, olei rosarum, myrrh. an.  $\mathfrak{z}$  1. Myrrha cum mellē subigitur, & prunis leniter incoquitur, ex quo reliqua adiecta sedulo miscentur. Al. *℞.* picis  $\mathfrak{z}$  1. cere  $\mathfrak{z}$  3. axugię veteris purgatę  $\mathfrak{z}$  6. adipis taurini, & typi ana  $\mathfrak{z}$  3. resinę pinę vel magis picę  $\mathfrak{z}$  5. liquatis omnibus

*Mirabile ad  
suppurandum  
& molliendum.*

vtitor. Al. *℞.* resinę  $\mathfrak{z}$  12. cere, & ruginis rase an.  $\mathfrak{z}$  8. sepi vitulini  $\mathfrak{z}$  2. aceti, mannę ana  $\mathfrak{z}$  1. & Manna

*Vide An-  
dromachi.*

d  $\mathfrak{z}$  arugo

# INSTIT. CHIRURGIC.

æugo cum aceto liquatur, & conteruntur, reliqua  
dissoluta cōmiscetur, molliit, coquit, purgat, digerit  
*Alia γύρεως* parotidas emolliens, & in pus eliquans.  
℥ farina pistrinalis, quæ è molis & pistrino circū-  
uolitās parietibus & tabulatis heret, guttæ ammo-  
niac. an. ℥. i. resinae pini, ceræ, adipis porcini an. li-  
bras duas, succi feminis lini quātum sufficit, liqua-  
tur adeps; cera additur & resina, farina cōiungitur,  
ammoniacum solutū vino vel aceto, & lini succus  
translatis aliis in mortarium concorporantur. Fer-  
mento, & eo quod *Alia ξύων* inde medici appellāt,  
in contumacibus vitiis veteresvsi sunt, de quo mul-  
ta ex Democrito, Mesue, Paulus septimo, & Gale-  
nus tertio de compositione medicamentorum *℥*  
*τεσσ.* ℥. cœparum & alliorum coctorum in cinere  
ana ℥. i. vitellorum numerum quinarium, radi-  
cis lapathi coctæ libr. dimidium, farinae fœnugræci  
vncias 3. fermenti 3. 2. axungia ℥. i. fiat corpus, in  
frigidis & cassis humoribus cōuenit. Utantur quo-  
que diachylo paruo & aliis quæ molliunt. Atque  
omniñò malactica refrigerante oleo, astringente  
pharmaco, viscida & offarciēte materia leniter tē-  
perata, suppurare possunt. Tale est malagma Damo-  
cratis, quod eadem potest quæ diachylon capite de  
malacticis descriptum, ac præterea cruda, quæque  
coqui, mutarique nequeunt, edomat, musculorū,  
& membranarum vulnera per sanat, punctis  
medetur, arthriticis dolorem attemperat, & om-  
niñò anodynōn est. ℥ picis quān siccissimæ, ce-  
ræ, puræ, terebinthinæ, mannæ ana libr. 2. thuris  
probi libram vnā butyri pinguis ac recentis feli-  
bram, vel 3. 5. Liquabilia funduntur largo igne  
& assiduo,

Malagma  
Damoeratis.

& affiduo, dum non inquinent, versantur rude, hic cacabus prunis subducitur, manna trita inspergitur, circumagentur omnia assurculo, postremò voluuntur manibus, & ponuntur. In usu, copioso & recenti rosaceo pharmacum diluitur, vt caua carne impleat, inflammationes tendonum abigat, & in pus album cruda & rebellia tubercula conuertat. In vlceribus difficillimis, quæ pus non reddūt, mirum quàm efficaciter concoquat. Coloris ambigui quod sequitur. Lithargyri vnciæ tres, olei ricinini vnciæ quatuor, coquuntur vna dum nō inquinent, deinde miscetur squamæ æris nigri, æruginis, chalcitidis, ana scrupuli quatuor, sed hæc metallica diutius fuisse trita conuenit ex aceti accertimi vnciis duabus. Vfus tempore diluitur ricinino, & in con-

Vrendi for-  
mula

cerpto linteo inferitur cauo. Atque hæc in presentia sufficiat. Locus oleo dulci, peptico succo, aqua moderatè calida, hydrelæo, & aliis foveatur, sympepticon medicamentum inducatur, mollis stuppa vel lana succida superponatur, omnia decussata fascia colligentur, vt qua parte diuisa fascia est, conus abscessus aduertat, nec affectum locum opprimas. semel in die, vel rarius commutari debet, nisi vel dolor vrgeat, vel pharmacū exarescat. Ita verò formari sympeptica oportet, vt neque liquidiora diffuant, neque corpulenta nimis locū opprimāt, Iustum corpus est cerato malagmaton & mollium emplastrorum, ac quod antè dictum est, *ἐχνομα* & glutinosa esse melius est vt per se, sine vinculis hæreant, quanquam & emplasticis lanam succidā aut mollicula splenia superdari, & omnia colligari nihil prohibet, idque hyeme magis & frigore.



IACOBI HOLLERII

STEMPANI, MEDICI PA-

RISIENSIS, CELEBERRIMI

de Materia Chirurgica

LIBER. II.

De aperienda vomica. CAP. I.

*Argumentū  
I. & 2. lib.*



VO & quali genere remediorum humor repellatur, quæ medicamenta trahant & discutiant, molliant, maturant. & pus efficiant, superiore libro, quantum arbitror, satis explicatum est. Ac iam subiiciendum nobis, qua ratione vomica exugi pharmacis aperiiri ferro, igne etiam rescindi possit. Tum exponenda materia, quæ sordida repurget, pura impleat, plena deniq; cicatrice claudat. Et quia ad hoc institutum nostrum pertinet, de glutinatis auxiliis eodem nobis compendio differendum erit.

*Noxa à non  
aperta sup-  
puratione.*

Atque ut hinc initium capiat oratio, quæ suppuratio sponte sua non rupitur, ferro, igne, vel medicamentis aperienda est. Alioqui serpit sanies, & cuniculos agit, venas, arterias, nervos & vicina corpora depascitur, hinc etiam atteruntur ossa, & cariem ducunt, liuescit cutis, & in rugas quasi senio marcescens contrahitur, idque metuendum magis in digitis, articulis, partibus corporis, quæ in declive patent. Sic enim parotides, femorum abscessus in fistulas ca-

tantur

uantur, & quæ faciliè putrescunt, qualis anus est, extremæ partes, & loci genitales. Cumque ambigat materiæ cursus, quæ videlicet foras introque conuer-  
ti possit, prouidendum medico ut in superficiem detriuet multò magis si viscerum aliquod in propinquo est, si intus disperso puri nulla via sit, qua excernatur. Alioqui vitam celeriter eripit, aut compressum intus putrefaciet partes quibus infidebit. Quo fit ut in vomicis, quas illa collegerunt, ea curandi ratio quæ tentatur ferro, veteri medicinæ probata sit. Atque decliuem partem, qua ile est, iuxta inguina secari iussit. neque à peritonæo membrana metuit, ut quæ nullo ferè periculo incidatur, & faciliè coalescat. Nec aliter in vulneribus capitis, ubi contusum aliquid, fissum, fractum, modo serra, modò terebræ caluariæ partes ad diploën vocatam & meningem excindimus. Quare etiam si tumor nondum satis maturuit, ea pericula ferro anteuertenda sunt multò magis si virulenta materia vomica includitur ut pestilente carbunculo & bubone. lue venerea, & aliis generis eiusdem. Cruda autem tubercula metu fistulæ secat Hippocrates. Quanquam animaduertendum, ut ne nimis citò nunquam enim vis naturæ gratis inferenda est, sed semper aliqui beneficii, nihil maleficii proponi debet. In vomica quæ tardiùs erupit, & subiecto osse metus est, atque ideo in contusionibus capitis & angustis vulneribus, pericranium in crucem interfecamus, aut ampliori plaga diuidimus. Sed iam aperta vomica, membranae, nervacea corpora & alia semiputria occurrunt, quæ nec intempestiuè rescindenda sunt, molliter priùs vellicare oportet, at si nec sequuntur, celerius illiqua-

Foras euocanda suppuratio

In vomica  
venit ferro  
tentata  
curatio.

Peritonæum.

Vbi ossa in  
propinquo  
sunt vomica-  
rum.

Cautio in  
membris  
excindendis  
& nervaceis  
corporibus  
vomicarum.

## INSTIT. CHIRVRGIC.

re conuenit, vt vel sponte sua excidât, vel nulla vi & leni tractu reuellantur. Atq; omninò sua est putredini maturitas, eaq; expectanda est. Alioqui nona inflammationis & conuulsionis pericula creari solent. Itaque semiputria illa molliter cômouenda sunt, matura enim facillè concedunt, cruda restitât

*Suppuratio non necessaria aperienda ferro.*

dolentq; si vi maiore pertrahâtur. Iam verò perpetuum non est aperire ferro, quod suppuratû est, sed si nullum in mora periculum apparet, diaphoreticon remediû imponendum, quo loco mollior abscessus est, & digito cedit. Sic enim sanies exugipote est, idq; faciendû magis quum alta parte vomicæ non decliui, suppuratio se colligit. Atque antea pharmaca notata sunt quæ pus exhauriant, &

*Pituita puri similis.*

postea describentur. Neque ignorandum est locis aliquot interdum materiâ subesse, quæ sit puri similis, qualis in atheromate, steatomate, meliceride, aliena quædam pituitæ genera, nonnunquâ quoq; ad ossa colligitur, eaq; discutienda, aut facto vulnere expurganda est. Est cum spiritus flatuosus speciem puris referat, atque aperiētē ferro medicû eludat, nullo pure, sed solo spiritu exeunte. Quod si

*Animaduertenda in vsu ferri et ignis.*

ferro vel igne semel vtendum est, prius animaduertere oportet, ne quod vas insigne, nervus, tēdo, vinculum, ne quid neruosum (quales membranæ quædam sunt, aut potius lati tendines) conuulnerentur. In masculis fibrarû interstitia cultello ligneo, vel digito diducenda, ne cum fibris nerui, aut vasa præciantur, idq; magis, quum in profundo sanies resedit. Parcendum quibusdam partibus quæ vegetiùs sentiunt & à quibus vis ignis ad principia celerius trāsilit. Cauteria & ferra menta periculosa occipitiô

occipitio, temporibus, & vbicunque caluaria mollior est, vbicunque vel exitus neruorum, vel aditus <sup>In oculis.</sup> vasorū est, nec ea ipsa citra periculum oculus sustinet. Ac in palpebra quidē transuersum ferrum ducitur. In oculo ne qua vulnere ur vena prouidendū, ne pupilla cōtingatur, vt inde humor profluat, & cicatrix relinquatur, quæ visum intercipiat. Ex <sup>In temporibus.</sup> quo in eam partem, qua extima membrana albicat, <sup>In capite.</sup> scalpellum, acus, & alia id genus ducere solēne est. A vulneratis tēporibus, & eo loco qui paulō superior est, quāque perreptāt venę, nerui, arteriæ, hæmorrhagia cōmouetur, & aduersæ partes ferē conuelluntur. In capitis vulneribus animaduertendū, <sup>In caluaria</sup> quā altē vitū descenderit, <sup>fracta.</sup> Pericranium cōtusum discinditur, vt fiat exitus puri, in eodē plaga angustior inciditur, dum satis pateat. Quod si cranij fractura accesserit, curandū sedulō, vt celeriter suppu-  
ret, quod ante vulnus est, vt purū sit & aridum, ex quo agnoscēda fracturæ magnitudo, quæ si superficialis est, rasorio scalpro atteri & cephalicis curari debet. Si ad diploen procedit, modō terebra, modō ferra superior pars ossis eximenda est, sed ita, vt ne vitrā quā oportet ferramentū prodeat. Cranio verō vsque ad membranā fracto, omninō excindēdum os est, verūm sæpius reuocato ferro, & frigida merso. Etenim iugiter attritū, incalescit motu, & os elimatū fera vna conferuescit. Ac video placuisse multis aliquid ossis relinqui, nec totū semelexcindi, quōdque reliquū sit, pharmaco siccare. Sic enim alimēti inopia exarescit, vt vel spōte sua excidat, vel leniter motū itatim sequatur. Deinde ea ratione periculū declinatur, quod accadat, si altius permeare ferro



## INSTIT. CHIRVRGIC.

ferro membrana vulneretur. Atque omninò in cranij fracturis, vbi ferra, modiolis, cycliscis, terebellis via puri fit, crassiori parti ossis ferramenti acies configi debet, & à futuris, fissuris, neruorum radicibus & vasorum cuniculis, postremò quoque molliore osse, duriore fracto, & tēporibus declinanda vis est. In strumis & colli abscessibus à carotide arteria, vena sphagitide, vocali neruo abstinēdum, illinc hæmorrhagia, quam ægrè supprimas, hinc vel omninò mutus, vel certè semimutus homo relinquitur. Ex quo (opinor) ceruici omninò parcere quidam è veteribus maluerunt. Adde quòd in totum collum neruorum propagines à spina disperguntur, quas nò nisi periculose vulneras. Exteriore parte humeri tendo est, qui ignem ferrumq; non sustinet. In empyicis & deploratis pleuritidis scalpru & cauteriu inferiore parte mesopleurij collocamus, quia videlicet superiore vena, arteria neruus est. Hippocrates, quā parte exauditur materię strepitus. Alij scabriorem cutem & prius coloratam ad sectionē annotant. Nonnulli vbi minus carnis est. Paulus inter quartam & tertiam costam, inter quintam & sextam Leonides multi inter quartam & quintā aperiunt, metu diaphragmatis. Sed alius thorax breuior, aliis longior est. Sunt qui internam membranam commouērent, vt pus effluat. Alij ne attingendū putant, quia sic effluxione spiritus ægri intereant, aut insanabiles fistulas attrahant, vtrique se confirmat authore Hippocrate. Per sterna, nerui, vasaque decurrunt, ideoque in vomicis quæ illic coeant, ad latera chirurgia vertenda est. In collectionibus ventris, quæ inter peritonæum & intestina latent, siue

ex

*In collo.*

*In humero.  
In thorace.*

*In ventre.*

ex iecore, siue ex alia parte diffusæ sint, Erasistrato  
 primùm, deinde aliis medicis placuit detrahi pus se-  
 ctis inguinum locis, vbi videlicet ilia terminantur,  
 incisa etiam peritonæi membrana, vt quæ sine pe-  
 riculo diuidatur, & faciliè cicatricem claudat. Idq;  
 confirmât, quod in hydropum paracentesi & chi-  
 rurgia ramicis intestinalis nullo ægri periculo ea sa-  
 nescat. Sed hoc tentandum magis vbi desperamus,  
 vt ne naturæ possit intrò pus effusum, vel per vri-  
 nas, vel per intestina transmittere, id quod integris  
 viribus naturæ aliquâdo quasi miraculo cōtingere  
 certum est. Hydropicos temerè incidi corrupto he-  
 pate rectè scripsit Erasistratus. Et in colo suppurâ-  
 tia tubercula, eodem modo supra inguina aperta  
 via perpurgantur. In extremis ilibus, quæ in lumen *In ilibus.*  
 vertunt & aqualicum, multi sunt tendines, multa  
 vasa coeant, ex quo hac parte manus sedulò tem-  
 peranda est. Videndumque ne vel laxetur vel dis-  
 rumpatur is meatus qui à peritonæo ad testiculos  
 procedit, vnde hernia moueatur. Inuritur carnosus  
 podex, & ferrum sustinet, non ita quod illic nerua-  
 ceum est. Eadem ratio in genitalibus seruari debet *Genitalia.*  
 vbi ab arteriis cauendum quæ illic plurimæ coeunt,  
 hiantque maioribus clausulis, nam inde hæmorrha-  
 giæ non ita faciliè supprimuntur. Sub natibus ner- *Sub natibus.*  
 uus est, qui si iuxta suppurationem præciditur, aut *Cautio ne*  
 nudatus violatur frigore, subiectum crus stupi- *nudi nerui*  
 dum relinquit. Idem animaduertendum in vomi- *refrigerentur.*  
 cis reliquarum partium, ne nudi maneant nerui, &  
 frigore contrahantur. Hic enim stupor & conuul-  
 sio fieri consuevit. In perinæi tumoribus qui *In perinæo.*  
 inciduntur, & calculis summopere cauendum, ne  
 quid

## INSTIT. CHIRVRGIC.

quid intus vulneres, quod postea ægerrimè glutinetur, quæque summo pudore & molestia excrementa diffluent. Itaque vbi fistula medium cuniculum agit inter intestinam & cervicem vesicæ, fistulam medicamenti quidem exedit ferro attingi vertat Hippocrates. Sed fit aliquando non modò hac parte, sed aliis, vt neque medicamenta iniicias, quæ profundior & obliquior fistula est, neque ferro diuidas, quia altius descēdit, quia obiter incurrūt vasa magna & nerui, qui certè casus desperationis etiam putandus est. Ac breuiter vbi maior pars est, quæ auferri postulat, & ad partes veniendum, quæ non nisi certo periculò violentur, abstinendum ferro est. In quibus autem aperire licet, magnà sectio vitari debet, quia inde cicatrix turpior, pars imbecillior, & ad motū ineptior relinquitur. In bubonibus venæ sunt & nerui, quæ glandibus innituntur, ideòque si quando inurendi loci consilium est, apprehendenda cutis, & à glandibus separanda prius est. Sectio verò oblòga angusta transuersum ducēda est. In vulneribus quæ ferro fiunt, quacūq; parte eiusdem generis glandulæ sunt, eadem ratio seruari debet. In articulis perpetuò suspectus ferri & cauteriorum vsus est, quibus necessario vtendū sit, ea parte quidem imprimetur vis, quæ magis carnosissima est, quæque nervos articulis, & tendines longiùs relinquit. Ex quo ischiadicis inferiori parte quàm malum est, ignem adhibemus. In genu, lato illi tendini parcendum est. Is ex duobus maximis musculis femoris obaeruatus patellam capit, alligatq; vicinis ossib⁹, qui si vel ferro, vel igne violetur, efficit vt neque sursum trabatur membrum, neque extendatur

*In bubonibus.*

*In glandulis.*

*In articulis.*

*In ischio.*

*In genu.*

*Latus tendo  
genu.*

datur, & graua conuulsionis pericula creare solet. *In carpis.*  
 In carpis multiplices tendines, quasi annulo colligantur, atque hinc tota ferè extrema manus neruacea est, eaque interiore parte lato tendine contegitur. extremis digitis, quaq; radices vnguium posite sunt. acriter sentit, ideoq; hac tota parte admodum suspecta tum ferramenta, tum cauteria sunt, in toto extremo pede eadem ratio seruari debet. *In extremis membris.* Quo fit, vt *Clauis.*  
 in clauis, hoc est, tuberculis duris, clauorum capiti similibus, qui ferè summis digitis manuum, calcaneis pedum & plantis enascuntur, aliis potius vtendum auxiliis, quam ferro vel igni vereres existimarent. In his omnibus anatomica disciplina opus est, in qua quicunque fuerit exercitatus, ea omnia pericula facile declinet. Còtra verò sæpenuerò aberret, necesse est. Rursus aliud è situ consiliu capere oportet. *E situ.* Quædã enim vomicæ in superficiem emittunt, quæ ferè sine periculo inciduntur, vitatis scilicet neruis, maioribus venis & arteriis, quædam in alto latent, vt pulmone, renibus, cauis hepatis, œsophago, interiore diaphragmate, ventre, intestino, *In profundis vomitis.* nisi qua parte in anum definit, posterioribus partibus vesicæ, & vteri, altiore cerebro. In his itaq; suppuracionibus nullus ferro locus est, neque tractantur cauterio, nisi hoc aduersæ parti, quæ foris est, quæque familiaritate aliqua còsentit, imprimatur. Tantum hoc vnum reliquu est, vt modicè acribusmodò in potu datis, modò linctis, aliàs infusis disrumpantur. *Tussilago.* Quale hoc est, tussilago mediocriter *In his quæ ex alto se proferunt.* acris est, quæ citra molestiã thoracis collectiones rûpere credita est. At vero in internis suppurationibus quædã foras se proferunt, quales sunt in gibus

# INSTIT. CHIRVRG.

*In quibus a  
vicinis me-  
us est.*

his, iecoris, lienis, ventris, vesicæ collo, & parte sub  
pubem eminente, peritonæo colo, vtero. Sed quæ  
in vtero & vesica suppurationes coierunt, sanescunt  
ægrius, aliæ facilius percurantur. Sunt præter hæc  
genera tum abscessus, tum tubercula quæ non ita  
latent, sed ad quæ via angustior periculum aliquod  
denuntiet, ne quum ad partem ægram cauterium  
dirigitur, violet obiter quod sanum est. qualia sunt  
in ore profundius naribus, intestino recto. & eo si-  
nu, qui pudoris est. Quæ in re vel futilis fistula mo-  
re veterum, vel calamus scriptorius habendus est aut  
inanis canaliculus, per quem cauterium ad vomica-  
m & partem ægram transfuehatur. At si quid in  
profundo rescindendum ferro, lentè quidem & per-  
petuo oculo ducenti culter dirigendus est. Id quod  
in strumis, cancerum radicibus, varicibus, & vbi  
pus altius desedit, facere oportet. Primum ergo cu-  
tis in crucem secanda est, nudanda caro, si quid va-  
forum aut nerui cultro occurrit, id ipsum digito, li-  
gneo vel osseo veruculo superandum, distinctis fi-  
bris, nec ita momentaneis membranis, quibus illa  
inter se coniugantur. Idque sedulo faciendum, do-  
nec secando ad eum locum perueneris, in quo vel  
collapsus latet, vel cõditum est, quod eximi debet.  
Atque dum hæc fiunt, præsto adesse oportet medi-  
camenta, linamenta, fascias, reliquaq; omnia, quæ-  
cunque ad hæmorrhagias facere videantur, vt si nec  
opinanti sanguis è vena vel arteria profluxerit, ha-  
beas ad manum quod in præsentia opiuletur. Ita-  
que quo iam tempore omnia tuta sunt, & locus  
æger nudatus est, opportunè parti gladiolum infi-  
ges, & vomica repurgabis, aut peramputabis quod  
eximi

*Vbi in pro-  
fundo rescin-  
dendum ali-  
quid.*

*Cautio.*

eximi oportet. Videndum quoque in configendis vomicis, ut quātum oporteat culter descēdat, profundius vulnus hæmorrhagias commouet, superficialē sæpenuerò frustra est. Eodem modo cauteria in superficiem transcurrunt, leniter insidēt, aut altius imprimuntur. Et hæc quidē in molliori corpore, molliora qualia ē subere, spongia, & quibusdam radicibus configi possunt. In metallicis, aureum æneo & ferro clementius est. Sed de his alio loco pluribus. Rectum verò an transuersum, vel obliquum vulnus esse debeat, figura partium, flexus, rugæ, fibræ primum quidem indicant, deinde consilium iuuāt subiecta vasa & corpora. In collo quæ parte eunt vena, arteria & neruus, rectum transuerso præferunt. In fronte palpebris & vbicunque transuerso ducuntur rugæ, transuerso quoque feramentum duci maluerunt, ne contractis rugis vulnera replicentur. Quibusdam tamē in fronte recta vulnera placuerunt magis, vbi nec ita profunda, nec punctim infligenda sunt ne quæ à perioestio membrana subest, conuulneretur. In inguinibus ē flexu transuerso ducitur duplex, interim angustum & oblongum in myrti folium. In ventre nisi prohibeat flexus & rugæ, ut sunt fibræ musculorum, eodem modo in reliquis, eaq; parte infligenda placita est, cui in motu & corporis flexu, externa corpora minus occurrant, interiore brachio & crure potius, quàm exteriore, & longius ab articulis. Simplex vulnus aliquando sufficit, declinui parte, duplici aliquando & trigono opus est, cuius vertex altior, basis inferior describatur. Eadē ratione in lunnatis vulneribus, sursum cornua existant, deorsum

*Profunditas  
vulneris.*

*Cauterizantium  
materia.*

*Figura  
vuln-  
neris.*

*In collo.*

*In fronte &  
rugosis par-  
tibus.*

*In bulonibus.  
Cui parti in-  
fligitur fer-  
rum.*

*Simplex an  
multiplex  
vulnus.*

# INSTIT. CHIRURGIC.

alveus abducatur. Atque omnino scalpellus ea parte configatur quæ mollior est, quæ digitis succumbit, ubi fastigium erigit, qua denique sanies commodius expurgetur. *ὑπόρρουσι* appellant *ἀπόρρουσι* & exanitionem, vel (ut alij) exaniationem, in qua *ἐπιδιάρρσις* est, & *ἐκτελσις*, *ἀντιδιάρρσις* & *καταρρσις*. Nam ubi proclinata parte foramen est, facile purgatur sordes, ubi verò in subltmi. ea restare solet, deorsum subfidet, tandemque sinuat. si quidem vomicoſa pars nequeat pro arbitrio commutari. Quale est in trunco corporis, ac ferè capite & parotidibus. In manu & crure etiamſi os vlceris altius positum est, poterit tamen ita inclinari, ut sanies liberè excurrat, tùmque manus quidè è mitella suspendi debet, ut carpus gibbero sit altior. Crus autè pulvino innitatur, sublatogenu, & declivi in coxâ femore, in brachio & tibia nō ita libera est cōversio, vtrumque membrū ea ratione collocandum, in qua diutius sine dolore permaneat. At si cui parti id denegatum est, nec ea potest pro libidine conuerti, aduersæ parti & declivi vulnus inferendum, quod *καταρρσις* vel *ἀντιδιάρρσις* appellant. In aliis quoque manu & crure quæ commodè inuerti possunt, quū sinus longior, cuniculosum vlcus, sordes vberior, etiā aduersæ parti lanceolā immittitur, ut duplici exitu dato, vitium celerius expurgetur. Adde quod ea ratione liquida medicamenta, quibus in id genus vlceribus ferè opus est, facilius infunduntur. Et quum ab ore vlceris ad fundū ducto gladiolo tota cauitas detegitur, ut in fistulis, & ubi suppressis arteriis gangræna metuitur, ubi denique nulla alia via sanies satis expurgatur. Nōnunquam

Duplex exitus puri.

nunquam angustius orificium ferro ampliatur, aut quod amplum quidem, sed rotundum aucto vulnere in longum, aut aliter deformatur, Sed hoc nō tā purgando, quā glutinando fit. Quibusdam locis plurimæ cōcurrunt arteriæ, plurima vitalis spiritus materia est, hīc paruo vulnere contentus eris, ne confertim semelque erumpente sanie, simul magna vis spiritus diffuat, vnde animi deliquia, & nec opinatæ mortes consequantur. Est cum adpressa manu fundo vlceris, & ita ad orificium adducta, interior sordes excluditur. Fasciis quoq; alligatis, astrictis, id efficitur. Aliquando in latera materiæ cursus deflectitur nouo factō vlcere, vt inde pars nobilior, in quam vitium decurrat, liberetur. Quibusdam ē vomica superiore per angustias quasdam sanies deorsum illabitur, & nouam vomicam gignit, qua aperta superior facilius percuratur. Vitiōso dente, & inde gingiua purulēta, tumor sub mēto colligitur, contusa atq; inde saniosa maxilla superiore, labrum superius interiore parte purulentū euadit. Hæc atque alia id genus medico obseruanda sunt, ne prius inferiorem sinum claudat, quā superior fuerit percuratus. Ac temporis ratio quædam est, in quo vomicę recludātur. In quibus morbis nullis dies vrget, tutius est vere, deinde autumno & æstate, aut certē calore factō nondum ortis frigoribus. Atque hæc temporis ratio multō magis seruari debet, quo magis necessaria pars est quę tractatur, & maiori periculo subiecta est, maiorque plaga facienda est. Eodem modo matutino magis & proclinato sole, quā meridie, quā feruente cœlo, quā denique, nimiū progressa nocte. Et

*Quo tempore  
aperiende  
vomicæ.*



## INSTIT. CHIRURGIC.

*Medicamen-  
ta quæ aperiunt.*

*Frigida cauteria.*

*Quæ aperiunt.*

*Quibus excipienda quæ aperiunt.*

*Mistum vel medium.*

hæc quidem de ferro & cauteriis in aperiendis vomitibus breuiter dicta sint. Reliquum est, ut eodem compendio de medicamentis, quæ aperiunt, dicamus, postremo addamus quæ sine ferro & vulnere pus exhauriant. Atque utroque genere, hoc etiam magis utendum est, quia mollior æger est, quam qui vel ferrum, vel cauterium sustineat, quia eo loco sanies confedit, è quo, etiam si aperias, non facile effluat. Et medicamenta quæ aperiunt, cauteria quædam sunt, naturam certe caustica, ideoque à quibusdā veterum cauteria frigida vocata à recentioribus potentialia. Cauteria quidem, quod reuera vrant, frigida ut ad ferrum, & similia, quæ rutilent igne, comparata. Neque tamen sic vrunt, ut quæ caustica & septica postea describentur, nisi quædam fortasse, quæ diutius insistant. Theriaca igitur vomicas aperit, urtica semen è vino tritum frangit, purgat, incarnat, cicatrice tegit. Caulium radices vltæ, tritæ & veteri axungia capte. Eodem modo radices cænæ, ostreorum testæ crematæ adeps ranarum viridium, quæ versantur in arboribus, lac ficulneum, tithymallorum succus, pulvis è capitibus muscarum & lacertarum, pulvis cantharidum, erinaceorum corium cum pinnis vstum, batrachium, caninum sterces album, muscerda, arida vini fæx & aceti, magis etiam quæ cremata fuerit, calx viua in sapone, vocatum sublimatum in axungia, trita illa visco quercino, terebinthina, larigna, abietina, sapone, butyro, œsypo, mel ligine anacardina, hermodactylorum succo, excipi debet. Ac plura capite de pyroticis. Sed hæc ita insistere oportet, ut aperiant, nec crustam ducant, aut si sic, ea molliter detrahenda est. Mistum remedium est,

est, fæcis crematæ vini vel aceti ꝑ. 2. fimi colūbini, propoleos satis torrefacti, æruginis ana ꝑ. 3. aquæ marinæ, vel in qua subduplum sal illiquauerit. ꝑ. 1. olei antiqui, vel feruefacti ꝑ. 2. ærugo cum sale & fæce trita, aquæ & oleo commiscetur, coquuntur ea fictili causâ, puro carbone, dum tota exhalet aqua, ex quo propolis mollita prius imponitur, auferuntur igne, ubi paululum refrixerint, columbi fimus inspergitur, pusilla plagula & oblonga efformatur, eaque medicamento inducitur, & conuenienter adaptatur, tum amplius splenium superdatur, quod leniente simul & coquente pharmaco illitum esse oporteat. Al. ꝑ. fimi columbini, nitri ana. ꝑ. 4. caric. 7. quibus arida trita commisceto, ac bene pista inducito, vt prius. Quod si durius videbitur, purgata axungia & melle temperato. Arrhenico, sandaracha, puluere angelico vel mercurio vocato & sublimato prudenter vtendum est, vt habeatur ratio corporum & vomicarum. Nec enim placuit vereribus Medicis (quod iâ consuetudine inualuit) grauius cruciari ægros. Nec in his solum, sed in iis etiam, quæ tantum pus exorbeant, non aperiât, ita cauisse ægris certum est. Veriti ergo illi ne quæ discuteret acrius, dolorem vna commouerent, bis in die detrahi medicamenta voluerunt, bis fomentis vti, quæ dolorem remitteret. Ac iam discussa saniei parte. semel tollere remediū, semel fouere tantum permiserunt. Postremò non reuelli, sed contineri, dum tota materia exhausta esset, vtile iudicarunt. Neque prius hoc vtendū genere remediorū, quàm æstus vomicæ & phlegmonæ quieuerint. In vsu, superponitur folium vel malagma, quod leniat, aut

*Non cruciandi ægri.*

*Clementior curatio rectorum.*

## INSTIT. CHIRVRGIC.

*Desperata  
romica.*

*Quæ saniem  
exugunt.*

splenium delibutum pharmaco, quod dolorē prohibeat. Quantum vulnus esse velis, tantum splenium aut plagulam constituas, quod pharmacum vulnerarium excipiat. A maiore vena, arteria, nervo abstinendum. neque diutiùs relinquendum loco medicamentum. Laxanda priùs cutis est, & tenuitas partium comparanda pharmaco. Sic enim cruciabit minùs, & celerius efficiet. Ac rursus factò vulnere solatium parti afferendum, fouendùmq; remediis, quæ temperent. Quòd si adhibito pharmaco vulnus sit, neque doloris sensus commouetur, iam syderatæ & emortuæ partis indicium est. Neq; iâ aliud reliquum est, quàm vt vel depascaris igne, vel excisorio scalpro peramptures. In aliis austerior nostrorù hominum, quàm veterum medicorum, cura est, dum alligatis causticis crudeliùs excruciat ægros, sed fortasse dicât, quod olim Epicurus, doloris grauis solatium esse, cum is brevis est. In alio genere remediorù quæ saniem exugunt, sapo est illitus, tum per se, tum in discutiente oleo solutus. Quod sequitur, peculiariter conuenit abscessibus genuum & articulorum, exprimit enim pus, nec incidit. Idem etiam glutinat. ℞. cremētī plūbi ℥. i. teritur, & in sesquilibra olei veteris coquitur ad crassitudinem mellis, subductis igne, terebinthinæ ℥. i. commiscetur, coquuntur omnia placido igne, atque vniuntur. Al. ℞. litharg. cerusæ, salis ana ℥. 3. olei veteris ℥. 10. trita illa ex oleo coquuntur olla, & assiduè commouentur, cum non inquinant, in mortarium traducta contunduntur, & vsui sunt. Ex lythargyro, sale, terebinthina & oleo veteri, multa comparata reperias, quibus acris trita

trita resperguntur, ærugo, fæx, calx, vitrioli genera  
 squama lapis calaminaris, & similia. Facit hoc ad  
 strumas, parotidas, ganglia, mammarum abscessus,  
 elicitque laxata cute, quicquid parvis intus condi-  
 tum est. ℞. ceræ, nitri, terebinth. olei veteris an. ℥b.  
 i. aquæ, vel (vt Andromacus) lixiuij ficulnei ℥. 10.  
 liquatis aliis nitrum, vel aliquid tale inspergitur so-  
 lutum aqua vel lixiuio, miscentur omnia, circuma-  
 guntur assidue, nequid efferuescat. Plura iam antè,  
 vt capite de resoluentibus, & 6. de compositione  
 pharm. ℥. 1. 1. 1.

*De purgantibus medicamentis. CAP. 2.*

**S**equitur vt purges. Etenim omne vlcus sordi-  
 dum sedulo purgandum est. Quod si dehiscit Ratio pur-  
gandi.  
 foras, neque fistulosum est, molli fomento vel lin-  
 teo tum sinum ipsum, tum labra vlceris perpurga-  
 bis, deinde medicamentis cauum implebis, dum  
 rubes, ac nimium, neque siccum, neque humidum  
 vlcus extiterit. Medicamenta in concerpto lina-  
 mento ferè imponuntur, quanquam aliquando  
 puluisculis cauum inspergitur, hocque præcipue,  
 quum humidius est. Contra verò arefcenti vitio,  
 dolenti & inflammato liquidiora conueniunt. In Consistentia  
medicamen-  
torum ratio-  
ne vlcerum.  
 media conditione satis corpulenta pharmaca inse-  
 runtur. Quod si non ita expositum vitium est, sed  
 intus latet, difficilis omnino cura est. Et si quidem  
 capite includitur, neque per aures, nares aut aliter  
 sordes effluit, modiolis, cyclisco, vel terebella pate-  
 facere viam oportet. In extremis naribus qua me- In capite.  
In naribus.  
 tus in os pertinet, specillo nucleo, vel fistulis medi-  
 camentum induci debet. Alioqui aperto ore per  
 palatum via ad vlcus querenda est. Nec alia serua-

## INSTIT. CHIRVRGIC.

*In ore.  
In thorace.*

tur ratio in oris vlceribus, quæ non ita patet. Ad thoracem vnica ferè via est ab ore per asperam arteriam, nisi vulneris orificium in superficiem veniat. Hic pyulcis, collyriis, suctu, suppuratio exorberi potest, iisdemque machinis vel melicratum, vel aliquid generis eiusdem inferri debet. Insufflantur pulueres per corniculum & arundinem, qui præfenti vitio cõueniant. Ad venrriculum & intestina

*In vëtre gula & primis intestinis.  
Crassius intestinum.*

prima per gulam aditus est, at quæ gulam purgent, lenta, tenaciq̃ue materia illigari cõuenit, vt obiter inhæreant. Intestinum crassius detergente materia in clysteribus expurgabis. In vesicam fistula argentea, qua calculi tentantur, pimum immittitur quæ vt locus patitur, amplius cauo pateat, in cauum clyster vesicarius introducit, exprimiturq̃ue, vt liquor per canalem fistulæ ad vesicâ vsque perfluat.

*Qualia esse debeant.*

Rectis enim fistulis iniectis, ferè refluit atque disperditur. Iam verò medicamenta purgantia (quæ καθαρτικά appellant) modicè tergeant & siccent, detergenda sordes, quæ corruptela corporis concrescit, & reliquiis alimenti colligitur. Exiccanda sanies, humidumq̃ue recrementum, quod statâ naturæ lege ab alimento partis reliquum fit, & aliunde illabitur. Πυσίλινα peculiariter appellant ἀφαιερτικά τῶ πύτῃ quibus vis detergendæ sordis data est. Hac parte vitanda sunt quæ adstringant, vnde sordes pertinacius inhærent, quæ laxent, vnde robur partium elanguescat, acria, quæ colluie sordium cauum impleant. Sale & eadem materia

*Quæ vitanda.*

ideo abstinendum, quia vt detergeat, adstringitta. mē, sordes impingit, & vellicat. Hæc autem ita audire necesse est, vt ad purgandi rationem omnia

*Sale & similibus quare abstinendum.*

referantur

referantur. Nam si serpit vlcus, si putredo est, quæ vicina, depascitur, si quid occalluit, si quid influit & phlegmone est, medicamentum ita comparandum vt ex iis quæ laxent, reprimant, mordeant, quæque detergeant, tā multis semel casibus medeatur. Sed omni nō in purgando vlcere, prima quidem ratio totius corporis haberi debet, quia vel incolume, vel plethoricon, vel caco-chymō est, deinde peculiaris natura partis requirenda est, quia humida ea, aut sicca, acri vel stupido sensu prædita est. Postremo animaduertendum nūquid alieni vitij vt calli, rheumatis, phlegmones, doloris, vitiosi succi, putredinis, aut aliquid generis eiusdē vlcerae parti aduenerit. Itaque vt ea sunt omnia & sordes vlceraum ita qualitas remediorū distingui debet. Adde quod vel recens, vel inueteratum malum est. Molli corpori, recenti malo, nimium neque sordido, neque humido, parti præterea sensus acrioris, leniora remedia conueniunt. multo magis si in vitiosis succis æger est. In contraria conditione, cōtrariis auxiliis locus est. Quod si pars aliqua tumoris maturuit, & pus reddit, alia verò etiamdum cruda est, huic quæ concoquant, purulenta quæ repurgent, imperabis. Eadem ratione si quid durius, malactica, si quid inflammatum, lenientia suis quæque locis accommodabis, alioqui pharmacum ē multis temperabis, quod iis omnibus querelis satis esse possit, qualia sunt Græcorum *πολογησα*. In purgando plurimum valet recta abluendi ratio, de qua breuiter nobis dicendū est. Vbi ergo molliore flocco tum sinum ipsum, tum labra exterseris, si præterea conuenienter abluas, magnopere cura

De ratione  
abluendi vl-  
ceris.

# INSTIT. CHIRVRG.

tionem abiuuabis, vt ad reliqua per se natura interdum sufficiat. Itaque si sanies acris est, sero, si copiosa sordes, melicrato, si multa simul & acris est, sero, in quo sacchari octuplum, vel tantundem mellis diffusum sit. Cumque cœperit cauum esse purius, œnomelite, post etiam vino è dulci austeriusculo vtendum erit. In fœtido sinu, putri & cruentato oxycratum conuenit. Acetum, oxymeli, œnomeli, dilutum marrubij, absynth. aloës, myrrh. pauculo conditum melle, putredines efficaciter iuuât & nomas cohibent. Nomæ sunt vlceræ quæ in ambitum partes arrodunt, depascuntur, ac præterea putrilaginosæ sunt. Eidem medetur malo marina aqua, vel in qua subduplum salem illiquaueris. Vrina quoque veteri exemplo, & quotidiano vsu ad eam rem laudata est. Rustico è neglecto vlcere digitus in pede computruerat, is Galeni cōsilio, conseripto linamento vlcus impleuit. conuenienter alligauit, & quoties incessit meiendi cupiditas, propria vrina perluit, atque ita persanatus est. Quod exemplum retineri potest in pudendis, & aliis partibus corporis. quas sine pudore perminxeris. Vrina sit non quæuis, sed cuique propria, nec hæc quidem cruda & aquosa, sed suo diluta sero, & iustabile colorata. Salsugo piscium eodem auctore cōmendatur. Sed hæc leniter adstringit, at putridum vlcus fæculenta sorde plerunque impingitur, videndumque ne adstrictione sordes illæ crassior magis inhæreat. Ex quo putridis adhibenda præcipiunt, quæ tergeant, discutiant, tenuent aliquando etiam quæ repellant, quæque adstringendo ficient, vbi tenuis est sanies, & fluxio infestat, fraxini folia

*Contra putredines.*

*Nomæ.*

*Vrina.*

*Historia.*

*Salsugo piscium.*

*Ad putrida.*

*Fraxinus.*

folia molliuscula coquuntur aqua, vnde cancrofa eluantur. Sic enim lenies, ficcabis, absterges & discuties. Lixiuum deterget, ficcet, tenuat, digerit. *Lixiuum.* Itaque in crassa sorde & putredine, magnus lixiuij vfus. Paretur è materia quæ detergeat, ficcet, incidat, discutiat, & si efferatur malum, ea etiam quæ acrimonia mordeat, quale faponarium. Saponem *Sapo.* veteres confecerunt ex feuo caprillo, hircino, veruecino, bubulo, & lixiuio cum calce, qui acriter relaxet, sordes expurget, detergeat, ficcet fimiliter nitro. E cinere fagino & feuo alij conficiunt. Quidam è calce, fale, oleo & feuo interim permixtis aromatibus. Ifque modò liquidior, modò solidior; comparari potest. Atque omninò inde lixiuium expurgandis sordibus putridorum vlcerum idoneum est. Eodem modo è tithymalis, dracontio *Materia lixiuiorum.* fioco, bryonia, batrachio, ostreorum & metallorum acrium cineribus. Vtuntur etiam capitello, quod capite de pyroticis describitur. Vrina ergò & iis lixiuio generibus vtendum erit in putridis, fluxis, humentibus, & malignis vlceribus, tum etiam œnometite, in quod cinerem calchathi, vel cremati vitrioli resperferis. In eundem vsum cinere caricarū liquida puluerantur, nec improbandum ligni sancti remedium. Alij œnostagma probant, quia fiecat & putredinem prohibet, magis etiam si tantillum, *œnostagma.* Mel. cremati mellis accefferit. Nam vbi in multo humore vlcus est, crematum mel, aut è meliteis vasis deterfum & aridum magis conuenit. Ac dum crematur, aloë, myrrha, centaurij puluis, inspergi potest, quoniam tempore summouetur igne. Idem suceo marrubij, plantaginis, absynthij, apij & similium aptè



# INSTIT. CHIRURGIC.

aptè perfunditur, sic enim cancras, gangrænas putredines, facile prohibet. Vulgus fenicula, bugla, cétaurio & plantagine, plurimum vitur in melle, vt cum hoc succus ex herbis pressus percoquatur. Ne-

*Vtendū vulgi  
remediis ad-  
hibita ratio-  
ne.*

que turpe est per vulgus & aniculas profecisse. Nō enim puduit maiores nostros in multis remediis brutorū discipulos sese profiteri, sed acceptis ē vulgō remediis adhibenda ratio & rectus vsus, in quo

*In nomis &  
malignis vl-  
ceribus qui-  
bus vsi sint  
veteres reme-  
dia.*

summa artis posita est. In nomis, phagedænis, Chironiis & omninō malignis vlceribus, veteres vsi sunt iis, quæ & detergeāt & adstringant, sed hæc rectè diluas, vt liquida infundātur. Aqua aluminosa, vel in qua malicoriū, myrrha, balauftia, cæteraque eiusmodi coxerint, id genus vlceribus accōmodanda sunt. Egyptiaca in liquidis dissoluuntur, aliæque id genus. Verūm matutino meliūs adhibētur, tum quæ constringant, tum quæ mordeant, quo iā tempore diffluit corpus, ne adstrictione excremēta cohibeantur, & acrimonia pertrahātur in vlcus. Præstabit quoque detergente materia prius expurgare, quā astringētia instituas. Lixiuum ē calce sepius elota terget & siccat, nec sine re laudatū est. In cal-

*In callosis.*

lofis, egrè cohærentibus, cuniculosis, nimium sordidis, ex cinere ficus, tithymali, aliisq; id genus lixiuiū fit, quo sinus quotidiē perfundātur. Aqua ē laringna, terebinthina, resinis ferè omnibus exillata, tergēdo idonea est, lixiuiū ex oliuæ nucleo, cancerosa tollit. Succo absynthij siccabis, exterges, astringes, & roborabis. Melicrati & eorū quæ mel, vel saccharum recipiunt, modus est, vt sit decupla, octupla, sexcupla aqua. Eo dilutiore vtendū erit, quo sinus purior, acriore, quo sordidior. In vlcere satis expo-

sito,

*Ad cancro-  
sa.*

*Absynthij suc-  
cus.*

*Melicratum  
& similia.*

*Quomodo vt-  
tendum ca-  
thartico.*

fito, linteolum prius pharmaco infuccandum, leuiter exprimendū, insinuandum cauo. In humidiores exactissimè triti puluisculi resperguntur. In sicciore, & quod sorde offarctum est, diuulsa linamenta, vel sine his pharinaca mollia imponuntur, ex quo bene carminato vellere os vlcis obstipandū est, deinde superdāda mollis spongia, vel complicata linteola, vel deniq; quod patria lingua & iam vulgari *Cotton* appellatur, vt inde tota vlcis regio cōprehendatur. Atque hęc omnia vino inculcabis, & expressa superpones, postremò artificiosè colligabis. Omnino tamen cauendum erit, ne quid durius, grauius, asperius, vlcis incumbat. In fistulis & altioribus lacunis, quod superdatur spleniū, in decussē vel crucē discinditur, vt sit qua sanies effluat, atq; ea parte diuidi melius est, qua os vlcis in decliui tangit. Poterit etiam linoxylon molle obduci splenio, qua parte diuisum est, ne sanies moleste diffluat. & subiecta corpora inquinet, sed cōbibeatur. Omnia cōmodè obliganda sunt, vel vt contineas, vel etiam vt reprimas. Accidit quando vt longior turunda extrema parte neruum aut dolentem particulam attingat, atque exasperet. Quare ea decurtanda est. & ima parte intingēda remedio, quod & lentum sit & leniat, reliqua verò eurgēte auxilio illini debet, quē si parum etiam videatur, quia non penetrat in alueum qua vlcus desinit, iniectis liquidis medicamētis sufficiens erit, quod deesse videatur. Postea verò quā tēpus redierit, in quo vincula soluantur, atq; reuellantur indita medicamēta, recognoscendum fideliter, quāta qualisque sordes prius fuerit, quanta, qualisque in præsencia sit.

Nam

## INSTIT. CHIRVRGIC.

Nam si iā minor & cocta appareat, bene est. Optime verò, si purum vlcus est, & iā aliquid laudande carnis succreuit. At si solito magis sordescit, & nihilominus crudum est, distinguendum hoc modo. Nam si cauitas maior, nouus calor, rubor & dolor, adfuerint, id acriori medicamento attribues. Temperabis ergo cerato rosaceo, si maior calor, si verò flaccidū vlcus & humidum, myrtilino. Quòd si nihil horum extiterit, non calor, rubor, dolor, sed tātum sordes vberior prouenerit, imbecillius est pharmacum, quod adiecto melle exacues. Sed aliunde humor interdum affluit, vt in rheumaticis vlceribus appellatis, nonnunquam in largiore cibo & potu peccatū est, quibus mederi prius necesse est, quàm vlcus purgari possit. In humore nimio siccantem pollinem coniperges, & mollibus pharmacis abstinabis. Aliquando verò nimium siccando, & cōtractum, & exuccum vlcus reperiēs, qua in re siccātia humido diluuntur. Inflammatio vlcere sēpē initio recurrit materia, vt tenuis quēdā sanies, lachrymæ similis, tantum effluat, vnde *δακρυώδες* vlcus appellatum ab Hippocrate. Vbi nō medicamēto, sed vitio vlceris, ea res attribuenda est. Oculis, naribus, & palato aliisq̃ue partibus vlceratis, quas humor subinde alluit, vis medicamentorum aut acrior sit quàm vlcus postulet, aut sēpius cōmutetur. In cōtumacibus, solidiora pharmaca inferi possunt (si nō prohibet dolor) & platysmata suprà adhibētur. In summa iustam qualitatem pharmaci æstimabis, si purius vlcus inde redditū est, si naturaliter sentit locus vlceris, qui sensu prēditus est, si modicè rubet, si nimium neq; siccus, neque humidus est. At quicunque

cunque sensu caret, aut non naturaliter sentit, quicunque nimium aut aridus, aut flaccidus est, quicunque albidus, pallidus, liuidus, aut niger est, is nondum purus est. Omnino verò siccandum vlcus est, quantum videlicet & ratio sordium, & natura partis ostendit. Alioqui infra modum siccato vlcere, fungus è membranis nascitur, aliunde excrescit caro, aut putredo contrahitur, in qua ad acria mordentia, ignem quoque & ferramenta confugere sæpe necesse est. *Vermiculans vlcera.* Accedit aliquando ad sordes vt etiam vermiculatur, quo tempore aloë cremata conspergatur, veratrum album in tosto melle, puluis pollij & absynthij in pice imponatur, nuclei mali persici è persicariæ succo tusi, plantago arefacta, marrubium, centaurium minus, calamyntha, porrum, vesica suo felle plena, igne resiccatur, teritur, & inspergitur. In summa quæ amarore vermes enecant, & purgant sordida. Arida teruntur, & ita resperguntur cauo. Ex aliis succus exprimitur, melli vel aloë cõcorporatur, & aliquando simul omnia coeunt. *Ad cancerosam.* Eidem rei lixiuum conuenit, vrina, linamēta, ieiuni hominis saliuâ tincta, cicer, orobus, lupinus, hordeum, vsta, trita & melli mista, vermes extinguunt, maligna sanant & Chironia. In cæcrotosis cæcri fluuiatilis cinis cum cadmia. Si cadmia defuit, tuthia vulgari crustacea, gleba æraria vsta tritaq; aut fuligine ex ærariis fornacibus, vti licebit. Meliora hæc omnia ex vino giluo tenui, pellucido, leniter adstringenti, & odoro, diutius versata loco subdiali & obiecto soli, alioqui luculento foco. Irionis semen conlæuigatum melli, lens cocta cum melle. Mel in tegula torrens, & solani succo imbibitur. Ex virētis oleæ surculis succus exprimitur,

# INSTIT. CHIRVRGIC.

Pompholyx.  
Cerusa e ura  
con

exprimitur, malicorum vititur. Semperuium, umbilicus veneris, solanum, intybum, lactuca, psyllium, omphax, atriplex exuccantur, quod inde expressum fuerit. pistillo & mortario plubeis diutius circumagitur. dum sit luti crassitudo. Pompholix in pila plumbea diu versatur, atque paulatim affuso succo qui conueniat, volutatur. Colocynthis vititur puluis pompholygi permiscetur contra maligna & vermiculancia. Cerusæ è draconio (gersem serpentinam vocant) ℥. i. calcis viuæ, ℥. 3. cum aceto pista iunctaque fistili cremantur, puluis expurgat can-  
cros & curat. Fit autē ea cerusa hoc modo, quæ per se clementer purgat. Radicē verē colligunt, Galenus sub canicula, Dioscorides lauat, siccatur umbra, aliquot post diebus secta in taleolas, traicitur acu quæ filum ducat, ex quo dependens umbrosa domo asseruatur. Vfus tēpore, trita inspergitur, & maligna curat, melli aliquādo. (aut acrior sit) cerato cōmiscetur. Sed vt inde cerusa fiat, vbi iā siccata, & in farinā trita est, vitreo vase includitur, in quo tantum sit aquæ rosacæ (quod ροδόσπασμα vocant) vt enatet aqua, vas ergo viginti dies persolatur, & vt expirat aqua atque combibitur, ita noua refunditur, postremò farina illa exiccatur umbra, vbi liquorem multum cōbibit, vsui reponitur. Eodem modo umbilici marini, sales ostreorum cinis, puluisculus iridis, os sepiæ, aliaque generis eiusdē comparantur & addita cerusa lota gummi, mucaginne. crinostagmate bene mūdato lotoque adipe, archusa denique ad fucos mulierum permiscetur. Ad cancrofa ℥. litharg. 3. 2. vino giluo. tenui. odor. leniter alstringēte vel aceto, si quid est calli, immerguntur,

L. litharg.  
& cerusa.

merguntur, ex eoq̄ue quotidie in sole vel igne conteruntur pitillo plumbeo & mortario, idq; deb. octo vel plurib⁹. At quoties tritura reperitur, vinū & acetum mutari debet, tanto efficacius pharmacum est quanto plus liquoris rapuerit. Hic rursus oxelæon ad selibram iniicitur ex quo diu trita lithargyrus excoquitur puro carbone iam nō inquinanti, cerusæ semuncia inspergitur, mouetur omnia & sedulò cōmiscetur. Sunt qui cineris ostreorū 3. 2. adiciant. Ex eadem materia Ricotica barbaro 3. 2. ol. myrt. vel rosaceo concorporatur, & si lubet succo plantaginis vel solani imbuuntur. Psoricon Mesue medetur cancris, fistulis, lepræ scabiei siccæ, putrida depascitur, superioribus pharmacis acrius est. Item. ʒ. litharg. argenti calchanti, vel vitrioli ana 3. 1 ærug 3. 1. teruntur vno die in solo æstiuo ex aceto acerrimo, quod paulatim respergi debet, deinde cōluntur omnia vase vitreo, & ad quadraginta dies sub fimo obruuntur. *Διαπομπύλος* medicamentum est veterum & recentiorum, quod contra cācros vsurpari potest. Vrticæ semine & foliis vtrifque tritis aridis infriatis Galenus vsus est ad gāgrēnas & caneros quia modicè calfaciunt, siccant, digerunt, tenuium sunt partium, nec mordent, qualia gangrænis & cancris cōueniunt. Sed vbi calor est, refrigerante succo qui per se conueniat, temperari debent. Gāgræne cōpunguntur, scarificaturq̄ue, vt oppressis spiritib. liber anhelitus reddatur, iisdemq̄ue iuuantur remediis quibus & cancri, & putredines. Putrida curā ur melle scyllitico, cui intritus sit puluisculus ellebori. Aristolochia rotūda extenuat,

Ricotica.

Psoricon.  
Mes.Facultas  
quorundam  
medicamentorum  
ad gangrænas  
& caneros.Putrida que  
curent.  
Aristolochia.

f

putredines

## INSTIT. CHIRVRGIC.

*Sabina.*

*Historia.*

*Cōtra putredines articu-  
lorum, ueruo-  
rum, &c.*

*Vsitata vete-  
ribus contra  
putredines.*

*Tria genera  
medicamento-  
rum contra  
putrida.*

putredines sanat repurgat sordida, ad quæ effica-  
cior est, quam longa, Hyperici semen aridum, com-  
mistum melli, putridis & iis quæ in multo humore  
sunt, medetur. Erysimi semine ad cācrofa, putrida,  
gangrænas similiter vtendum est. Sabina iisdem re-  
medio est, & atra iuuat verum tum hæc, tum quæ  
acria sunt, rebelli ac nimium contumacivitis accō-  
modare melius est. Quod genus vlcerū vim acriū  
medicamentorum sine noxa perferre potest. Nam  
cum recenti malo, dolente atque inflammato, cle-  
mentius agendum est. Computrescebat & humore  
soluebatur medij digiti manus articulus cui, Gale-  
nus initio cataplasmata induxit è farina hordei in  
lixiuio pista, vicina verò sursum versus tensa & do-  
lencia inflammato oleo calente fouit. Postea verò  
quæ dolor acquieuit, calorq; extinctus est, ex oro-  
bi farina eodem lixiuio iuncta, cataplasma compe-  
git atq; is tandem sanatus est. Ita in articulis & ner-  
uosis partibus, tum etiam aliis quæ putrescant, fari-  
na (vt dolor est & calor) commutanda, quæ si non  
prohibet, è lupinis & ciceribus extūdi potest. Sub-  
iguntur autem cataplasmata modò lixiuio, modò  
oxycrato. & in dolore œnomelite, aliquando etiā  
aceto mulso vel aceto. Marrubio, scordio, centaurij  
minoris cauliculis vti solitos veteres cōtra putredi-  
nes Galenus author est. Aloë, myrrha, absynthio, a-  
pio amaro melle tosto ferè vsa est posteritas. Plan-  
tago rebellia, rheumatica & putrilaginosafanat, ac  
ferè inuenias veterem medicinā triplici genere re-  
mediorū pugnasse cōtra putrida. Frigidis enim &  
astringentibus aliquando vsa est, vt plantagine, ad-  
modum calidis, sed quæ non mordeant, vt vrtica-  
acribus.

acribus ac iam mordentibus, vt Sabina, ac ſingula genera ſingulis vlcerum differentiis accómodáda ſunt. Initiis enim putredinũ vbi calor & dolor eſt, frigida illa cõuenient. Vbi inualuit putredo & cõtumacior eſt, ad acria decurrendũ. In media conditione, medium genus vtile eſt, in quo anethi ſemẽ eſt vſtum, tritum & inſperſum. Ex officinis ærariis, ea ſcoria colligitur, quẽ fuſo ere relinquitur, è vino tenui quod ex auctero dulceſcat, diu cõteritur, qua druplo melli torrefacto permisceſtur, ſingulari remedio inani, oris & genitalium vitiis, magis etiam cum putredo depaſcitur. Colligi poteſt ea ſcoria, nõ ſolum in primariis illis fuſuris glebẽ erariẽ, ſed vbiq; æs collectaneum iniecto lapide, quem calaminarẽ vocant, refunditur. Melle myrtino ginguiarum putredines cõhibentur. Contra putredines & nomas. ℞. aluminis vehemẽter triti ʒ. 2. ſalis ʒ. 1. mell. ʒ. 1. omnia coniuncta cremantur olla viſtis, tritiſq; ʒ. 3. tritẽ ireos immiſcentur. Alumen per ſe, vſtum tritumque contra eadem mala inſpergitur. Aliud. ℞. aloẽs. myrrh. an. ʒ. 1. trita iungũtur ſucco plantag. & abſynth. dum ſit luti craſſitudo. Vitriolum vritur, diuq; ex aceto tritũ circumagi- Vitriolum. tur, hic ſiccatur, ſiccum è vino ſubigitur, ruſus ſiccatur, puluis citra morſum ſiccatur, & putredines adiuuat. Eodẽ modo macerari poſſunt acria metalla, vt ſiccent, nec ita mordeãt. Chamępytis, cupreſſi nuceſ & folia, putrida flaccida, & atra iuuant. Oſtreorum, buccinorum, teſtularum, oſſium, ſæpiæ cinis ex oxycrato, & aliis contra eadẽ valent. Sunt qui, dum ea cremantur, quartam partem ſalis immiſceant. In calore & phlegmone, alterci ſemen albũ



# INSTIT. CHIRVRGIC.

cum dupla farina tosti hordei vel auenæ, vsurpan-  
dum. Atque hinc poterit ex ænomelite, vel oxycra-  
to cataplasma fingi. Arida radix cucumeris agreſtis  
fici folia. ellebori fibræ, vnumquódque tritum, &  
melli miſtum iisdem vitiis auxilio eſt, è radice gē-  
tianæ & enulæ, ceruſa factitia, qualis è dracontio  
deſcripta eſt, mirificè prodeſſe poteſt. Scilla ſimili-  
ter cum melle cocta. Cinis è lana ſuccida mollibus  
flaccidis, malignis vlceribus vtiliſſimè inſpergitur,  
atque efficaciſſe ſiccatur, eodē modo è pilis anima-  
lium vtilis ſiccando cinis comparatur. Ad putrida.  
℥. vitrioli vſti, & vt priùs, conſecti ℥. i. elaterij & ſe-  
minis lini torrefacti an. ℥. i. terantur omnia. Iſido-  
ri Antiochæi ad gangrænas, nomas veteres, & ma-  
lignas putredines remediū. ℥. lithar. ℥. β. ærug. ℥. i.  
olei veter. vel ricinini ℥. 9. metallica trita cum ℥.  
quatuor, & ſemiſſe olei clemētis foco coquito, ver-  
ſato ſpatha, vel manubriolo ex enulæ radice, cucu-  
meris agreſtis & gentianæ, idque donec viride fiat,  
hîc in mortarium data omnia volutato, ex quo in  
cacabum repetita, cū pari modo olei recoquito, dū  
ſit melinum pharmacum, tum in pilam reuocato,  
& circumagito, deinde redditum foco tertio exco-  
quito, vt ruſſum appareat, & in mortarium reducta  
ſubigito. Poſtremò iam quarto coquito cum pari  
oleo, omniâque vt priùs, facito. Andromachi ad ea-  
dem. Litharg. ℥. 9. calcis viuæ, æris cremati, thuris,  
terebinth. ariſtolochiæ rotundæ, ana ℥. 4. picis, ce-  
ræ, ammoniaci ana ℥. 6. liquabilia ſeorſum fundi-  
to, deinde metallica vino tenui & odora tincta, tri-  
tâque immittito, omnia in mortario cōtundito, &  
ſideliter commiſceto. In putridis, depaſcentibus,

&

*Iſidori ad  
nomas, gan-  
grænas, &c.*

*Andromachi  
ad eadem.*

& grauitè olentibus, vocato puluere angelico, arrhenico, crudis vitriolis, aliisque id genus vtendū erit. Ea in tenuissimum pollinem trita, & extremo specillo capta respergantur, ex quo linamentū simplex, vel liquore, qui conueniat, madidum, superponendum. Atque hīc vbi aliis remediis nihil profeceris, ferro & igne purgandum est. Efficax medicamentum Lucij Cathagetae ad malignas putredines & nomas. ℞. sulphuris viui, auripigm. squamæ æris ana drach. 2. æris combusti, drach. dimidiam, trita omnia inspergantur, mollius est, si in melle rosaceo adhibetur. Arido vtendum magis in humore multo, in siccis temperatur rosaceo. Aegyptiacis quoque vti licebit. Atque hæc quidem obiter, neq; tamen præter institutum, contra canculos, gangrenas, putredines, nomas, vermes, nigredines, quæ ad purgandi, siccandi que rationem, atque omnino percuranda vlcera pertinent. Nunc autem ad peculiarem materiam veniamus. Repurgant melle tincta linamenta, aridum mel quod melitæis vasīs inhæsit, mel rosaceum, quod etiam reprimat & calorem attemperat. Sacchari eadem ferè vis est, terbinth. cum melle & rosaceo pari mensura. Eadē cum butyro, neruis utilis est. Iris serpentibus vlceribus & sorde plenis, gentianæ radix & enulæ. Marubij succus & fœniculi cōditus melle. mucago fœnugræci tincta rhodomelite, oculorū vlceribus idonea sunt. Melissophyllon marrubio imbecillius est. Ærugo tosta, lotaque, æris squama, ac ferè reliqua metallica similiter cōparata citra morsum siccant, quædam etiam detergent, æs, stibiū, antimonium vocant, ad hæc, chalcitis, misy, foti, quæ ad vitrioli

*In nomis & forentibus.*

*Materia purgans.*

*Metallica.*

## INSTIT. CHIRVURGIC.

*Caprillum  
stercus.*

& cuperosæ genera referunt. Caprillum stercus ex-  
ustum & è vino pistum desperata sanat. Trochisci  
è calce maligna iuuat, calx viua trita quadruplo  
melli cômiscetur, ex quo finguntur orbiculi, qui in  
figulino ordine collocati, & in fornacem dati con-  
cremantur. Inde puluisculus inspergitur, qui longè  
clementior fuerit, si vino vel aceto eluatur, vt citra  
morsum tergeat, & siccet. Eadem arte multos pa-  
stillos cõficias, è calce, melle, & metallicis. Chiro-  
niis, hoc est valde malignis, aliquando satisfaciunt  
cicer, orobus, faba, hordeum, auena, fresa omnia &  
melli infriata, vel per se respersa cauis. Eadè lupi-  
norū vis est, qui in cinerem molli igne vñti, mali-  
gna vlcera tibiarum purgāt, implēt, cicatrice clau-  
dunt. Ad eadem valent radix asphodeli ari, & asari,  
ostreorum testæ & volumina cochlearum. Vruntur  
omnia figulari clausa, deinde etiam lauantur vino,  
siquidem acrimonia deterenda est. Polium aridū  
rebellia sanat. At hoc scabiem expurgat, & mali-  
gna curat. Ellebori albi ℥. i. litharg. sesquincia. li-  
tharg. in olei vnc. 4. & aceti vnc. 2. coquitur, dum  
non inquinet, subductis igni, elleborus paulatim  
inspergitur, commouentur spatha, & sedulò per-  
miscetur. Ligustri nostri & minoris plantaginis  
folia affuso omphacio teruntur asperguntur sale,  
succus exprimitur ad maligna colis vlcera. Sed v-  
bi quæ mordeant partibus adhibentur, quæ inflam-  
mata celeriter putrescāt. purgatio corpore & ieiun-  
no vicina repellētib; obstipāda est. Erinacij cinis  
amygdala, stœchas, anagallis, aristolochiæ radix,  
gentianæ, enulæ cyperi, vrticæ semē, & irionis, hu-  
midiorib; vlcerib; cācrofis, putrilaginosis, gāgræna

*Contra scabiē  
& malignā.*

&

& liuore tinctis, mirificè profunt. Radix diffaci in cinerem crematur, aut in vino ad melliginè coquitur. Solani radix excorticatur, siccat, cortex cancris & nomis auxilio est. Cōtra eadē, succo & trita herba utimur, multò magis vbi calor est. Minium quod è sulphure & hydrargyro nostro fit, depascēdo purgare potest, nisi vstura & lotura maceretur, sic enim clementius futurum est, vt quod è sola cerusa vsta cōparatur, vel plumbi gleba sterili, quodque veluti arena in venis argētariis colligitur, aut paratur è syrico. Cerusa trita cribro traducitur, & in fictili patella coquitur syncero igne, donec rubeat & sandicis colorem trahat, idque alij sandaracham alij sandicem vocant. Quidam etiam syricō. Et qui sandaracham ex hac & rubrica sandicē fingunt. Ex sandice & synopide syricon, omniaq; siccando conueniunt. Ad diuturnā & malefica vlcera tibiarum, vbi siccandum atque digerendum. Sandicis lib. 1. olei dulcis lib. 2. coquantur lento igne, dum non inquinent. At si qua sordes, ea detergenda prius est. Ad cancrofa & malefica, cerusæ è dracōtio, vel radice dracontij, vt prius cōparatæ 3. 3. calcis viux 3. 2. cum aceto fingatur magdaliæ, quæ in olla cōcrementur, vt inde puluis inspergi possit. E filicis radicibus quæ tergeant, & leuiter astringant, cum melle medicamentum fit conueniēs iisdem vlceribus. Quæ ex ærugine parantur cruda vsta, lota, vsu frequētissima sunt, qualia Ægyptiaca ac in purgando cruda ferè ærugine vtendum erit, multò magis si valde sordida, si putrilaginosa, si maligna vlcera curanda sunt. Quod si non adeò grane vitium est, vsta quidem licebit vti, aut tantū

*Minium.**Sandaracha.**Sandy.**Syricon.**Ad vlcera**tibiarum.**Ægyptiaca**æruo.*

# INSTIT. CHIRURG.

lota, vsta verò & elota implendo cauo atque glutinando magis idonea est. Temperatur cerato, octuplo decuplo duodecuplo, & aliquando terebinthina permiscetur quæ vt ad æruginem similiter cerato habet octupla decupla duodecupla. Quâquam ea ratio variè commutari potest, vt sunt vlcera & corpora. Cerae terebinthina 3. i olei 3. 4. liquefactis adde æruginis 3. i. 2. 3. Quânto pius receperit æruginis, tantò acrius pharmacum futurum est. Aliud. terebin. lb. 2. cere lb. 1. rosace. 3. ; aut 4. fulis permiscetur æruginis 3. 2. vel tres vt magis liccet atque detergeat. Ac iam deterfa torde quum iam regeneranda caro, vel glutinandum vlcus est minuetur ærugo, vel cerati & terebinthinæ modus inaugebitur. Atque omninò medicamentis quæ ex æruginis & acris metallicis conficias, vis obtundi potest, si cerato aliisque id genus temperentur, si cremen-  
 tur lauentur si denique diutius excoquantur, vsturæ ratio ex Dioscoride & aliis petenda est. Ab eodem loturæ formula explicatur, Lauantur vino, vt impleas & glutines aceto vt tennes. penetres, repellas. Cruda melius expurgant, vsta tenuiora sunt, magisque discutunt lota omnino clementiora, vsta lotaque præstantissima sunt, vt sicces quidem nec mordeas Si lauatur aqua, ea sit pluuiæ, vel æstiuæ, vel quæ tonante cœlo defluat. Ærugo sublati igne aliis inspergitur, vt viride & acrius pharmacum relinquatur. Circa initia induræ glua facit, & dichroma colore ambigua. Diutius cocta æruginis etiam redduntur ruffa, minusque acris medicamenta mitiora quoque, si diutius lotura repetatur, & multum vini ærugo combibatur. Litas Græci ferè ap-  
 pellant

Nota de metallicis.

Litas.

Pellant medicamenta. ex ceræ & terebinthinæ æ-  
 quis partib æruginis octaua parte, decima duodeci-  
 ma subduplo thure ad modum æruginis, & ali-  
 quando oleo addito sesquialtera ratione ad ærugi-  
 nem Ceræ, terebinthinæ ana ℥ 1. æruginis ℥ 2. thu-  
 ris. ℥ dimidium. olei sesquidiach. sed ferè oleum  
 adiicitur cum sine thure & aceto conficitur phar-  
 macum. Aceti verò vsus est, vt ex eo ærugo diutius  
 verferur. Maleficis cōuenit, æruginis ℥ 1. squammæ  
 æris ℥ 2. aceti ℥ . mell. ℥ 2. metallica in sole tādū  
 teruntur ex aceto, dum hoc consumptum sit, mel  
 adiicitur, coquuntur omnia dum ruffescat phar-  
 macum. Clementer purga ex mellis & terebinth. pari  
 pondere. paulò efficacius audita ærugine priore ra-  
 tione. Maligna iuuat. lithar. lib. 1. coquitur in aceti  
 lib. 1. olei veteris lib. 2. iam inspissatis, adde ærug. ℥ 3.  
 1. coquantur omnia dum ruffum colorem trahant.  
 In rheumaticis & humidioribus mel. lib. 1. aceti se-  
 libra æruginis ℥ 1. aluminis semuncia, coquuntur  
 reliqua, postremum alumē immittitur, tandiu per-  
 mittuntur dum ruffescant. Atque omninò in his  
 modus sit æruginis. vt ne mordeant. Multa alia vi-  
 ridia & gilua ex ærugine lib. 2. de cōpositione me-  
 dicamentorum *Th. 1. v. n.* Ægyptiaca recentiorum  
 multis emplastris veterum ex ærugine respondēt.  
 Vnguentum de melle aut Ægyptiacum magnum  
 Mefuæ vlceribus malignis, putrilaginosi, cunicu-  
 losi cōuenit. Sed hæc præscriptis modis macerata  
 ærugine moderari licet. Cera viridis arida & infria-  
 ta aut (si res postulat) soluta rosaceo deterget. Æ-  
 gyptiaca aloë. myrrhæ. vsto alumine radicibus ari-  
 stolochiæ. gentianæ, enulæ, & aliis id genus aridis

*Ægyptiaca  
recentiorum.*

# INSTIT. CHIRVRGIC.

*Papauer cor-  
nutum.*

*Asclepiadis.*

*Ratio confi-  
cendi cathar-  
tica ex eru-  
gine & me-  
tallica.*

*E farinis.*

tritis consperguntur, siccātur in tegula. puluis inde  
maccosus carnes putrida, præhumidas corrigit, &  
testulas ossium elicit. Papaueris cornuti folia, & flo-  
res admodum sordida vlcera & rebellia iuant, sed  
his, vt aliis omnibus quæ valde tergeant, abstinē-  
dum in molli corpore. nec ita sordido vlcere, siccā-  
tur illa, & insperguntur. Archigenes insperlis pului-  
sculis, floccum ē diuulso filo. imbutum frigida vel  
subaustero vino superponebat. Squamæ æruginis  
ana ℥. i. ceræ ℥. 6. larignæ aut terebinthi liquidæ ses-  
quuncia in minus malignis. dimidio minuēda me-  
tallica. In tumentibus vicerum labris resinæ loco,  
œfypus, medulla cerui vel vituli permiscēda, medi-  
camentum in platysmate totum vlcus comprehen-  
dat, vicinæ partes parygro recenti, vel alio medica-  
mento, quod phlegmonem arceat, muniantur, ter-  
tio quoque die resoluitur platysma. Ex ærugine &  
cremato ære medicamenta conficiuntur ad mali-  
gna, concorporantur illa modò cera pingui, modò  
cerato myrteo vel rosaceo, atque par metallorum  
modus est. Ceratum paulò vincat metallica, quod  
aliquando quoque larignā, vel terebinthinam ha-  
beat subdupla ratione ad ceram & alumē subqua-  
druplum ad metallica. Aerug. æris cremati an ℥. i.  
aluminis semuncia ceræ sesquuncia terebint ℥. 6.  
olei myrtei semuncia. Plura generis eiusdē quarto  
de compositione pharm. *℞. γν.* E farinis hordei,  
fabarum, cicerum, orobi, lupinorum melle & tere-  
binth. concorporatis, sordes extergebis. Farinæ ℥. 3.  
succij apij, absynthij, marubij & similiū, vnius lb. i.  
mel ℥. 9. ad iustum corpus decoquantur. Al. Hor-  
deacea in duabus partibus aquæ, vna mellis rosacei  
percoquitur

percoquitur, purgat, lenit, calorem temperat. Farinae in memoratis succis coctae, contra cáncros & fistulas valent, in laboribus neruorum terebinthina commodè permiscetur myrrha & aloë in putredine, quæque contra putria descripta sunt. In calore, hordeacea & sabacea præferri debet. In aliis è fœnugræco, ciceribus, orobis & lupinis melior est. Amicissimum nervis quod sequitur. *Amiciss. nervis.*  
 ℞. resinæ, mell. terebinth. ana ℥ myrrhæ, sarcocollæ, farinae fœnugr. & seminis lini ana ℥. i. iros semunc. Aliud *In pure crass.*  
 quod in pure crassiori viurpandum est. Galbani, ammoniaci, resinæ, terebint. sepi taurini, ceræ, olei veteris ana part. æqual. in aceto mersa, paulatim fundantur igne. Aliud quod purgat, siccatur, fistulas curat & glutinat. *Pulvis Octauj.*  
 ℞. iris, florætinæ ℥. 5. farinae orobi vel cicerum ℥. 3. mannæ, thuris, calcis viuæ ana ℥. 3. aristoloch. ℥. 3. & semiss. fiat pulvis, in fistulas vêtulo facto immitti potest, alioqui in liquida medicamenta quæ fistulis conueniant, respergitur. Viride ex herbis vetera vlcera repurgat, excrecentem carnem reprimat & cicatricem ducit. *Viride ex herbis.*  
 Chelidoniæ, plâtaginis, scabiosæ, lybistiçi, vrticæ, ormini sylvestris, ana M. i. conquassata septē diebus in oleo macerentur, in eodem cocta exprimantur, expresso succo, adde ceræ ℥. 3. terebint. ℥. 6. resinæ ℥. i. simul bulliant dum fiat corpus. Subductis igne adde sarcocollæ, aloes ana ℥. i. aristolochiæ longæ, eruginis ant. semunc. aluminis ℥. 6. sed iniquius pondus est, fiat vnguentū. Vnguentū apostolorum ferè respondet veteri antiquorum qui hoc vsū sunt attrahēdo, molliendo, glutinādo & contra ferarum morsus, quod quia variè describunt, ex Aëtio vertimus  
 thure



## INSTIT. CHIRURGIC.

thure addito, & myrrha, vnde clementius futurum est.  $\mathcal{L}$ . lithar.  $\mathcal{Z}$ . 25. ammoniaci  $\mathcal{Z}$ . 9. Colopho.  $\mathcal{Z}$ . 16. æruginis, galbani ana  $\mathcal{Z}$ . 2. bdellij, opopanax ana  $\mathcal{Z}$ . 3. aristoloch. thuris mascul. an.  $\mathcal{Z}$ . 6. myrrh  $\mathcal{Z}$ . 4. ceræ, ol. an.  $\mathcal{L}$ . 2. Litharg. oleo coquitur, media ebullitione inditur ærugo (recetiores decoctionis fine, vt melius purget) vbi non inquinant, Colophonia inspergitur, summotis igne, reliqua ex aceto trita immittuntur, postremò versantur in mortario, & permiscentur. Nostri terebinthinā addūt, & maiorem modum æruginis, ideòq; purgando efficacius est. Al. Mellis cocti lib. 1. thuris femuncia, myrrh.  $\mathcal{Z}$ . 2. efficacius è crudo melle, additisque æruginis & resinæ an.  $\mathcal{Z}$ . 1. Plura primo, secundo, quarto, & quinto, de compositione pharm.  $\mathcal{L}$ .  $\gamma\epsilon\upsilon\alpha$  decimoquarto & decimoquinto Aëtij.

Providendū autem, vt ne malè purgatum vlcus coeat. Hippocrates cuneolos è spongia aut plūbo ori fistulæ inducebat, nostri & spōgiam & gentianam & Syphones, vel tubulos, quas cannulas appellant. Ac liquabilia quæ  $\tau\eta\mu\alpha$  vocant cuniculis vlceribus & fistulis iniiciuntur, penna vesicæ alligata, vt Hipp. vel cornea fistula vesicæ iuncta, vt Gal. Nostri melius fistulis quas syringas vocant, vteres oriculariis clysteriis, aut vesicæ loco, sacculis coriaceis vsi sunt. Arida verò  $\xi\gamma\gamma\iota\alpha$  dicta corniculis inspirabant, aut illitis penicillis lentore aliquo inspergebant. penicillos autē è filo contexebant, fingebant è scirpo. Nostri è plumbo fistulas confāt, illinunt vnguinosis auxiliis, candelas cereas immittunt, aut has mistis Ægyptiacis, cera viridi & aliis conficiunt.

## De Sarcoticis. CAP. 3.

**Q**Uod iam purum, quodque *ἀνέριστον* vlcus  
 est, carne impleri debet. Ac tale quidem est,  
 quod sordibus purgatum, modicè siccatum, sine  
 rheumate, dolore, phlegmone, callo, intemperie  
 constitutum est. In summa cui nihil accidit, quo  
 minùs impleri possit. Hic ergo carnem regenera-  
 bis. Sed hoc naturæ opus est, quæ carnem è san-  
 guine conficit. Oportet ergo tantum talémque san-  
 guinem naturæ suffici, vt inde carnē procreet, in-  
 stituenda vitæ lex, cibi boni succi, vitatis acribus,  
 auis, venatio, suilla elixa dari potest. Vinum in do-  
 lore & phlegmone alienum est, datum alioqui mo-  
 dicè, nec ita vetus, vt iâ acre sit, aliquando prodest.  
 Reliquum verò sarcoticis medicamentis perfici de-  
 bet. Quæ reuera sarcotica sunt, iustam materiam *Sarcoticorum*  
 naturæ comparant, modicè detergent, siccant pri- *natura.*  
 mo gradu, vel ita vt ne nimis calefaciant. Nam quæ  
 vehementiùs extergeant & siccent, primùm qui-  
 dem ac per se, rhyptica & cathartica appellantur,  
 deinde verò ac secundariò sarcotica, & colletica  
 dici possint. Quin & cephalica sarcotica quædam *Cephalica.*  
 sunt, sed paulò acriora, quàm vt reuera in sarcoticis *Modus cerati*  
 statuatur, nisi vim siccandi emollias, & acrimo- *ad rhyptica &*  
 niam hebetes, vt eorum quæ purgant, asperitatem *cephalica.*  
 lenias. Sic enim carnem regenerent. Itaque ceratis, *Materia cera-*  
 oleo, & similibus temperetur. Ac cerata dupla, tri- *torum.*  
 pla vel quadrupla sunt, vt molle, durumque cor-  
 pus, & medicamentum læne, vel asperum, acre vel  
 moderatum est. Quale fuerit si ægyptiacorum vn-  
 ciam, duabus, tribus, aut quatuor unciiis cerati per-  
 misceas. Cerata fiant è myrteo, si adstringendum,  
 ompha-

# INSTIT. CHIRURGIC.

omphacino, si etiam refrigerandū, rosaceo, si præter hæc concoquendum & repellendum, quanquā his omnibus communis quædam virtus est. Mastichino. lentiscino. terebinthino, vbi leniter calefaciendum, molliendum, & contrahendum. Quòd si parte aliqua durum, crudum, nec ita clemens vlcus est, loco cerati simplicis, vteris eo, quod quia resinam capit *ῥῆτινὸν ὀνόμαζον* appellant. Dersa quoque rotis axungia, temperandis eiusmodi catharticis idonea est. Mollit, siccat, digerit, & leuiter astringit. Licentia est vocare sarcotica, quæcūque repellunt, temperāt, molliunt, intēperiem corrigunt, ac breuiter summouent omnia, quæ à generanda carne naturam intercludant. Qua in re vitanda sunt, quæ plurimum astringunt, & acrimonia mordicant, illa frūgi humiditatem partium, & materiam carnis exhibunt, acria corrodunt, & aucta sorde vlcera, amplificant, vtrāque verò exasperant. Seligenda materia, quæ naturæ corporum, & partium cōueniat. Nam si quid Dionis vlcus impleat, non statim & Socratem iuuare potest, nec quod in glande carnem instaurat, & preputium protinus incarnabit. Finge Socratem cui femur vlcera tum sit, thure alio qui sarcotico putredinem gignes, aristolochiæ puluere carnem restitues. Aristolochia enim carnem regenerat, vbi thus sordes commouet. Ac rursus Dion sit paulò humidior temperatis huic thus cōmodū aristolochia inutilis est. Thus quod in Dione carnem gignit, in humidiorē vel sicciorē nihil tale efficiat. Atque omninò in siccioribus corporibus & partibus, magis siccantia, in humidioribus quæ siccant quidem, sed minùs, vtilia sunt, ideoque

*Axungia rosacea.*

*Delectus materia.*

*Thus Aristolochia.*

*Consilium à natura partium.*

&

& præputio. & toti pelli quæ colem induit, sicciora, peni carneo & giandi minùs siccantia conuenient. Adhæc carni quæ minùs siccant, oculo minùs quàm nari, huic quam auri. Oculos incarnant, sarcocolla, quæ maceratur aliquando in aqua rosacea, lacte, rubi succo. & aliis. thus, manna, cortex thuris, aloë. myrrha, gummi arabicum, tragacantha, mistis interim metallicis, quæ citra morsum siccant (siquidem copiosior humor affluit) pompholyge, cerusa, terra sigillata, plumbo vsto, spodio, antispodiis, acrium etiam momento, vbi in multa forde vlcus est. Sed hæc elota priùs, meliora sunt auribus *Auribus.* metallica magis siccantia. nec aliis temperata carnem regenerant. Adhæc pastilli qui plurimum siccant, Andronis, Polyide, Pasionis. Scoria ferri plurimis diebus in sole teritur, ac subinde intingitur *Scoria ferri.* aceto, quod acerrimū esse oportet, aut certè vino. Alij ita cōparatā, & in latere torrefactam, sepiùs terunt, lauant, aceto imbuunt, siccant, & in pollinem tenuissimum cōminuunt. Atque hoc medicamento vtendum erit in veteratis vlceribus, in duris corporib. vbi lenioribus nihil profeceris. Quæ *In naribus.* ocularia efficaciora sunt, incarnandis auribus quasi leniora vsurpentur. In narium vlceribus, non tã ferri quàm plumbi recremento vti conueniet. Adhæc lithargyro, cerusa, vino austero, oleo myrteo, rosis, punicorum succo misto interim malicorio & alumine. Qualia sunt recrementi plumbi, vini veteris, olei, myrtei, ana  $\frac{3}{2}$ . recrementum in pollinem terito, & affuso vino diu versato, tum myrteo adiecto omnia conquassato, circumagito, figulino includito, coquito, dum sit luti crassitudo, in vase plumbeo

# INSTIT. CHIRVRGIC.

plumbeo ad vsum reponito. hoc etiam auriū vlceribus accommodatur. Eadem ratione metallica tri-  
ta, liquidis permiscebis. & si siccandum magis, ro-  
sas, melicoriū, alumen ex vino tritum adicies. Cæ-  
terum vlcera narium pastillis illis, Andronico. aliis  
que generis eiusdē semper curari Galenus author  
est. Verū à lenioribus auxiliis ad hæc transeun-  
dum erit. Soluuntur vino modò dulci ( siquidem  
dolor est, aut aliquid crudi reliquum sit) modò au-  
stero, quod reprimat aliquando veteri, vt siccet ma-  
gis, nonnunquam aliis aceto etiam modò vinoso,  
modò acri & vetusto. Atque hi pastilli capite de  
hæmorrhag. a describentur. Rosæ detractis vngu-  
ibus omphacino triplo infunduntur, quadraginta  
diebus infuantur oleū cauis vlceribus accommo-  
datissimum est. Vlceribus pudendi quæ humidiora  
sunt anethum vltum inspergitur cucurbita sicca,  
lota pompholix eiusq; cinis lapis hæmarites, pini  
cortex, plumbum vltū lo-um cadmia similiter com-  
parata. spodium antispodia, quæ conficias ex olea-  
stri floribus & foliis ebore, cornu cerui dactylo-  
rum nucleis, moris immaturis, buccinorum cauis,  
testudinum & ostreorum domiciliis, taurino giuti-  
no aliisque plurimis, quorum quæ solidiora sunt,  
noua cremantur olla, molli carbone, dum figulinū  
percoctum sit, quæ verò molliora exarescunt in so-  
le, teruntur omnia & si quid acrimoniæ retinent,  
lauantur vino & rosacea aqua, vt citra morsum sic-  
cent, impleatque, hæc autem ocularibus sarcoticis  
commode ascribentur. Præter hæc tum pudendis,  
tum partibus omnibus quæ vegetius sentiant, ido-  
nea sunt, amyllum, cerusa sæpius elota. His autem  
conuenienter

*Antispodia.*

*In pudendis  
& partibus  
quæ facile  
sentiunt.*

conuenienter miscbitur aliquid thuris, mannæ, corticis thuris, aloës, sarcocollæ, myrrhæ, cerusæ factitiæ aloe sicca, & mannæ portiuncula, non ita madida vlcera genitaliũ incarnantur. Quod si cancer in metu est, solani succum, semperuiui plantaginis & similiũ, pistillo plumbeo & mortario diu versabis, in eoq̃ue medicamentum accommodatũ concorporabis, aut in oleo, quod vi ignis exprimũt è plumbo. Eadem quoque remediorum ratio in ano & partibus quæ faciliẽ putrescãt, seruari debet. Putrescunt faciliẽ & nomis occupantur extremæ corporis partes, quibus infirmus calor est, quique celeriter extinguitur, cauæ, vt quæ recrementis faciliẽ impleantur, atque omnino calidæ & humidæ, & ita positæ, vt parum commodẽ perflentur. Atque omnino naturæ partium coniungere oportet, quod sinus vel humidior & sordidior, vel purior & siccior est, vt si consentiant, quia & pars humida & humidum vlcus est, ad vtrunq̃ue remedia accommodes. Quæ si contraria indicãt, pars natura sicca, & cauum quod supra modum humectum, est ita temperanda ratio, vt quũ alterum iuues alteri non noceas. Natura partis similia, vlcus ferẽ contraria

*In diuturnis  
& rheumatis.*

*In fistulis.*

*Languidius  
& efficacius  
sarcocollon.*

desiderat. In diuturnis, rheumaticis, quæque æger-  
rimẽ carnem recipiant, sarcoticis aridis opus est,  
quæ citra morsum siccẽt, qualia proximẽ descripta  
sunt, quibus cauitas confertim implenda est. Ea-  
dem fistulis inspirantur, ex quo in vetere axungia,  
aut erosa rotis. Ostreorum cinis, labris, vlceris &  
qua parte callus est, imponitur. Omnia ergo rene-  
dia suis finibus distinguenda, & naturæ partium  
vulcerumq̃ue accommodanda sunt. Languidius sar-

## INSTIT. CHIRURGIC.

coticon vel saniem aceruat, vel mollem carnem,  
 flaccidamque gignit. Efficacior cauum exarescit,  
 vel callosum germen enascitur. sæpè etiam excita-  
 tur dolor, vlcusque grauitè arroditur. Quæ indun-  
 tur vlceribus, leuia sunt, & contactu suauiā ( *ἀσπε-  
 ρερα* Græci vocant ) ne asperitate dolorem creent.  
 Ex quo terebinthina ceræ & hæc terebinthinæ sepe  
 commiscetur. Friabilis materia in tenuissimū polli-  
 nem resoluitur, & cū aliis lenta & emplastica tem-  
 perantur, vt aliorum aspredinē delineant. Coquun-  
 tur multa vt liquecant, & viscidam naturam tra-  
 hant, versantur sedulò, ne in grumos coeāt. Cæte-  
 rum aliud genus varium, quod multa simul perfici-  
 cit, & ad multas corporum naturas deformari po-  
 test, sæpe vsui est, quia videlicet eo celerius malum  
 percuretur, & vnū pluribus mederi possit. Ac cer-  
 tē perferri debet, quum multiplex vlceris querela  
 est, quia rheumaticon, dolens, callosum. Quodque  
 volumus, subiecto exemplo intelliges idque in vsu  
 reliquorum medicamentorum semel expositum sit.  
 Glutinat, siccatur, deterget & carne implet. Strobili-  
 næ ʒ. 3. ceræ ʒ. 1. æruginis rasæ semunc. thuris ʒ. 2.  
 aceti quod sufficit, æruginem pluribus diebus ace-  
 to cōteres. thus vno die atq; ita liquatis aliis per-  
 miscebis. Gangrēnis nōmis, putrilagini conuenit.  
 Fiet clementius strobilina prius molliore facta è  
 rosaceo, vel terebinthina strobilinæ loco mista, q̃  
 si terebinthina careas ( quod ferè fit ) larigna, quæ  
 pro terebinthina supponitur, & omnino ei similis  
 est, vtendū erit, quam ad omnia valere, ad quæ te-  
 rebinthina, scripsit Aëtius. Alia larignæ differentia  
 cætera quidē terebinthinæ similis, sed gustu mor-  
 dacior

*Exercitatio  
 in acuendo  
 vel hebetan-  
 do pharmaco.*

*Duplex la-  
 rigna.*

dacior, sensu acrior, & odore grauior est. Mitius quoque fuerit cerato addito, cera lota, diutius trita æruginē, aceto non ita forti, sed vinoso, postremo si æruginem minuas, hac arte clementius factum glutinat. Mediocre fit, nimium neque acre, neque languidū, nō ita diu trita æruginē, & medio modo indita, vt didrachmi vel drachmarū trium pondere picea iniecta aut abietina, qualis est vulgaris terebinthina, iā crassior, natura lēta, colore ruffo, tenacius simul & minus acre ad modum æruginis immisto thure. Vbi siccandum magis, drachmas duas lithargyri, aut squamæ (si quidem cōtumax vitium est) adicies. Squama vratur prius, & in cinerē trita, vino vel aceto eluatur. Atq; hæc metallica tum maxime vsui sunt, cum flaccescunt carnes, & humidius vlcus est. Oleum verò adhibeatur (si quidem fuerit opus) melinum, aut myrteum, in calore, rosaceū præstantius est. Quod si parum procedit caro, aristolochiā, aut aliquid è sarcoticis iniicies, in duritie, medulla cerui & vituli, adeps vituli, gallinæ, anseris, colliquanda sunt. Quæ si leuius efficiunt, ad resinam liquidam, non acrem postea etiam ad galbanum & ammoniacum decurrendum erit. Partem quoque aluminis infriabis in rheumaticis, vel ladanum quod mollit, lenit, repercutit, mastichen, sarcocollem, aloen. Atque hæc repellit, terget, digerit, & carnem gignit. Sic ergo πολύχρηστον temperabis, quod ad multa vitia semel transformes. Variis corporibus adhibeas, eoq; semper carnem regeneres. Iam verò constare puto in simplicivlcere quod ἀπείριστον dicebamus, vtendum esse eo genere sarcoticorum, quæ suauiter implent, nihilque mor-

Ladanum,  
Ex masticæ  
vulcerum.



# INSTIT. CHIRURGIC.

sent. In malignis, despaſcentibus, putrilaginoſis, ad acria decurritur. Sed ita, vt ratio aliqua partiũ habeatur, iuſtòque modo ceratis, roſaceo, & aliis temperentur. Quod inter vtrũq; vitium ambigit, medijs auxilijs curari debet. Atque omninò prouidendum, ne moueatur dolor, atque inde inflammatio, tum ne qua ſit intemperies vlceris, aut partiũ, quæ hoc ambiunt. Etenim natura partis inſtauranda prius eſt, quàm renutrias. Quæ metallica adhibentur, cruda meſſoribus, nauis, foſſoribus, atque omninò calloſis corporibus, eadem uſta & è vino lota pueris, mulieribus, eunuchis cõparentur. Quæ tantum uſta femori inferuntur, ea uſta ſæpiuſq; lota inſpergantur coli. In pudendi vlceribus præſtatiffimus eſt margaritarum cinis. Corallo ſimiliter uti licebis, cryſtallum laudant in oris vlceribus & càcris. In clementibus auxilijs aloë eſt. Amylum per ſe tritum & reſperſum genitalia implet, & cicatrice tẽgit. In tenera natura lauatur aqua polygonij, ſolani, plantaginis, nec abſimilis habetur cura vlcerata fede, ore, partibus extremis. Fuligo thuris, terebinthinæ, myrrhæ, admodum ſiccare poteſt, è ſtyrace & pice liquida efficacior eſt. Suauior quæ ex butyro & œſypo effumat. Lauari debet quæ ſit acrior. Manna repellit, & ad multa utilior thure eſt. Colophonia pix, reſina præſertim ſicca, humidioribus corporibus conueniunt. Colophonia modò per ſe, modò cum thuris polline vel manna, vlcera genitalium perſonat. Caries lignorum expurgat, implètque humida. In vlmo præcipuè, quercu, & adſtringente ligno colligenda eſt. Per ſe inſpergitur, & aliquando adhibetur in cerato. Cortex radi-

*Particularis  
materia.*

*Margaritæ,  
Corollus.*

*Aloë.*

*Amylum.*

*Manna.*

*Pix & reſi-  
na.*

*Colophonia.  
Caries ligno-  
rum.*

eis capparis eadem potest, & cum carie cōtra Chironia & maligna permiscetur. Farina testis hordei & fœnugræci humecta iuuat, torretur in tegula. Aristolochia, gentiana, enula, & similia detergent, *Aristolochia* digerunt, attrahunt, & carne replent, sed hæc paulò actiora sunt, quæque duriori corpori & humidiori vlceri conueniant. Aqua rosacea vel vino macerata aliquantulum mitescunt, cerato quoque retundi possunt. Pumex crematur carbone puro, vino immergitur, siccatur umbra, per se & cum sexta sulphuris parte Chironia iuuat. Chironiis longè optimum medicamentum est plumbum vstum & elotum. *Plumbum* Plumbi scoria similiter comparata, vtrâque cāncros & putrilagines mirabiliter adiuuant. Extillant oleum è plumbo Chemicorum arte, quod ad eadem vtiliter adhibetur. In acri sanie acria suspecta sunt. Sed hæc partim vstura, partim lotura obtundi, & cerato capta, vel rosaceo leniri possunt. Ac cerato quidē, si expositum, nec ita cauum vlcus est, in curticuloso diluuntur rosaceo. Liquidiora pharmaca in superficiem data diffluunt, & inde linamenta arida relinquuntur. Crassa verò atque corpulenta altiore sinum non subeunt, nisi diluantur, & in pyulcis, colliriis, corniculis oris amplioris infundantur. *Metallica* Metallica acria sunt, squamaris, & stomatis (chalvbem vocant) chalcitis, calchantum, quibus non nisi parçè vtendum est, & quod antè dictum est, vstis ferè, lotis & leniori genere pharmacorum temperatis. Lauantur pluvia, si quæritur astrictio, alioqui puteali, fluuiali vel fontana. In fistulis & callosis vlceribus, aceto, vrinalixiuo, vino alioqui giluo & subaustero, multò

## INSTIT. CHIRVRGIC.

magis si vel caro, vel cicatrix creanda est. Sed acribus paulatim assuefacere oportet. Consuetudo enim efficiet, ut ferat pars ea, quibus initio grauiter irritabatur. Crematur metallica, ubi acrimonia metuitur, olla cruda tecta operculo quod vel corniculo, vel multis foraminibus pateat, quaque acrior vapor exhalet. Vista verò extingueri oportet lacte, butyro, melle, vino, herbarum succis, unde vim conuenientem imbibant. Ex quo lotura quicquid acrimoniae reliquum est, exteri debet. Lithargyrus cocta sarcoticis imbecillior est, quia non ita siccatur, terget, adstringit, acrioribus mista iuuare potest. *Ærugo* acrior est, quam ut carnem gignat, oleum sordes colligit, cera idem efficit, tria hæc mista carnem regenerant, celerius etiam si quid sarcotici ammisceas. Quale est.  $\mathcal{V}$ . cerati rosacei  $\mathcal{B}$ . i. æruginis  $\mathcal{Z}$  i. Ac de medicamentis ex ærugine superiori capite satis dictum arbitror, explicatumque, qua arte cathartica deformes. Ut fiant sarcotica, retundenda acrimonia, lenienda eorum quæ tergant asperitas, lenis adiungenda adstrictio, ut carnem regeneres, de quibus abundè eo capite dictum est. Quod si in historiis veterum medicamenta reperiās, quæ carnem regenerent, capiant tamen acria & aspera, qualia quæ valde tergent, quæque vel austera sunt, vel acerba, recognoscere oportet ea ipsa non omni vlceri descripta, sed ei quod sordidum sit & contumax, atque humore diffluat. In quo acrimoniam retundi & asperitatem sorde multa & sanie deliniri contingit, non aliter quam illa ceratis & oleis molliri solent. Atque omninò separandum genus hoc pharmacorum ab altero quod pura impleat. Eadè ratione in vlceratis

*Lithargyrus.*  
*Ærugo.*

*Animadu-*  
*er.*

vlceratis oculis, multum lachrymantibus & sordidis, paulò acriora sarcotica imperamus, quia intelligamus forde & lachrymis vim pharmacorum dilui. In genere æruginis, factitia est chrysocolla ex vrina pueri impubis. Versatur hæc in mortario, pistilloque æneo, quæ è molli ære & cupro conflata sint, sal purissimus vehementer tritus, aut nitrum cōiungitur vrinæ. Similiter ex æruginē Cypria, vel quæ è cupro deraferis, diutissimè trita, circūacta iisdem mortario, pistillo & vrina. *Borax.* Borax aurificum niueo candore, quodque capistrum vocant, eodē modo teritur, & in mortario cum vrina circumagitur, deinde omnia tinguntur glasto, aut eo puluere glasti, qui iam è Narbonēsi Gallia marsupiiis importatur. Is emitur magno, communi nomine cū cobaphico pastellū vocant, inficitque, colore purpureo ad violā inclinante. Sic intinctus Borax ceruleo splēdet, aut si plus glasti cōbibit, purpureo. Est & *vsstolex.* *vsstolex* barbaro nomine, ex aluminis, salis ana parte vna, aceti acerrimi partib. duab. tritis vt pri<sup>9</sup>, dum ceruleum colorem trahāt. Alij aceti loco, vrina illa vti malunt, à qua nō longè abest Scolæcia *Aerugo scolæcia.* *Aerugo scolæcia* ærugo veterū, maximè Diosc. hæc omnia acri sunt natura, eodē modo vsurpanda, quo ærugo & acria metallica cremātur, eluūtur, tēperātur aliis. Quod sequitur, anodynō est, sistit, incarnat, phagedenicis, rodentibus, cācerosis, tibiārū vlceribus medetur, *Adphagedenicis tibiārū.* *Adphagedenicis tibiārū* ʒ. litharg. ʒ. 6. olei myrtei, & fucci hyoscyami ana lib. i. coquatur omnia expirante succo, dū sit mellis crassitudo. Seorsum autē coquito, cerusæ lib. ss. in olei rosacei & fucci plātag. ana lib. semiss. ita cocta metallica misceātur, leniter coquātur, versētur

# INSTIT. CHIRURGIC.

*Theriaca.*

*Virtus cephalicorum.  
De compositione cephalicorum.*

spatha, postremo, summotis igne, insperge mastice, lib. semis. vniantur probè & plûbea pyxide reponantur. Ad eadè vlcera tibiârû. litharg. libr. ß subtilissimè teratur, versetur affuso vino, succo plantaginis, vel alio liquore, qui per se conueniat, ex quo coquito cum ol. rosacei, adipis caprilli an. lib. ß. coctis ad iustum corpus addes mastiches libr. semiss. subductis igne, & leuiter refrigeratis, vitellos quin què ouorû immiscebis. Theriaca efficacissimè purgat, incarnat, cicatricem ducit. In sarcoticis censentur cephalica, quæ primùm quidè caluariæ medentur, deinde reliqua ossa carne contegunt, postremò duras carnes restituunt. Duorû ferè sunt generum. Alia enim κεφαλικά, quæ peculiariter caluariam incarnant, quædam καταγματικά quæ reliqua ossibus fractis adhibentur, verû vtriusque nomen & ratio interim permiscetur. Cephalica catagmaticis acriora sunt, squamas ossium detrahunt, foras euocant quæ in alto latent, vtraque tergent, digerunt & siccant. Multa catagmaticis & cephalicis acrimetalla cõmiscentur, sed præcipuè vbi ramentum ossis reuellendum, & humor viscidus longiùs trahendus. Ac nudatis ossibus incarnandis, arida inspergantur. Pinguia enim & quæ ἐμμοτα vocant, quia inuncta linamentis adhibentur, nudatis ossibus nocent. Miscetur ferè cephalicis quod leniter adstringat. Ad hoc nisi eò vsq; viceris tritura, vt in tenuissimum pollinè abeat, tardabit potius reliqua, quâ incitet. Cõtra tenuissimè leuigatû reprimet quod influat, efficiet quæ, vt vis tergatû altius penetret. In vulneribus ossium, sed præcipuè capitis, non statim ad incarnationem (συσσώρισις appellat) veniendum

niendum, sed explorandum prius, an omnia tuta sint, num quid contusum quod suppurare prius, ac deinde purgare & siccare oporteat. Videndū quoque prius est, ne qua parte syderatum aut corruptū os liueat, vel cariem trahat, eliminandum enim inuendum, excidendum, ac omnino repurgandum est. Hæc autem cura multò maximè suscipi debet in caluariæ fracturis quæ altiùs procedunt. Itaque tū demum cephalicis vtendū, quum pura omnia carere periculo videbūtur. Atque vbi succrescit caro (succrescit autem facillimè), & os suo corpore leuiter integetur, cephalica tēperabis oleo, cerato, aliisq̃ue generis eiusdem. Cerati modum definiē, natura partis, qualitas vitij, & medicamenti. In calloso vlcere, par medicamentum pari cerato misceri potest. In aliis ceratū duplū, triplum & quadruplum esse consuevit. Parantur cephalica ex iride Illyrica vel florentina, alioqui pumila, dēsa quęquę sit frāgenti cōtumax, subruſso colore, gultu amaro, odore per quā sincero. Parantur quoque ex orobi, cicerum & lupinorum farina manna, aristolochia, gentiana, bryonię & panacis heraclij radice, magis etiā eius cortice. Opopanax autē calidior est. In summa cephalicorum materia deterget, siccet, & nō rodit. Nam acra miscentur, non quia sarcotica, sed vt testulas ossium è profundo trahant. Cephalicum Cathagetzæ, quod tollit squamas, ossa corrupta detrahit, & caua implet. ℞. iridis, radice panacis vel caparis ana ℥. i. aristolochiæ rotundę, mannę ana semunc. trita & traiecta cribro resparguntur, vel mista melle inserūtur cauo. Aliud acrius Xenocratis. ℞. farine orobi ℥. i. iridis sesquunc. mannę, aristoloch.

Cautio.

Cerati modus ad cephalica.

Materia cephalicorum.

Cathagetzæ.

# INSTIT. CHIRVRGIC.

*E silphio.*

loch. rotundæ squamæ ana ʒ. ʒ. tritis vitior, & cum melle. Sunt qui addant radicem bryoniæ, & aliter parent. Aliud è Silphio, quod si desit, vtere benguino, rescindit callos, purgat, tabefacit membranas, vt sponte sua decendant, & caua implet. Resinæ pini siccæ sesquunc. pumicis torrefacti extrin-  
cti vino iridis. aristoloch. silphij ana ʒ. 1. thuris semunc. squamæ æris ʒ. 2. alias quatuor, arida & in melle vsui sunt. E Serapiade Satyrij tritesticularis,

*E serapiade.*

iridis marrubij ana vnc. 1. farinæ orobi vel lupinorum ʒ. 10. aristoloch. ʒ. 15. sicco & ex melle vitior, squamas elicit, valde siccât, incarnat. Huic generi Satyrij quod serapias & triorchis vocatur, hæc insunt, quod in pollinem radice trita, contumacia & putrilaginosa siccât & repurgat, herpes sanat, discurit oedemata. Triphonis quod aufert squamas.

*Satyrium.*

Corticis pini squamæ pumicis vsi ana sesquunc. mannæ thuris aristoloch. iridis, resinæ pini ana ʒ. 1. myrrh. aloës an. semunc. vtere vt prius. Athenæus pro cortice pini habet gallæ ʒ. 1. Quod sequitur, Deleontis est diuurno egrè cerabili, & calloso vlceri medetur, ossa corrupta rapit. Squamæ, mannæ, thuris resinæ siccæ ana ʒ. 2. aceti quantum sufficit. Squama ex aceto læuigatur, thus & manna tenuissime trita immiscentur similiter & resina pastilli fiunt, qui in vmbra resiccantur. In callosis, pari cerato rosaceo. in aliis triplo vel quadruplo temperantur. Melanchloron Triphonis ad eadem. Squamæ sesquunc. mannæ, thuris, ammoniaci, resinæ pini siccæ, seui vitulini bene curati, terebinthinæ ana vnc. 2. ceræ, olei ana vnc. quatuor, aceti vnc. 10. confice vt prius. Plura capite de vitiis ossium

sium secundo, quarto & quinto de compositione  
 pharmacorum *Trigener.* Trigener, Cera, Colopho-  
 nia, terebinthina pari pondere colliquantur, refri-  
 gerata immerguntur frigida, diuque manibus vo-  
 luntantur, nuda ossa capitis incarnat, squamas deducit,  
 & cicatricem facit. Sed hic aliquid epulotici  
 commiscebis. Admirandum est è mastiche pariter  
 mista in ossium fracturis. *Iudæi.* Colophoniz li. 1.  
 mastich.  $\frac{3}{4}$ . 1. olei sesquuncia, liquata & infrigida  
 pista sine linamento vlceri interponuntur, purgat  
 hoc pharmacum, & carne implet, sed non claudit  
 cicatrice, nisi quid ex epuloticis immisceas. Opti-  
 mè incarnat, farinæ pistinalis vnc. 2. colophoniz  
 valde tritæ vnc. 1. arido cauum impletur. *Galenus.*  
 Cerae sesquunc. ol. lib. dimid. liquefactis adde thuris  
 iridis, aristolochiz ana drachm. 2. æruginis drach.  
 1. Aliud Radicis anchusæ vnc. 2. aloes vnc. 4. vtere  
 arido. Hactenus experimenta veterum, nunc ad  
 recentiorum sarcotica transeamus. Aureum Mesue *Aureus Mes.*  
 ita describunt. Cerae vnc. 5. resinæ vnc. 3. terebinth.  
 lib. 1. mell. sesquunciam, mastichis, thuris, sarcocol-  
 læ, myrrh. aloes, croci ana drachm. 1. fiat vnguen-  
 tum. Aliter Mesuæ & alij, ceræ citrinæ  $\frac{3}{4}$ . 6. ol. bo-  
 ni lib. 2. &  $\beta$ . terebinthinæ vnc. 2. resinæ, Colopho-  
 niz ana sesquunciam, olibani, mastichis, ana vnc.  
 1. croci drach. 1. Vtrunque sarcoticon est, & mol-  
 liora corpora conglutinat, cera in eo liquanda est,  
 liquata resina, Colophonia, & terebinthina con-  
 fundenda, depositis ab igne olibanum & masti-  
 che insperguntur, postremò crocus in puluerem  
 tritus immiscetur. Fuscum Nicolai & croceum *Fuscum & croceum.*  
 multa habent vnde emolliant & concoquant.

Vnguentum



## INSTIT. CHIRURGIC.

Vnguentum paruum Cerafeos, Gratia dei, emplā-  
 strum de Ianna multa habent vnde purgent & car-  
 nem gignant. Tetrapharmacū dolorem lenit, ma-  
 turat phlegmortem, putredinem augere potest, sic-  
 care verò & expurgare nō potest. Galenus locis a-  
 liquot Theſſalum & Theſſalios reprehendit, qui te-  
 trapharmaco vt ſiccante, purgante, & incarnante,  
 vteretur. Quod ſi tū iure reprehenum fuit, in eā-  
 dem cauſam incidunt, non modo recentiores me-  
 dici, ſed inter Gręcos Actuarius, qui iam à vetere  
 illa Gręcia degeneraſſe, & Arabū familiis conſen-  
 ſiſſe viſus eſt, inter Latinos Scribonius. Vterque e-  
 nim vim incarnadi tetrapharmaco tribuit. Sed nō  
 ita abſurdū videtur nobis tetrapharmaco vim ge-  
 nerandę carnis eos aſſignaſſe, parte nō admodum  
 ſicca, ſi modò eſt ſicca pice, Colophonia arida, adi-  
 petaurino, & cera non ita pingui confecerint, &  
 in vſu, roſaceo, myrteo, maſtichino diſſoluerint.  
 Omnia vlcera perſanat illud. ℞. artemiſiæ, ſcabi-  
 ſæ, abſynthij, ormini, ſenecionis, tamarifci, apij, ver-  
 benæ, pilofellæ, lanceolę, pimpinellę linguę canis,  
 millefolij, chelidonię ana M. i. ex omnibus, reiectis  
 radicibus, exprimatur ſuccus, cui adde veteris axūg.  
 lib. 2. ſepi hircini lib. i. olei lib. 2. mellis ℥. 3. medio-  
 criter bulliant, deinde in mortario piſta vniantur.  
 Diaireos. Sepi vaccini lib. ſ. olei roſ. ℥. 3. cerę ℥. 2.  
 radicis ireos ℥. vnā. thuris, ſarcocollæ, maſtiche,  
 aloës, ariſtolochiæ ana drachmas duas, cum tere-  
 binth. ℥. 3. fit vnguentum. Puluis Rhazæ. ℞. oliba-  
 ni, aloës, ſarcocollæ, ſanguinis draconis, radicis i-  
 reos ana. Eodem modo cum maſtiche. farina oro-  
 bi, ſœnugręci, cicerū, lupinorum, thure & aliis ſar-  
 coticos

*Actuarius.*

*Scribonius.*

*Diaireos.*

*Puluis.*

*Rhazæ.*

eoticos pulueres confinges, quos subtilissimè tere-  
 re oportet, ne asperitate lædant. Itaq; materia run-  
 ditur in pila, tenui cribro secernitur, postea molli-  
 tur, ac deinde tenuius cribratur, quicquid nō trans-  
 meat, repetitur in pilā, ac tandiu conteritur, dū ad  
 extremū pollinē deueniat. Alia sarcotica per se in-  
 duntur cauo, vel penicillo vulnerario carpta impo-  
 nuntur, in fistulas immittūtur clysterio, sed diluta,  
 ab his thorulus mollis vino madēs superdatur. Vi-  
 num sit è dulci austeriusculum, postremò omnia  
 cōmodè alligantur. Æstate bis, hyeme semel in die  
 commutantur, sæpius etiam, si quid phlegmones,  
 doloris, aut casus generis eiusdē intercefferit. Lin-  
 tei lanugo bene munda, impacta vlceri sæpè suffi-  
 cit. Liquida verò quę in fistula danda sunt, ex in-  
 cidentibus, mollientibus, & incarnantibus ferè cō-  
 parantur, quale est in decocto centaurij, marrubij,  
 apij, absynthij, ligni sancti, aristolochię, ireos, al-  
 thęæ, maluę, ficuum, passularū, tragacanthę, in li-  
 xiuio, lotura calcis & acris metallici, aqua vitę, sar-  
 cotici pulueres respergūtur, qualia sunt, radicis al-  
 thęæ, exempto neruo ℥. i. ficus duę, cętaurij, mar-  
 rubij, absynthij ana pug. i. fiat decoctio, in decocto  
 ℥. 4. disperge pulueris ireos, mastiches, aloës, sarco-  
 collę ana ℥. i. Sunt qui aliquid mellis rosacci, vel  
 myrtei commisceant. Aliud. ℥. vini albi odoriferi  
 ℥. 7. aquę vitę optimę ℥. 3. myrrh. aloes, sarco-  
 collę ana ℥. 2. thuris ℥. 3. seminis hyperici, centaurij, mil-  
 lefolij, verbenę, linguę canis, vtriūsq; cōsolide an.  
 pug. i. leniter bulliāt in vino herbę & semina de-  
 de exprimantur, affundatur aqua vitę, reliqua trita  
 misceantur. Fistulę os obstipetur medicamento

Lanugo lin-  
 tei.  
 In fistula.

# INSTIT. CHIRVRGIC.

ex acriuscula materia, vt ostreorum cinere, & axungia vetere, vt incidat, molliat, discutiat.

*De Epuloticis. CAP. 4.*

*Natura Epulotici.*

*Improprie dicitur epuloticus.*

*Verus pompholyx.*

*Cadmia.*

*Spodios.*

*Cerusa.*

**P**Lenum vlcus clauditur cicatrice. Epuloticon siccatur (sed citra morsum) atque hinc reprimat, carnem resiccatur, cogit, & cute operit, aut certè callo tenui, qui cuti similis est. Ex quo siccare magis necesse est, quàm quod vel carnem gignit, vel glutinat. At cicatrix non aliter quàm caro, naturæ opus est. Aliud verò genus quod licentia epuloticò appellant, quia excrecentem carnem reprimat, acri natura & iam mordaci. Addunt & tertium genus, quod siccatur quidem, sed non adstringit. Cicatricem ducunt. Pompholyx, cadmia, cerusa, plumbum, ostrea vsta & elota (ac pompholyx quidem lotus & cinis eius in iis quæ citra morsum siccant) præstantissima sunt. Verus pompholyx efflari potest, colore parum candido atque liuescente, iniectus carbonibus auream flammam edit, is iam olim Aetij memoria parum frequens erat, ac sæpius adulterabatur. E fornacibus ærariis facile parari potest, vbi tum flamma, tum vapor æris, testudinem elambit. Pinguis enim, candicans & tenuis fauilla inde exarsa pompholyx est. Qui verò pompholyx crustaceus conuexo quasi dorso asperior, & parte caualenis est, colore modò nigro, modò cinericio, ad cadmiæ genus potius referri debet. Spodios, quam vertunt cinerulam, è solo atque pavimentis fornacum æris euertitur. Cerusa plurimis locis Galliæ conficitur. Venetiis importatur quæ ferè candore vincit, ad cicatricem nihil fortasse melior est. Recrementum plumbi vstum, ac sæpius elotum, terra figillata,

figillata, bolus armenius, lapis hæmatites, antispodia benè lota, acribus fluxionibus & teneris corporibus omnia instituēda sunt. Asperiora sunt, galla, myrrha, malicoriū, alumen. æris squama, chalcitis, misy. ærugo, vitrioli genera vsta & elota. Et (quod in his præitātissimum est) crematum æs & elotum.

*Fortiora  
epulotica.*

Metallis acribus excrescens caro consumitur, vstis tantum vel elotis, aut utroque modo maceratis trahitur cicatrix. Sed solum vsta, lotis etiā acriora sūt.

*Preparatio  
metallorum.*

Vruntur ea fictilibus crudis, dum percocta vasa sint, extinguuntur vino, tunduntur in mortario affusa pluuia, mox siccantur, cribrantur rariore seta, in mortarium aliquoties reperuntur, ne quid vel arenosum, vel scabrum reliquum fiat. Abluuntur sæpius & torrentur, ea ratione quæ partim ex Dioscoride, partim ex Arabum commentariis petenda sit.

Tertiò aliquando & quartò retorrentur, lauantur, in pilam reuocantur, ut ea cura melius mitescant.

In vlceribus quæ egrè, vixque cicatricem ducūt, tandiu elaborare metallica nō oportet. In his enim semel cremata, semel vino vel pluuia extincta, vsurpanda sunt. In callosis, aqua maris vel aceto extinguere melius est. Si sanies acris est, immergātur lacte, tenuissimo liquore oui, rhodostagmate, vinum subausterum conuenit, siquidem copiosus humor allabitur. Atque hoc lauandis metallicis præferri debet, quod annis & qualitate medium est, inutile recens, quodque ætate, vel mordax, vel fugax & languidum est. Aqua etiā in calore vtilis est. Nec alia ratio in lotura seruari debet. Atque ea arte tum v-

*In quibus ex-  
tingui laua-  
rique conue-  
niat.*

stura, tum loturæ eodem medicamento excrescentem carnem adimes, cicatricem mollibus, duris-

que

# INSTIT. CHIRURG.

*Squama.*

*Aes vstum.*

quæ corporibus informabis. Malignis idonea sunt. sarcocolla, ichthyocolla, chrysocolla, quæ cruda, admodum acris est, nisi sanie ulceris & sorde diluatur, plumbum vitum, crematum itibiū, plumbi recrementū, squama ferri & stomomatis. Aëris squama præterquam quod siccat, etiam deterget, & pura ulcera efficit, quod reliqua squamarum genera non præstant. Aes vitum carnem exedit, vitum & leniter elotum duris corporibus epuloticon est. Poterit autem vrendo sæpius & lauando ita macerari, vt etiam molli naturæ cōueniat. Leniore metallica, pompholyx, spodium, plumbum, atque inde purgamentum minus obtundi debent. Cerusa non eget vstura, & lotura satis temperatur. Extergent, æs, æris, squama, itibium, cadmia, vitrioli genera vsta lota quæ acrimoniam deponunt, alstringēdi vim ad cicatricem retinent. Eodem modo calce, ostreis, buccinorum cauis & purpurarum, limacum testis atque testudinū, erinacei spiculis, calculis marinis & silicibus, vstis omnibus & elotis vtēdum est. Ac breuiter quæ in sarcoticis efficacius siccat, ad creandam cicatricem transferri possunt. Omnia in cinerem trita specilli nucleo capiātur, & ita inspergatur plano. Quæ in cerato myrteo adhibētur, leuiora fiunt. Acris verò excepta cera impingi possunt. Cera sequaci vti conueniet, alioquin ad ignem ē myrteo pista mollienda est, quale hoc est. ℞. ceræ 3. 4. manibus myrteo tinctis ad ignem molliantur. & cum æris vsti, squamæ æris, & æruginis ana 3. 3. fiat platysma. Sed hoc & alia id genus malignis & contumacibus imperanda sunt. Ac ferè duplici ratione epulotica vsurpatur, quia alia in farinā trita insper-

insperguntur, κατὰ πάσματα & ἐπιπάσματα Græci vocant, alij ξυρά και ξύρα και ἐππασα. Alia verò ἐμπλαστῶν firmo corpore ac tenacius hærente. Addunt alij & ἑμμεῖα mollioribus naturis, locis dolētibus aut inflāmatīs, quæ liquatis emplasticis confinguntur. Itaque vbi ægrius trahitur cicatrix, emplastica meliora sunt, quia diutius inherēt, quod vim & celeritatem cicatricis adiuuat. Vlcus humidius aridis iuuatur. Molliora corpora linamento gaudent. Suauiora ferè nec tam aspera, quæ vel emplastri forma, vel in linamentis adhibentur. Recens enata caro, neque acrimonia rodi, neque astrictione irritari debet. Corpus ferè accipiunt à cera quæ pinguis sit, vel natura sua, vel quia remollita oleo. Olea conueniunt contrahente natura, myrtinū, fraxininū, melinū, terebinthinū, lentiscinum, mastichinum, rosaceum, omphacinum, vel in quo oleæ germina, cymæ rubi, cauliculi vlmī, salicis, & similibus præcoxerint. Quale si desit, ad ea quæ ficiant, decurrendū erit. Tale vetus est, & recens quidem, sed quod diu efferbuerit. Siccāt & alia, raphaninum, sycionium, ricininum, quæque vehemēter discutiunt. Iisdē generibus olei, crassiora pharmaca ad linamentum diluuntur. Quanquam in malignis non oleo, non aqua vtēdum erit, neq; per se, neque cum aliis, sed larigna vel terebinthina mollietur cera, in qua epulotica concipias. Olei modus est ad ceram, vt sit decuplum, vel duodecuplū, copiosius tamen esse potest & parcius, vt cera mollis est & dura, vt sunt corpora dura & mollia, vt denique vlcera, vel facilè vel ægrè cicatricē trahunt, labris tumentibus & callosis hæc addūtur ceræ, larigna

Vnde corpus  
epulotica,

Modus olei  
in mollienda  
cera.

In callosis  
labris.

## INSTIT. GHIRVAGIC.

gna, terebinthina. lanarum sordes, medulla cerui & vituli. Quæ cónexa non solum emolliunt, sed præterea efficiunt, vt diutiùs hæreat pharmacû. & tardius exarescat. Prouidendum autê, ne quod tenellæ carni pharmacum incûbit. ariditate scabrescat, ex quo irritet locum, & ante tēpus decidat. Ac diutiùs hædere bonû est, ex quo tertio primûm die, vel eo tardius absolui debet. Elarigna & dupla cera ceratum confici potest. Minor sit medullæ modus & cœsygi, quam resinæ. Metallica quadruplo & sextuplo cerato capiuntur, In epulotico Zenonis, quod à Galeno descriptû est, vicesima pars galbani, molliendo scilicet, metallicis permista est. Verûm præstabit callosa labra circulari malagmate circûscribi mediâ verò carnem, cui cicatrix creanda est, epulotico induci. Alioqui platysma fingatur, quod malacticon sit, qua parte labra contingit, reliqua verò epulotico pharmaco illinatur. Sed in callosis labris si nihil malacticis efficies, ad ea quæ ἐκτρωτικά inde appellant, veniendum. Extrema auxilia sunt ferramenta quæ excidant, & linû vsurpatum Hippocrati. Flaccidis carnibus balauitia, alumen vstû, quæque similiter contrahunt, affatim insperguntur. Verûm liberalius iniici oportet, vbi caro detrahenda est, parcius & in subtilissimum puluerem conleuata, atq; acie cultelli capta, vbi cicatrice caro tegenda est. In calloso stupidique sensus corpore, si neque pletora est, neque cacochymia, acrioribus (idque matutino magis) ad cicatricem vti licet. In aliis vlceribus, quæ leniant ideò miscentur, vt acrimoniam retundant. Ac iam progressa carne & cicatricem trahente, oleum, adipem, resinam, ceram aliâque

*Modus eorû  
quæ epuloti-  
cum compo-  
nunt.*

*In flaccidis  
carnibus.*

aliâq; id genus coniungit Hippocrates, vt decora-  
 lenis, non scabra durâque cicatrix inducatur, idq;  
 hyeme magis quàm Æstate. Quæ molliora corpo-  
 ra colliquant, durioribus cicatricem trahunt. Rur-  
 sus quæ his carnem regenerant, mollioribus ferè e-  
 pulotica sunt, & acria rosaceo cerato fracta, cicatri-  
 cem claudunt. Quôdque antè dictum est, tam pos-  
 sunt mansuescere lotura, quâ suavis est cerusa. *Quomodo e*  
 E sar- *sarcoticis sunt*  
 coticis scordio, carie lignorum, cortice radice cap- *epulotica.*  
 paris, irionis semine, iri, acoro, artemisia, dracunculi  
 radice, aristolochia, cypero, gentiana, & aliis epulo-  
 tica finguntur, mista astringenti materia, sed & ea  
 myrteo cerato capta, epulotica sunt. Acriora quo-  
 que, vt calx viua, arrhenicon, ærugo, molliorib, sar-  
 coticis ad cicatricem temperantur. Eodem modo  
 alumen quod nimium astringit, sed hæc omnia pro-  
 positis exēplis declarantur. Manna, thus, leuia sar-  
 cotica sunt calx acrior, nec sine acrimonia squama  
 est. Ex his fit aridū Spodorides Asclepiadis, quod  
 conuenit vlceribus, quæ vix cicatricē trahunt. Cal-  
 cis viuæ 3. 6. manne, thuris, squamæ ana 3. 4. vel (vt  
 Heliodorus) calcis viuæ, mannæ, thuris, ana 3. 1.  
 squamæ semunc. Al. Ireos, manne ana 3. 2. recre-  
 menti æris, squamæ ana 3. 4. Nomæ & putredines  
 nisi vehementissimis, acribusque pharmacis ægrè  
 curantur. Qualia sunt, Sulphuris viui, auripigm.  
 squamæ ana 3. 2. æris vsti 3. 1. Al. Sādarachē semun-  
 cia, aluminis, myrrh. crocomagmatis, ireos ana se-  
 muncia cyperi 3. 4. tritis vttere. Fit autem croco-  
 magna è croci drach. centum, myrrhæ, amyli, rosa-  
 rum, gummi ana 3. 50. Siccant, nec ita stringunt,  
 myrrha, sarcocolla, argenti spuma, ostrea, diphry-  
 ges,



## DE MORB. INTERNIS

ges, ærugo, & alia quædam metallica. Spodios factitia (quod antispodion vocant) in epuloticis cēsetur. Cyperi radix in nimio humore cicatricē trahit. Cucurbita sicca, vīta, humidis præputij vlceribus, nec adeò malignis vtilis est. Ad eadem inueterata, anethi radix vīta inspergitur. Abrotoni radix

*Cyperus.*  
*Anethi radix*  
*& abrotani.*

*Amylum.*

eadem maligna iuuat. Amylum per se tritum, & cum tantillo aluminis, eisdem vlceribus prodest.

*Lithargyrus.*

Lithargyrus duplo rosaceo vel myrteo coquitur, ac ne efferuescat, paulatim affusa rosacea refringitur, vbi non inquinat, in eadem aqua subigitur, omnia versantur mortario, rebellia curat & humida, loco rosaceæ licebit vti aqua rhois (sumachū appellant) cornorum, spinorum (quæ prunella vocant) quāto coquetur diutius, tantò siccabit magis. Hordeum combustum Chironiis inspergitur, & quod

*Hordeum est*  
*inde διὰ κρι-*  
*θωμ.*

inde conficitur διὰ κριθωμ, serpentia. Chironia, & quæcūque tardius cicatricem ducūt, per sanat. ℞. hordei cremati ʒ. 10. ærug. ʒ. 50. ceræ ʒ. 1. olei mastichini ʒ. 9. ærugo ex oleo teritur, cera seorsum liquata coniungitur, leniter coquuntur, refrigeratis hordeum in mortario permiscetur. In summa quæ leniter siccant & astringunt, mollibus corporibus & benignis vlceribus cōueniunt, durioribus naturis, nec ita māsuetis vitiis, paulò validiora auxilio sūt.

In vlceribus quæ pertinaciùs repugnent, ad metallica acria vīta veniendum. In malignis, Chironiis & alioqui desperatis, crudis metallicis & acribus vtendum erit, vbi si nec his quicquam efficitur, ferro & igne opus est. In dysepulotis fugienda μαλ-

*Vitanda in*  
*dysepulotis.*

γανώδη mollia medicamenra, deinde malactica, adeps suillus, oleum, cera, resina, ammoniacum, & similia,

similia, fugienda acria, piper, sinapi, sed præcipuè vbi plethora, vel cacochymia. Adhæc quæ humectât, vt aqua, quanquam non ignorandum ea omnia interim commisceri, verùm alia ratione, quàm vt cicatrice claudant. In Pamphilio Asclepiadis, metallica coquuntur hydrelæo, ex aqua interuntur, si sanies acrior, si quid phlegmonis, si molle corpus est. In albis epuloticis miscetur aqua, vt lithargyrus celerius eliquescat. Verùm eò vsq; coquuntur phar- *An aqua recipiatur in epuloticis.* maca, dum tota aqua exhalauerit, atque ita nihilo ferè humidius medicamentum est. Acria discutiunt, & contumacius vitium magis edomant, mala&rica acrimoniam temperant & molliunt callos. Quòd si omnibus ritè institutis quæ ad topica remedia pertinent, nihilo magis cicatrix inducitur, aut si iâ opertum, clausumque vlcus rescinditur, longiùs requirenda causa est. Ac ferè cicatricem tardant plethora & cacochymia. Copia phlebotomo deple- *Vnde difficilis cicatrix.* da est, vitiosus succus pharmaco purgari debet. Quòd si vtrunque coit, neque in sola copia humorum, sed & in qualitate vitium est, primùm quidè phlebotomo, deinde purgante pharmaco leuare corpus necesse est. Sed è varice vitiosa materia vlceri illabi potest. Vbi nõ modò difficilis, sed etiam plena periculi cura est. Secatur vena, purgatur corpus eo cathartico, quod melancholicum succum vna & pituitam ducat, iusta vitæ ratio decernitur. Quibus si parum efficitur, emulgetur varix, ac mediùs præciditur. Designâda priùs vena est, attramèto notatur, aut rubrica, sed ea parte præcipuè, quæ proximè radicem spectat. Hic cultello nudatur cutis, caro inciditur, molliter distinguuntur fibræ, atq;

## INSTIT. CHIRURGIC.

his omninò vulnerata caro explicatur, vbi specillo buxæ, vel eburneo vti cōuenit. Ac iam nudo vasi culter lenis summittendus est, vt ab inferiore carne diuulsis fibris, varix absoluator, hic vossella venaprehenditur, eleuatur hamo, inferiori parte funiculo religatur, quem acus cōuehat, supra funiculum phlebotomo pertūdatur, vt reddat sanguinē, quantum sit opus. Ex quo supra vulnus immissa acu, vt prius quæ filum ducat, præstringitur, hic iam vinculum inferius distringendum, attollendum membrum est; & sursum adducta manu, qua venæ membri decurrunt, & per factum vulnus sanguis exprimitur; ita paulatim emulgetur varix. Laxatū filum rursus obligatur, & media vena præciditur, qua parte vtrinque funiculo illaqueata est. Postremò iusta ratione, suòque tempore noua plaga sananda est. Quanquā aliquando contingit, vt iam curato veteri vlcere, maneat incurabile, quod ad varicem est, nouo vitio subinde affluente. Aliis vtròque vlcere perfanato melancholia commota est. Atque vtrèque casus reuocato subinde phlebotomo, sæpius purgato corpore iusta vitæ lege declinari potest. Hippocrates rudiùs, sed melius fortasse, varicem, siue is sit euident, siue in carne teneatur, multis locis compungit, vbi oportunū videatur, ac sanguinē nigrum exhaurit. Prohibet autem, vt ne vicina loca quæ eodē vitio nigricāt scalpro exasperentur vulnere illato, quod ægerrimè postea percurētur. Quòd si ab hepate, liene, aut alia parte corporis ducta coluue in perpetua sorde vlcus est, necessarium parti remediū adhibebis. Ac vomica interior nōnunquā agit cuniculos, qui in exteri⁹ corp⁹ desināt, vbi ferè  
sed

*A partibus  
corporis tar-  
dis cicatrix.*

sed multò magis prouectis annis, desperatio est. Et ab vlceribus externis in latera initio ducuntur sinus qui etiamsi lateant, produnrur tamen, cum multo plus sordium colligitur quam ferat ratio & magnitudo vlceris, & pus aliud est, quam natura partis genere consuevit, serosius scilicet aut crassius quum deniq; qua parte subest cuniculus, aut scabrior, aut pallidior, durior aut mollior cutis est. At specillo argenteo, vel cereo res tètari potest, vbi vel cauterio vel ferramento cuitas detegenda est, nisi vel profundior descendat, vel grauior casus à ferro & cauteriis metuatur. Sæpe etiã in vetusto vlcere, quod quæ fracturæ coniunctum fuit, os subiectum parte aliqua syderatum, luridum, cariosum, coalescit. Itaque qua parte vitiosum os est, abradi scalprio, & cauterio inuri debet malè cõpactum rescisso callo ad curam de integro reuocandum est. Reliquæ fissuræ sedulo compingendæ, & ramenta naturę detrahenda, si qua resisterint. Instauranda quoque vlcerum natura & vicinæ carnis, quæ nonnunquam eo vsque corrupta est, vt vel frugi materiã alimèti possit corrumpere, vt iam vicina liueant, nigra sint vlcera, modò vieta, modò callosa, cancrosa, putrida, vermiculantia. Quædam igitur contrariis remediis depelluntur, alia ferro peramputanda, alia igne affligèda sunt, sanguisugis affixis scarificatu & corniculis exhaustiendum vitium est. Ac breuiter sum mouenda omnia, tum quæ cicatricem prohibent, tum quæ eandem factã refricāt. Legitima vitæ instituta præscribi debent, videndumque medico, ne quid vel peccetur ignorantia, vel negligentia omit tatur. Lithargyrus per se inspersa, attrita operit. E

Lithargyrus.

## INSTIT. CHIRVRGIC.

vino vel aceto teritur, siccaturq; ad cicatricē vlcerū, quæ multo humore madēt, elota mitissima est. Lithargyri vsus est in paruis vlceribus, in desquamata cute, & prurigine. In his enim leuiora remedia vsui sunt, sæpè etiā in subliquidis ceratis, quæ è myrteo, rosaceo, & aliis id genus confingas. Tenuis plūbi lamina plūbum vltum lotum, summo perè medetur cancris. Recremētū plūbi in æquali vino exactissimè leuigatur, affusoq; pari myrteo decoquitur, dum sit luti crassitudo, & aurium, nariumque vlceribus accōmodatur. Vlceribus sedis & narium, canaliculus è plumbo fingendus est, qui dehiscat foras, altera parte qua subit corpus, in leuem ac rotundum quasi vmbilicum desinat, atque hic centro suo angusto foramine pateat, qua videlicet liberū iter aëris teneatur. Vtero similiter & aliis locis corporis, quæ caua sint, conformari potest è figura partis. Cadmia cremata pluribus dieb. leuigatur, ex aceto quidem in malignis, in aliis vino, modò giluo, modo è dulci austeriusculo. Atque sic elaborata incarnat, & cicatrice claudit, Lapis (quē calaminarem vocāt) impetigines, herpetas, scabras prurigines per sanat, fictili crematur, vino extinguitur, & cadmiæ similiter elaboratur. Ladanū molle è vino vel salua pistum eleganter claudit, ea etiam quæ vix cicatricem ducant. Myrteo cerato duplo, triploq; iunctum, lene epuloticon est. Recens vnguinosum est, & per se liquefcit, myrteo exiguo interdum mistum. Aridum ætate infriari potest. Ex scoria & squama æris fictili crematis, extinctis vino ex eoq; diutissimè læuigatis, epulotica fiūt, quæ maligna iuuent. Medium quoddam genus efficies mista

*Plumbum.*

*In vlceribus  
sedis & na-  
rium cana-  
liculis.*

*Cadmia.*

*Ladanum.*

*Ad maligna.  
Ad media.*

mista lithargyro. In compositis auxiliis Galenus prætulit quæ è cadmia & ladano conficiuntur, quæ cum multa sint, & variè concinnentur, pauca ea-que paratu facilia describemus. Cerusæ cadmiæ ana ℥.4. ceræ, myrtini ana ℥.6. Al. Plumbi vsti ℥.3. cadmiæ, æris vsti an. ℥.2. Colophonix, olei myrtini ana ℔.2. vini antiqui odorati, quantum sufficit. Cadmia, vt prius, elaboratur, vsta, lota, diuque trita, præstabit quoque pharmacum, si reliqua duo metallica similiter comparentur, deinde Colophonia & oleo vna liquatis, sedulo misceantur. Eladano, quod prætumida vlcera labra imminuit, callosa mollit, implet caua, & cicatrice claudit. Picis aridæ ℔.1. & semunc. ærugini ℥.3. æris vsti ℥.2. spamæ rubræ ℥.2. & semiss. ladani ℥.9. litharg ℔.3. olei, vini optimi an. ℔.2. & semiss. hoc est ℥.30. Lithargyrus oleo coquitur, coctione media reliqua metallica immittuntur, volutantur rudæ, dum non inquinent, hic pix iniicitur, sublatis ac refrigercentibus ladanum è vino tritum coniungitur, omnia conficientur in mortario, hoc & reliqua medicamenta quæ siccent, & non mordeant, diutius coqui melius est. Adhibitum in platismate, maligna iuuat, nec ante quartum diem exolui debet. Alia generis eiusdem secundo & quarto de compositione medic. *¶* *γέρν.* Sunt & hæc epulotica & maligna curant. Æruginis, æris cremati ana ℥. di- mid. aluminis ℥.2. ceræ ℥.10. mitescit vsta ærugine, trita omnia capiuntur cera præmollita igne, vel cerato ex larignæ semuncia, & ceræ ℥.1. alioqui cerato myrteo vel rosaceo. Hoc vt optimo, in malignis Gal. vsus est, quod habet æris combusti, squamæ,

E ladano.

E metallica.

Galeni ad  
maligna.

## INSTIT. CHIRVRGIC.

æruginis an. 3. 3. trita omnia cæra pinguis 3. 4. ex-  
 cipienda sunt. Alioqui mollitur cera è myrteo, mo-  
 do in sole, modo igne. Ac ferè tripla cera est me-  
 tallicis, aut quadrupla, nonnunquam æqualis est,  
 cōstatq̃ue tanto fore acriora, quanto plus metalli,  
 cæra minus acceperint. Al. Squamæ, æruginis ana  
 3. 1. cæra pinguis 3. 6. larignæ semunc. iuncta om-  
 nia in platysmate adhibētur, quod vlceris locū, nec  
 eo ampliùs circūscribat. Munienda vicinia iis, quæ  
 phlegmonem arceant, tertio quoque vel quarto  
 die platysma reuellendum, hic austero vino fouen-  
 da pars est. & platysma, vt prius, apponendum. Re-  
 petuntur hæc dum cicatrix dulci incipiat. In callis  
 resinæ loco, vel cæsypo, vel medulla cerni præsta-  
 bit uti. Et hæc quidem è metallis, duris corpori-  
 bus & malignis vlceribus imperanda sunt. Plura  
 quarto de compositione pharm. *ἄλ γένν* Vapor è  
 pastillis acribus Andronis, Pasionis è cinabrio vul-  
 gari, aliisq̃ue id genus maligna iuuat, prius autem  
 hæc suis sordibus expurganda sunt. Leue est, ceru-  
 sæ lithargyri an 1b 1. olei myrtini 1b 2. cæra 1b 1b.  
 terebinth. 3. 3. aluminis 3. 1. piperis semuncia, vel  
 paulò minus, leuius erit. si sesquunciam thuris ad-  
 dideris *διὰ χρυσῶν* clementius, quam quod paulò  
 antè descriptum est. Singulariter facit ad ambusta.  
 Cerusæ 3. 5. al. 3. 6. & 3. 2. lithargy. 3. 5. hordei tosti  
 3. 15. al. 3. 5. (idq̃ue melius) cæra 3. 5. alij 3. 15. (sed  
 maior hic modus est) ol. rosacei vel myrtini 3. 15.  
 alij 3. 18. metallica è vino terito, ceram cum oleo  
 liquefacito, hordeum cribratum inspergito, omnia  
 coquito, excolato, in mortario conficito. In ambu-  
 stis, alba meliora sunt, quæ neque thus, neque resi-  
 nam

*Ambus*

nam accipiunt, in iis præcipuè, quæ aceto constant, piper additum cicatricem accelerat. Paratur facile, & mirabiliter iuuat. Aluminis vnc. dimi. in vini, aquæ pluuiæ vnc. 9. diluitur, linteolum vetus, sed bene mundum aqua inculcatur, hocque arefactum sole depectitur, & conceptum imponitur. In fedis, oris & genitalium inueteratis vitiis, vino uti melius est, aqua verò pluuiæ præferenda, quæ in cauis vlni vel quercus refederit. Al. Alumen nucis magnitudine teritur, & cum vnc. 3. mellis myrtei vel rosacei coquitur, aut fictili crematur ad eadem vitia. Aliud, in quo veterum & posterorum consensus est. Linteolum aqua illa vel vino madens, & expressum, molliter apprimendum plano, cui deinde pertenuem plumbi laminam induces & alligabis. Al. sine morfu siccat, & ægrè trahentibus cicatricem conuenit. Cerusæ 3. 2. gallar. <sup>E cerusæ.</sup> myrti, recremeti plumbi an. 3. 1. fiat puluis. Aliud. <sup>Album Gal.</sup> Lithar. cerusæ ana lib. 1. coquantur in ol. albi lib. 2. aquæ purissimæ selibra, dum exhalauerit aqua, & purum pharmacum constiterit, purus sit ignis, & serenus aer, ubi medicamentum incoquitur, liquatis & ita coctis, adde terebinth. vel (si rebelles vlceres est) larignæ vnc. 2. vel vnc. 3. ceræ albæ 3. quatuor, vel 3. 6. Nam ut augetur resinæ modus, ita cera augenda est. Postea verò quàm omnia coierint, adde thuris semunciam, pompholygis, ostreorum, cadmiæ ana vnc. 1. hæc in cinerem vsta lauantur aqua, si sanies acris est. marina verò, vel aceto, si labra vlceris in callum extuberant. Inopia marinæ, subdolum saleæ aqua diffundes. Quod si multus humor affluit, vino albo pellucido leuiter astringete.   
metallica



# INSTIT. CHIRURGIC.

metallica lauabis. Miscentur autem his, cadmia, pompholyx, cerusa, lithargyrus, ostrea, buccinorū inuolucra, os sepia, calx & similia, quia præterquā quòd epulotica sint, album colorem iuuant, qualia fingi voluit antiquitas. Calx septies lota, è rosaceo vel aqua diluitur, exponitur soli æstu medio, subinde reuoluitur, teritur, abluitur, cum iam satis lota tritaque exaruit, è rosaceo pinsitur, imponitur, cicatricem ducit, vlcera neruorum maligna iuuat, & ambustis auxilio est. Sordes quæ in ampullis lucernariis subsidet, vlcera quæ mediis digitis excitantur, alopecias quoque adiuuat. *διὰ χαλκίτιος* ex austero, rubroque vino subigitur, deinde emollitur oleo melino vel myrteo, rosaceo etiam, si quis rubor calorque in oris vlceris existit, alioqui crassius in platysmate inducitur, vt vicina comprehendat, qua videlicet metus est, ne quid humoris affluat.

*Album  
Actuarij.*

Album Actuarij capite de repellētibus descriptū, epuloticon est, vt quæ emplastra alba è cerusa fingunt, quale hoc est non ablimile albo Galeni. Ceræ vnc. 4. rosacei lib. semiss. terebinth. vnc. 3. cerusæ 3. 2. lithar. 3. 1. thuris, cineris ex cochleis crematis ana semunc. cera, oleum, terebinth. simul funduntur, reliqua miscentur, versantur omnia, & in mortario vniuntur. Aliud leuius. ℥. cerusæ 3. 1. lith. 3. 2. aque rosarum sesquunc. rosacei lib. 1. metallica trita in mortario fortiter perfricatur pistillo duro, quod cum fit, deinceps ac paulatim liquida affunduntur.

*Album  
Rhazæ.*

Album Rhazæ. Olei rosacei lib. 1. cerusæ 3. 1. ceræ 3. 2. caphuræ 3. 1. albumina ouorum tria, melius fiet cum semun. vel 3. 6. litharg. Leue est, & magis conuenit, vbi calor, vitio, excoriatio est. Cerusa

rufa per se in pari rosaceo cocta ambusta, iuuat, & *Cerufa.*  
 attrita. Ad eadem facit vnguentū de cerufa. Alij ex  
 rhodostagmate cerusam terunt, vt sit liquidi mellis  
 crassitudo, quod in calore, in paruis inflāmati-  
 onibus, quales ad nasi pinnas eueniunt, vtile est. Trita *Vnguenta a*  
 è vino humidioribus vlceribus cōuenit, per se am- *pulotica.*  
 busta curat, permista butyro, mollit, coquit, cicatri-  
 cem claudit. Epulotica sunt, vnguentum desiccans  
 rubrum, vnguentū de plumbo, & alia. Puluis epu-  
 loticus balaustrorum, sanguinis draconis, cadmiæ  
 argenti, æris vsti loti an. fiat puluis, duris corpori- *Plantago.*  
 bus, contumacibus vitiis & nimium humidis vtilis  
 est. Vtrāq; plantago cum radice siccatur vmbra, tri-  
 ta ad cicatricem inspergitur. Triapharmacū, quod *Nutritum.*  
 huic simile ex litharg. & oxelæo, in glutināti-  
 bus describetur, epulotica sunt. Nutritum quoque  
 quod à Rhaze & Auic. hoc modo fit. Lithargyrus  
 in pollinē trita ex aceto & rosaceo diu versatur in  
 mortario (vt quidam volunt) plumbo, pistillo plū-  
 beo, modus est vt inde crassior fermentetur, & ex-  
 turgeat. Sunt qui addant sextulam æris vsti, vel cre-  
 mati plūbi, aut tātundem aluminis, balaustrorum,  
 rubiæ, sanguinis draconis, cadmiæ argēti, caphurę,  
 idq; singulari ope in malignis & pertinacibus vi-  
 tiis. In cācrosis cerusa permiscetur pistillo & mor-  
 tario plumbeo. Alij hoc modo. Lithar. cerusæ an. 3.  
 2. teruntur in mortario, vniunturq; ex olei myrti-  
 ni vel ros. sesquunc. Sunt qui oleum prius circum-  
 agant in pila plūbea, & radio plumbeo concutiant  
 dum crassescat, & nigrius euadat, vt olim Apollo-  
 nius. Alij sic vnita omnia olla noua vrunt, puluerē  
 reponunt mirabili remedio ad cancrofa, malignaq;  
 sedis

# INSTIT. CHIRVRGIC.

Ad *cancros* sedis & genitalium vlcera. Alij loco olei succum  
*puclendorum.* acetosæ, solani, polygoni, plantag. omphacis & si-  
miliū, eo modo exercent plumbo, & metallis ad  
vsturam iungunt. Quidam etiam theriacā addunt,  
& vna cum aliis concrematur. Frequentissimū etiā  
*Pompholyx.* vsus est pompholygos, suo verustas, suo posteritas  
vtrāque salubriter vsa est. Vritur pompholyx, & in  
cinerem resoluitur, in solani succo, rhodostagmate  
& aliis generis eiusdem diem integrum maceratur,  
tum pistillo plūbeo in plumbeo mortario diu exer-  
cetur, bis in die inseritur cancerosis vlceribus & ma-  
lignis. Quod autem pharmacum *διαπομφλυγος*  
inde conficitur, variē describunt. Aliter enim Ori-  
bas. Paulus, Aëtius, aliter quoque Arabes. Sed hoc  
maximē epuloticon est. ℥. pompholygis, cerusæ,  
lithar. ana ℥. 1. ladani ℥. 2. acaciæ ℥. 4. cerę ℥. 3. myr.  
℥. 8. ouorum assatorū vitellos 9. metallica è vino, te-  
rito, cerā cum oleo liquefacito, ex quo ladanum &  
acaciam cōmisceto, deinde vitellos & metallica in  
mortario reliquis coniūgito. Simile ferē quod se-  
quitur. ℥. cerusæ, lithar. pompholyg. ana ℥. 2. cad-  
miæ ℥. 4. medullæ cerui ℥. 3. cerę, ol. rosacei an. lib.  
1. myrtini ꝑb β. Liquatis aliis metallica è vino trita  
permiscuntur. Hoc cancerosis conuenit, pueris, eu-  
nuchis, mulieribus, atque omninō mollibus corpo-  
ribus, vbi cicatrix citra dolorem ducēda est. Nico-  
lai, Olei rosarum ℥. 10. cerę albę ℥. 5. succi expressi  
è granis solani ℥. 8. cerusę lotę ℥. 4. plūbi vsti, tu-  
thiæ an. ℥. 2. thuris ℥. 1. oleū cū succo decoquito, do-  
nec expirauit succus, deinde cerā oleo confundito  
reliqua in farinā trita in mortario permisceto, om-  
niāq; diu circumuoluito. In putridis & cancerosis,  
vbi

vbi feruor aliquis est, summa fiducia vsurpandum est, quod nulli veterum compositionum cedit. In corrodentibus & inflammatis vlceribus, succo feri dis subigunt. Liquido cerato rosaceo emolliūt, immittunt tubulo, ad rhagadas & alia id genus, in callosis, lini succus & adipēs misceri possunt, ad inflāmata, croco & vitellis oui intingitur. Atq; hæc sufficiant. Reliquum verò genus est eorum, quæ excrescentem carnem detrahant, de quibus capite de Pyroticis abundè differetur. In cicatrice vitia sunt, quia excrescit, quia caua est, quia deformis, durior scabrior, mollior, & maior est. Excrescit parum siccato, purgatoque vlcere. Caua est nimium siccato, & ante tēpus inductis epuloticis, vel quia pars subiecti ossis igne absumpta, sublata ferro, aut abscessu excidit. Deformē facit futura frequentior & inepta. maior incisio, & alia quæ vel cauā, vel eminentem efficiunt. Durior est, nimium siccātibus medicamentis, nec lenientibus tēpore immistis, quod vt ante scriptum, præcepit Hippocrates. Mollior infra modū siccato vlcere. Excrescens cathæreticis reformatur, scarificatur, absumitur. Caua refricāda & exterenda, vt quod desit aggignatur. Mollior siccāda est. Deformitas mollientibus, lenientib. discutientibus, exedentibus quoque & cathæreticis, aliquando etiā astrictione medicamentorum corrigitur. Ad hæc omnia materia suis locis descripta est. Epuloticis vtimur iam prope pleno, nondū tamen adæquato vlcere. Celsus linamēto è frigida presso primū integit, deinde vbi iam æquata cuti caro est, sicco vtitur. Ac bene fiet, si in frigida illa alumē

*Quando epulotici vsus & ratio vtendū.*

sum

## INSTIT. CHIRURG.

sum exaruerit. Et hæc quidem in leui vlcere faciūt fatis. In maligno, bene puro linteolo finum molli- ter extergebis, epuloticon induces quod plurimū siccet. Et quia ferè aliquid calli labris concreuit, oras vlceris pharmaco circūscribes, quod attenuet. In dolore, rubore, phlegmone & rheumate, pary- gro recenti vtendum erit, vel *διὰ χαλκίτεως* li- quido in platismate. Attenuant platisma æquali linteo contegitur, ex quo splenium superdatur, ex- pressum frigida, aliquando vino. Ac frigiditas sple- nij, subinde refuso frigido liquore contineri debet postremò fasciæ commodè alligandæ, quas tertio primum die absolues. Hic molli flocco saniem de- tergebis, & priorem curam omninò reuocabis. è re nata vel retento, vel mutato consilio. Recentiores vino calido, cui balaustia concexerint, aut similia, vlcus fouent, alioquin aqua, si quid caloris est, quæ vim aluminis conceperit. Ac sit octupla aqua alu- mini. Sed in calore alstrictio suspecta est molli vel- lere humorem sorbent pharmacum imponunt, su- perdāt stuppas vino madidas, vel aqua, omnia glu- tinantibus fasciis cōstringunt, non iis quidem, quæ ita contrahant, vt è rotundo oblongum fiat, nisi ca- uitas superfit, & vna cures, vt & glutines, & cica- trice claudas. Galenus interdixit aqua, vt ne nudū vlcus contingeret. At in calore & iam præcedente cicatrice, non adeo nocere potest. Cicatrix (si qui- dem naturaliter ducitur) in ambitum vlceris sanis partibus primum concrefcit, deinde paulatim ad centrum progreditur, postremò in ipso centro coalescit atque perficitur.

*De glu-*

De glutinantibus. CAP. 5.

**L**ongiùs fortasse, quàm res postulabat, de glutinantibus sermo dilatus est. Verùm ita nos cœgit traxitque consequens medelarum ratio, nec alius obtigit locus, in quo de illis orationem commodius institueremus *κολλητικά* Græci vocant *συμφοροῦντα* & *τραυματικά*. Quidam etiam *ἐναγμα*, & peculiariter quæ cruentis vulneribus adhibentur. Siccant hæc omnia ad secundum ferè gradum, media natura inter ea quæ ad cicatricem ducunt, & quæ carnem regenerant, nō detergent, sed astringunt, prohibentque, ne quid humoris vlcerū labris obueniat. Nec in cruentis solum vsurpari solent, sed ad sinus, fistulas, maligna vetustaq; vlcera transferuntur. Opitulantur celerius, si integra partium natura est si paucus sanguis idemq; purus affluit, si non abrafa, nō præcisa, sed vel salua, vel parte aliqua etiamdū hærens cutis est. Etenim cuti cū subiecta carne naturalis quædam amicitia coit, vt ægerriimè senescât, quibus omninò illa excidit, facillimè, vbi incolumis seruata est. Mirū quod præcisa, sed loco suo reddita, coalescit, recipit spiritū, & quasi mortua reuiuiscit, quodq; è plaga liuore ducto, nō in iuvene solo, sed etiā sene viuidū calorē recuperat. Magna igitur cutis habēda ratio, neque ob id solū, quod inde celerius glutinatur vulnus sed quia interiecta cute plurimis iuuatur, quæ nūda caro non perferat. Nudū vlcus linteo, lana, spōgia irritatur, medicamētis paregoricis fordes colligit, vellicatur catharticis, iuuatur omnib. si familiarī cute quasi propugnaculo obiectū est. Ideoq; & abrafa cutis & pēdula, suo loco inducatur, & redu-

*Faculas glutinantium.*

## INSTIT. CHIRURGIC.

Ea molliter apprimatur, sic enim vlceri celerius cōsueſcet. Neq; desperat quæ suspēſa, iā liuida aut nigra est, etiā si eo abſceſſit loco, vbi os sine carne, vel cartilago subiecta est. Ea enim vel in hoc acerbo casu suo corpori reconciliatur, & vitālē spiritū recipit quod in genu & nuda carne tibia, in gibbero, vbi tantū subiecta cuti mēbrana est, experiri licet. Idque fieri tum aliorū pharmacorū ope, prodidit Galenus, tum celebri illo, quod Heræ & Actalo attributum. Describitur hoc libro primo de compositione pharma. *ὑπὲρ τῆς πληγῆς*, titulo *διὰ τῆς πληγῆς* Actalo & Hera authoribus, & paulò pōst in Albis Asclepiadis. Asclepiades Pāphiliū vocauit. Iam verò & labra vlceris animaduertēda sunt, quia videlicet alia cōtracta, alia euerſa, plurima deſcunt.

*Labiorum  
vlceris ratio.*

Quas formas vlcerum in vario labiorū motu percipias. Os enim cōmissis labris interdum clauditur nonnūquam illa diducūtur, vt sit hiatus. Aliquādo quoque aliter deformantur, quia alterū retortum labrū & euerſum, alterū in os reductū, vel vtraque modò intrò, modò foras replicata sunt. Contracta labra vlcerū specillo vulnerario molliter disiungēda, & vtrinque abductis fasciis, vt extra vulnus magis cōstringantur, separanda sunt. Colligenda verò, quæ plurimū hiant, a sanis partibus ineunte fascia, quæ vt ad oras vulneris propiūs accedit, ita firmiūs astringatur, ea scilicet ratione, vt ne nimīū cogen-do, nimium cōprimas, & dolorem gignas. Euerſo tantum altero vlceris labro hinc linteā abduces, & in alterā partē quasi trahēdo volutabis. Si vtrumque euerſitur, ea quam *ἐνδὺν αἰχῶν ἐπίθεσις* vocāt, necēſſaria est. Atque hæc labra flaccidis, callo-

*Ad contra-  
cta labra.*

sis,

sis, muccosis & cācrosis vlceribus magis eueniūt. Quatuor ra-  
 Iam verò glutinatio fit, vel innata carne (συνάφαισι- tiones gluti-  
 σις Græci vocant) vel eo quem illi ἀγκυραμὸν, no- nandi.  
 stri infibulationem appellant, deinde etiam ἑλ-  
 ῖα futura, postremò κατ' ἐπίθεσιν fasciis obliga-  
 tis, quā deligationem vertunt. Sed omninò vt vul-  
 nus glutinetur, enato corpore, religatis, vt prius, &  
 inter se plexis carniū fibris coire necesse est. Id  
 quod fibulis acu & fasciis sepe numero admatu-  
 ratur. Ac ferè vt sunt vlcera & partes, ita remedia di-  
 stinguuntur. In paruo ac recēti vlcere fasciola in or-  
 bem nexa satis esse potest, & quæ cultellis, cibariis  
 fiūt, solo suctu, q̄ partes colligat, sæpius coalescūt.  
 Alia vulgari terebinthina illita (quæ abietinā potius  
 vocāda est) & iniecta fasciola celerrimè cōmittun-  
 tur. Verū nullum omninò vulnus vel minimum, Nul- lum vul-  
 etiam si acus minima pupūgerit, contemni debet, nus vel mi-  
 multò minùs, vel plethora, vel cacochoymia, vel de- nimum con-  
 niq; sensus acrior in metu est alioqui dolor, phleg- temendum.  
 mone, conuulsio ad exitium sequi consuevit. Ita-  
 que statim initio relicta glutinādi via, paregoricis  
 vtendū erit, quæ dolorem leniant, & à phlegmone  
 vindicent partem, donec om̃ia pericula abiisse vi-  
 deātur. Ac ferè quinto & septimo die grauiores ca-  
 sas sese proferunt, quos cum æger saluus euasit, &  
 omnia tuta sunt, detersum siccatumq; vlcus gluti-  
 nabis. In maiori vulnere maiora remedia quærēda In maiori  
 sunt, deligatio, sutura, fibula, medicatio, vbi medi- vulnere.  
 camentum quoque siccare magis necesse est, hicq;  
 audienda sunt magnū & paruum in sectione, non  
 quorundam veterum opinione, qui ἐπικύρρον, in-  
 signe vulnus è natura loci, μέγα, magnum è periculo  
 i 2 definiunt.



## INSTIT. CHIRURGIC.

definiunt. In glutinēdo distinguī debet naura corporum, quia videlicet (ut loquuntur illi) aliud *δυσσελκῆς*, quodque ægrè coalescit, aliud *ευσελκῆς*, in quo vulnera celeriter cōiunguntur. Vulnera rotūda non facīle glutinari, nisi in longitudinē dissecētur testes sunt, Hippocrates Aristoteles, Gal. Cassius & alij medici veteres. Lentiginosa corpora, ruffa, cacochema tardius sanescunt. Ac breuiter difficultas nascitur ex iis, quæ in rebelli vlcere proximo capite tradita sunt, adhæc externis casibus, culpa medicorum, ægri & eorum qui ægro inseruiunt. Primum igitur in cruēto vulnere (si quidē neque profundum est neq; hæmorrhagia extitit) molli tormēto, sponsia, panniculo detergendus cruor est, atq; illa prius inculcātur frigida, & expressa adhibentur. Patrocles apud Homerum Eryphili vulnus tepida exterget, rudiū quidem, quod postea ab Hippocrate interdictum fuit. Quod si altius descēdit vulnus erupitq; sanguis, aceto magis vtendū erit. Sic enim grumos incides, & sanguinē cohibebis. In neruis, ab aceto metus est, nisi seruata tenuitate, frigiditatē eius exoluas. Ideoque specilli extremo linteolū alligabis quod vel sapa, vel melicrato madefacies. In lacunis & vlcere veteri vbi glutinādi tēpus accesserit, vinū & œnomeli idonea sunt. In mulieribus, pueris, eunuchis, atq; id genus corporibus, tū alias, tum maximē vulnerato capite, aceto abstinemus. Idem aperto perioſtio relinquendū est. Aceri loco, vino & œnomelite floccū intingimus, exprimimus & cruorem inde extergemus. Atque vbi is ritē deterfus est, nihilque labris vlceris intercedit, qualia sunt grumus, pilus, oleū pluma & similia, sequitur

Ratio glutinandi.

Aqua & ceteris.

vt latera lateribus, oræ oris, ritè coeant. Ponimus autem neque dolore, neque phlegmonè, neque villo alio vitio vlcus laborare, ac iustâ carnē lateribus vulneris interesse. In rectis vulneribus labra faciliè adducuntur, multò magis si molle corpus est, & adducta fasciis cōtinenda sunt, ex duplici initio, alioqui simplicibus, sed futura interdū addita, & fibulis. In transuerso vulnere oræ dissidēt magis, quare *In transuerso.* futuris & fibulis opus est. Atque has figuras vulnerrum ex fibrarum cursu, quæ musculos intexunt, distinguere oportet. In magnis & profundis vulneribus *In magno & profundo.* vincula ex duobus initiis necessaria, eadē quoque in latis & profundis, sed hæc præterea altis futuris cogenda sunt, neutra verò præpropere glutinanda, ne quid reliquum fiat, vnde postea recrudescant. Fascias autem austero vino & nigro maduisse iuuat, quod in cæteris vulneribus præferendum est, quia repellit, phlegmonem prohibet & cogit. Quin & aliquod eorū quæ contrahunt, licebit incoquere, sed modus sit, vt ne nimis adstringendo moueatur dolor. In molli parte, extrema auricula, imo naso, frōte, bucca, palpebris, cute gutturis, ventre, mēbranis, quæ non sunt tendines, futura cōuenit. Præputium assuitur & infibulatur vt carnosum genus, vbi nimiū dehiscit, nec oræ faciliè cōiunguntur. In capitis vulneribus extrema cutis, tū futuris, tum fibulis cōmitti potest. Cartilagine auris effractus Archigenes fibulis cōtinebat, & argilla cauum auriculæ implebat, ne cōcideret. Alij diuisas partes eiusmodi, primū quidem digitis cōmittunt, dein de glutine, visco aliisque generis eiusdem in breui platysmate quasi ferruminant. Sed quæ viscida im-

## INSTIT. CHIRVRGIC.

*Particularis  
materia quo-  
modo seligen-  
da.*

pingas, glutinare præstat, vt non solum contineant, sed diuisas inter se partes concilient, atq; conglutinent. In particulari materia eadem seruatur ratio, quæ iâ sæpius in aliis generibus pharmacorû præscripta est. Eaque seligenda, vt sunt partes, vt molle durumve corpus, vt recēs, vetustum, paruum, magnūque vulnus est, quod in fasciis, fibulis, futuris similiter distingui debet. Ac præcipua ratio haberi debet in vulneribus, quæ in ventres corporis penetrant, aut alioqui multū profunda sunt, vt ne commissa parte, quæ exterior est, interior distincta, inglutinataque maneat, aut si hæc quidē glutinatur, infirmior tamen sit cicatrix atque vnitio, vnde & suppuratio intus colligatur, soluta cicatrice, & exteriores oræ resoluantur, quod monuit Hippocrat. Glutinadi vim habent ebulus, sambucus, syderitis, palmæ, piñi, tædæ cortices, dracōrij folia recentia, herba quæ fraga gignit, anagallis, salix, androsamū, astragalus, phlomunculus, telephium, symphyrum, petræum, araneæ tela, sed ea præcipue, cui è pistri-  
no farina incederit. Equisetum maxima vulnera præfectos etiam neruos cōglutinat. Coccus baphi-  
cus ex aceto pistus ingentia vulnera coniungit, cū oxymelite diuisos neruos conciliat. Magnis quoq; vulneribus Chamæpytis idonea est. Arnoglossum quadam temperaturæ symmetria iungendis veteribus lacunis, atque recētibus vulneribus, nulli remedium cedit. Rebellia, rheumatica, pūtrilaginosa vlcera, & in dysenteriiis facta percurat. Eaque omnia, quia conuenienter refrigerat, siccatur, adstringit, nec mordet, leuiter digerit & exterget. In humidis vlceribus, & partibus quæ natura sicciorē

*Chamæpytis.*

ſicciorē præditæ ſint, tota herba cum radicibus ſic-  
 catur, tritaque inſpergitur, idē rheī per ſe commo-  
 dum ſemen eſt. Spongia, lana ſuccida, linteolū, im-  
 merguntur aqua, aut vino potius, vel ſi profluxit *Spongia &c.*  
 ſanguis, oxytrato, ad hæc liquoribus aliis, qui con-  
 trahant, deinde expreſſa vulnere colligantur. Quer-  
 na folia trita in leui petra, vulnere ſecuri facio Ga-  
 lenus appoſuit vt etiam vicina comprehendērent,  
 eoq; remedio glutinauit, ea ipſa vino coſpergi poſ-  
 ſunt. Caſeus recens & oxygalactinus, Hætis ſaturna, *Iſarhi.*  
 neruos præciſos & tēdines in fine muſculorū iun-  
 gunt, & duriora corpora conglutinant. Centauriū *Centauriū*  
 minus, foliis & floribus vlcera magna coniungit, *minus.*  
 arefactū collecticis miſcetur, multo magis ſi rheu-  
 maticum vlcus eſt. In quo genere præſtantiffima  
 medicamenta ſunt, quæ valde ſiccant, leniter ad-  
 ſtringunt, vt non mordeant. Pentaphylli foliū ner-  
 uos adiuuat, cum melle tritum. Ad vlcera capitis,  
 myrrha, aloë, terebinthina, aſſis alijs tritiſq;, farina  
 toſti hordei & milij, Mummia vtendum eſt. Cala-  
 mynthę ſuccus membranīs vulneratis inſuſus egre-  
 gie glutinat. Sed hoc & ſimilia, acriora ſcilicet, quæ-  
 que vehemēter ſiccant, Megetis ſunt. Sydonij &  
 Eudemi. qui in membranīs cerebri, acribus, mor-  
 dētibus oxymelite, aliſque generis eiufdē vſi ſunt.  
 Milij farina iſdem vulneribus inſpergitur. Reſina,  
 pix ſicca, amurea cocta, duris corporibus adhiben-  
 da ſunt. Plx humida minus quam ſicca mordax.  
 hordeum vſtum, aloë ex aqua trita, herba folia &  
 ſuccus, quam ex India comportant, & patrio nomi-  
 ne Zambanam appellant. Aloe vulgaris eſt, quæ *Zambana.*  
 tenaci vita in multos mēſes viget, è laquearibus e-

## INSTIT. CHIRURG.

dium & tabulatis magna viroris cōmendatione su-  
 spenditur. Constat hoc remediū certo experimen-  
 to nautarum. In colleticis quæ ad manū sunt, præ-  
*Attractylis.* cipua laus attractylidi. Eius cacumina austero vino  
 vel oxycrato incoquantur, excipitur concha quod  
 enatat oleosum. Eadem quoque in reticulum data,  
 quod duabus ollis argilla iūctis, eliciendo oleo in-  
 tercedit, oleagineum liquorem reddit. Atque ollā  
 superiorem igne cingi, inferiorem terra defodi, reli-  
 quaque omnia ea ratione cōparari oportet, quæ su-  
 periore libro præscripta est. Cuidā decius nasus,  
 qua os in cartilaginem definit. Rusticus propè den-  
 tem partem alteri digitis coniunxit, herbam tusam,  
 & è vino nigro tritam, quod millesfolium appellāt,  
 impegit, rudiū omnia colligauit, vnde celeriter re-  
 stitit profluens sanguis, & vulnus pulchra cicatrice  
 breuī coiit. Folia hederæ recētia in vino cocta, grā-  
*Hedera.* dia vulnera coniungunt, & maligna sanant, atque  
 inde succus tum per se tum rosaceo temperatus (si  
 quidem acrior videatur) narium vlcera & aurium  
 percurat. In vlmo multa sunt quæ laudes. Decocto  
*Vlmo.* vlmi compingēdis fractis ossibus, veteres vsi sunt  
 eiusdem cortex & folia adalligata, glutinant,ambu-  
 sta iuuant, vt sine manifesta cicatrice coiisse videā-  
 tur. Teruntur folia, cortex veluti fascia obligatur.  
 Purgat, implet, cicatricē ducit, glutinat, exterit, de-  
 let papularū vestigia, & artificialibus balsamis cō-  
*Aqua in fe-* miscetur aqua, quæ vlmi folliculis includitur, be-  
*nuculis vlmi.* ne purgata vermiculis. Ea crito vsus est ad Liche-  
*Aqua visn.* nas. Balsamo quodā raro & pretioso principes v-  
 tūtur glutinando. Sunt qui eā aquam quæ castratis  
 viribus exudat vere lenticula vitrea excipiant, vas  
 operculatum

operculatum sedulo, clausumque, annum integrum exponit foli, loco subdiali, sed qui ab iniuriis cœli tutus esse possit, ac lenticulam ad solam subinde vertunt, ut unde quaque radij euerberent, & aquam coquant. Melligo tandem concrefcit, quæ sit balsamo viribus æqualis. ἀμπελογάλαμα ex analogia (si vis) appelles. Duriorum sunt corporum, sorbus, mespilus, pinafter, quercus, & quæcunque acerba sunt. Simite quernis foliis comparanda sunt. Addunt bolum armenam terram sigillatam, & similia. Composita sunt cerati myrtini ℥. 3. cerusæ ℥. 1. vetusta glutinat. Aloë arida ænomelite coquitur, linamentum inde tinctum vulneribus capitis inferitur, phlegmonem prohibet & iungit. Galenus mollioribus naturis pharmaca temperavit ex lithargyro, oxelæo & ænelæo, durioribus ex ærugine, bitumine, squama, aloë & myrrha. In quibus quia bitumen præcipuam vim habet, verum friabilius est, quam ut solutum oleo emplastrum reddat, cera quoque ad corpus una temperatur. Sed oleum & cera vim bituminis exolunt, ideoque squama additur, ærugo & alia, atque hinc vocata barbara comparantur. Fistulas expurgat, glutinat, priusquam occalescant, & cicatrice tegit. Induratis musculis utile est. Lithargyri ℥. 4. olei & aceti an. ℔. 1. vel paulo minus coquatur omnia dum omnino combibitum oleum, acetum vero expirasse videatur, nec iam inquinet, & nigro splendeat. Acetum sit acerrimum, pellucidum, ex vino factum non aquoso, oleum vero antiquissimum. Hoc parabili auxilio Galenus parotidas criticas, quæ iam fistulas traherent, in pueris, adolescentibus, mulieribus sæpius curavit. Siccatur sine

Galenus  
pharmaca.

# INSTIT. CHIRVRG.

*Tripharma-  
cum.*

*Nutritum.*

morsu, vlcera difficilia perſanat, cruenta glutinat; omninoque vlcera magna paruaque iuuat, dum ad cicatricem perueniant. Hoc emplastrum alij nigrum, alij vnguentum de lithargyro coctum appellant, nec à Tripharmaco Mesues alia re differt. quàm quod plus habet aceti & olei. Recentiores enim parem aceti modum & lithargyri, duplum oleum commune vel rosaceum commiscēt. Differt autem è Nutrito; quod aliud Tripharmacum est Mesuæ, quia in hoc materia cruda est, ex quo non ita siccat, & vim aliquam concipit è plumbeo mortario, in quo conficiunt. Quod ex lithargyro & œnelæo fit, contra rheumata valet, induratos musculos adiuuat, & cruenta iungit. Litharg. libr. i. octo dies, vel eò plures in Sole teritur affuso vino giluo, tenui, pellucido, odoro, subadstringente. Ac quantò plus vini combibet, tantò efficacius futurum est, postea cum sesquilibra, libris duabus olei plus minusve excoquitur, dum non inquinet. At hæc assidue versare spatula necesse est. Melinæ sunt multæ 2. de compositione pharmac. *ἡ γλῦν*, quæ glutinient. Quod sequitur ex vino Heræ, luxata firmat, recentes puerorum strumas disecurit, inueteratos sinus, quique in vacua penetrent, percurat. Recetia vulnere etiã magna cōglutinat. Litharg. aurī lib. i. hoc est 3. 12. sic enim perpetuò libram Græcorum vsurpamus. diu teritur in Sole affuso vino giluo, tenui pellucido, vt prius. Quo teretur diutius, & plus liquoris rapiet, eo præstātius euadet. Ex quo iterum leuigatur in mortario, instillato deinceps atque alternatim modo oleo concalſacto, modo vino illo, atque utroque quantū fieri potest, saturari debet.

Hic

Hic in cacabum transmittitur, & cum olei & vini  
gilui ana ℥.9. vel eò pluribus excoquitur, bene co-  
cta lithargyro immiscentur resinæ pini leuigatis-  
simæ ℔.1. ceræ albæ ℥.10 opopanax sesquunc. co-  
quantur omnia molli igne, dum non inquinent. In  
vfu, sanguine agrestis columbæ conspergitur. Al.  
Crititonis, quod iungit retentia, cicatricem ducit *Critonis.*  
& extrahit. Litharg. lib. 1. ceræ lib. 1. terebinth. ℥.2.  
eruginis ℥.2. olei veteri ℥.9. aceti ℥.2. & semil. Li-  
tharg. oleum, acetum, ærugo blando igne coquen-  
da sunt, iam propriè coeuntibus resina cerâq; con-  
iungitur, coquantur dū sint corpus, & non inqui-  
nent. Magis glutinabit pharmacū, si myrrhæ, aloës,  
sarcocollæ ana ℥.1. misceās ea quæ per se glutinēt.  
In malignis, squamæ & vitrioli genera conspergi *Macherionis.*  
possunt. Celebre & polychrestō Macherionis phar-  
macum ad vlcera maligna, recētia glutinat, phleg-  
monem prohibet, præcipuè ubi aliquid contusum  
fuerit, rabiosi canis moribus medetur imposi-  
tum, ac subinde commutatum, phagedænis con-  
uenit aurium, nariumque vlcerebus carnem gene-  
rat. In genitalibus & nudatis ossibus idem efficit.  
Aristoloch. rotundæ galbani, opopanax, ærugi-  
nis, iridis, ammoniaci, myrrh. ana ℥.1. terebint. ce-  
ræ, ol. omphacini ana ℥.7. & semil. Ærugo ex dimi-  
dio ol. seorsum teritur, cum reliquo oleo, cera & te-  
rebinthina molliter coquantur, ærugo additur,  
postea verò ammoniacum ex aceto fusum, galbanū  
purgatum, & opopanax permiscētur postremò re-  
frigeratis reliqua inspergantur. *Ægyptiac. Andromachi.*  
Ægyptiac. Andromachi vulnera en se facta, vel profundissima, triduo  
glutināt, quod capite de ossium vitis describetur.



# INSTIT. CHIRVRGIC.

*Διά χαλκίτιος* fistulas & magna vlcera coniungit.  
 Axúgiæ veteris bene purgatæ fibris & sine sale  $\text{℥.}$   
 $\text{2.}$  ol. veteris, litharg. ana  $\text{℥.}$  3. chalciteos  $\text{℥.}$  6. confi-  
 ciatur ex arte. Quòd si palmaria spatha defuerit, sa-  
 ligna rudicula cōmouebis, aut ex ea materia, quæ  
 glutinando cōueniat, non radice cānz, cui magna  
 vis inest detergendi. Salix verò siccatur & astringit,  
 idque sine mōsu, quæ omnia glutinando idonea  
 sunt. Quod ē succo liliorū conficitur, diuturna ma-  
 lignaque vlcera cōglutinat, nimio humore langu-  
 idis male coalescentibus, cicatricem agrè trahēti-  
 bus vtilissimum est, vehementer siccatur, idque citra  
 mōsum, vt incisa capita musculorum possit cōiū-  
 gere. Succo foliorum lilij  $\text{℥.}$  5. mellis & aceti an.  $\text{℥.}$  1.  
 coque lento igne, dum crassescat. Alij ē symphyti  
 succo & alijs quæ per se glutinent, melle rosato &  
 aceto sambucino eadē pharmaca componunt, quæ  
 efficacissimè glutinent. Ad neruorum vulnera co-  
 chlearum cānes concisæ tritæque adiecta myrrha  
 & thure conferunt. Eosdē neruos vniunt lumbrici  
 terræ triti & impositi. Iam verò cruentis, suggilla-  
 tis, excisis quacūque parte corporis, vitiligini, le-  
 pre, maculis, crustis efficacissimè opitulatur, quod  
 paratur ex Attractylide. Attractylidis effosæ cum  
 radice, deinde siccata vmbra, postremò tritæ vnc.  
 quatuor, ol. dulcis vnc. quatuor, Colophonix ses-  
 quilibra, æruginis  $\text{℥.}$  2. ceræ  $\text{℥.}$  8. Oleum ceram, Co-  
 lophoniam liquefacta excolato, deinde æruginem,  
 postea herbam commisceto, iuncta omnia frigida  
 immergito manibus versato, pinsitōque: pista in  
 aqua noctem finito, atque ita vsui reposito, verum  
 Colophonia nostra siccior est. Liquida quoq; vete-

res

Salix.

Ex succo lilio-  
rum.

Ad neruos.

Ex Attractylide.  
Ibid.

res utebantur. quæ si defit, sicca partim oleo, partim terebinthina mollienda erit. Hoc autē glutinat recentia. Rhodini vel myrtini  $\mathfrak{z}$ . i. terebint.  $\mathfrak{z}$ . i. eruginis  $\mathfrak{z}$ . 2. si quidē lota est, & molliora sunt corpora, alioqui sesquidrachma. Barbarū Galeni. Picis  $\mathfrak{lb}$ . i. bituminis. ceræ ana selib. ammoniaci, mannæ an.  $\mathfrak{z}$ . *Barbarum.*  
 3. cerusæ sesquunc. ol.  $\mathfrak{z}$ . 20. nam sic melius, quàm  $\mathfrak{z}$ . 17. Al. Est & aliud in ligne Barbarum emplastrum nigrum, quod capite de hæmorrhagia describetur. Plura quoque primo & secundo de compositione pharm.  $\mathfrak{xv}$  γέν. Atque hinc ad recentiorum medicamenta transeundum, si prius monuerimus digerentia & attrahentia cerato temperata fieri sarcotica, sarcoticis fieri glutinantia, si quid astringētium permisceas, aut si iunxeris quæ siccent magis, & astringant, reddi epulotica. Basilicū magnum Mesuæ glutinat nervos. Celebris est pulvis (quem rubrum vocant) ex sanguine draconis, & sesqui altera ratione vel dupla thuris. Alij calcem, bolum armenam, santalos cōmifcent. Sunt qui hoc modo conficiant. Symphiti maioris, boli armenæ an.  $\mathfrak{z}$ . i. picis Græcæ  $\mathfrak{z}$ . 3. mastich. olibani an. semunciam, sanguinis draconis, mummiæ an.  $\mathfrak{z}$ . 2. Pulveres futuris *Sanguis draconis.* insperguntur, vel in cerato imponuntur. Sanguine draconis collecticon variè conficiunt. Thus, mastichen, bolum armenam equaliter mista, hirci sanguine mactati Augusto mense concorporant. Alij aliter ex eadem materia. Quidam bolum armenam terunt, faciuntque ut plurimum sorbeat sanguinis hircini & sorborum succi. Plinius sorborum succo & caprillo sanguine compingit. Eidem Plinio & Solino sanguis est draconis, qui dum vulneratus  
 elephas

## INSTIT. CHIRURGIC.

elephas concidit, colliso casu dracone colligitur. Aëtius è succo herbæ Indicæ (quem dracunculum vocant) fingi credidit. Dracontio nostro vis inest glutinandi. Cartilagines mediâ naturâ habent inter ossa & carnem. itaque glutinatur non tam siccantibus, quàm quæ catagmatica, aut quæ porotica à gignendo callo appellant, nec tã mollibus, quàm quæ *εναμα*, carnem uniunt. Eâq; natura constant tenaci & viscida, pix mâna, caro & salua cochlearum, viscum, glutinû fabrilè, pollen visco illigatus tragacantha in aceto fusa gummi Arabicum, aloë pinguis, terebinthina è vino lota, mucagines, alia quæ id genus, quibus sanguis draconis, pulvis ruber, & alia quæ per se glutinandivim habeant, coniunguntur. Ita concorporata pharmaca illinuntur, cōpinguntur, adhibētur in spleniis, & veluti incerta tela, quæ arctius consuatur, vt pharmacû firmitus inherescat. Sed si magna vulnera sunt, sibiula vel acu prius conducere oportet, deinde medicamento impingere, id in cartilaginibus auriû & nariû fieri debet. Cochlex cum suis volutis diu teruntur in mortario, vt nihil asperi reliquum sit. Sanguis draconis subquadrupla, mâna suboctupla ratione adiungitur, permiscētur in mortario, & affinguntur. In naribus (quod antè dictum est) ne vulnus concidat, atq; ita cartilago dissideat, fistula cōcaua paranda est, quæ introducatur, & qua parte vulnus cōtingat, illinatur pharmaco, altera verò nasi pars, quæ foras vertitur, quâque pinnae eminent, emplastico medicamento compingetur. Aurium caua argilla impleri debet. Argilla prius cochlex salua, & acidi punici liquore subigatur. Alioquin 3. 2. aloës excipiuntur

*Cochlex.*

cipiuntur fabrili glutine soluto ex aceto. Aliud. Tra-  
 gacanthę 3. i. in aqua Rhœis maceratur, muccago  
 elicitor, in qua excipiantur myrrh. aloës, sanguinis  
 draconis ana 3. i. omnia pauca terebinthina colli-  
 gantur, adhibentur in pellicula, vel linteolo. Atque  
 hæc tandiu inhærere oportet, dum coalescat carti-  
 lago, nisi prius excidât. Quæ sequuntur, iusta ratio  
 ne probata sunt posterioribus chirurgis. Plâtaginis  
 vtriusq; cõsolidæ, betonicæ, verbenæ, pimpinellę,  
 pilosellę millefolij, linguę canis, caudę equinæ an.  
 M. i. conquassata coque cum  $\text{℥}$ . 3. sepi arietini, co-  
 latis adde resinæ, ceræ, galbani an. quartaria 3. sar-  
 cocollæ quartariũ vnũ, terebinthinæ quartariũ 1.  
 & semiss. liquata omnia & ad ignem circumducta,  
 ex arte misceantur. Aliud.  $\text{℥}$ . Centaurij minoris  
 manip. 6, macerentur noctẽ integram in vino albo  
 postridie in eodem vino ad dimidias coquito, cola-  
 tum succum recoquito, dum sit mellis crassitudo,  
 postremo reposito. In vsu, accipe succi 3. 3. tereb.  
 $\text{℥}$ . i. ceræ nouę quartarium 1. lactis muliebris 3. 2.  
 Optimum hoc medicamentum & amicum neruis,  
 cruenta glutinat. dura emollit, fluxiones inhibet,  
 arcet putredines, detergit sordes a fera morsis auxi-  
 liatur, atque omninẽ dignum laude est. Centaurij  
 succus leniter altringit, siccatur, tergit citra morsum,  
 ex quo miscetur medicamentis. quæ fistulas, sinus,  
 rheumatica vlcera coniungant, & cicatrice claudat  
 quæque veteres duritias emolliant. Planta admo-  
 dũ parabilis est, maximẽ laudata veteribus, de qua  
 libellus etiã Galeno attributus est. Eius radix inuti-  
 lis est. Herba cum floribus postremò vere colligẽ-  
 da, & vt prius, exuccanda, reponendus in multo

Viride Ro-  
nansini.

E Centaurio.

Centaurij  
succus.

vsus.

# INSTIT. CHIRVRGIC.

& suus succus est. Eadē siccatur ymbra, vt in tempore  
 trita in puluerem, putridis, sordidis, cācrosis & aliis  
 vitiis inspergatur. Eodem modo Marrubium, Scor  
 dium, Apium, & aliæ plantæ plurimæ, chirurgo ve  
 luti opes quædam, suo tempore comparandæ sunt.  
 In medicamento de quo agitur, glutinādi vis aucta  
 est adiecto vino. Similiter & aliis emplastis, masti  
 che, thure, gummi Arabico, quæ cū leniter astrin  
 gant, molliant, reprimant, in communē vsum me  
 dicamēti conspirant. Aliud Dini. ℞. betonicae cen  
 taurij ana manipul. 2. coque, & cola, vt prius, ex  
 colato succo adde resinæ quartarium 1. terebinth.  
 ℞. β. sarcocollæ ʒ. 1. ceræ ʒ. 2. liquefiant omnia ac  
 leniter bulliāt, acetum paulatim affundatur, vbi re  
 frixerint omnia, ē muliebri lacte manibus cōuol  
 uantur. Pares vires habet cū priore benignum est,  
 vt nervis possit convenire. Centauriū, betonica, re  
 sina, nervis punctis amica sunt, sarcocolla mitissi  
 mum est colleticon aceto fit, vt altius permeet, &  
 melius attrahat, lacte muliebri mollius pharmacū  
 est, nec ita cohibetur eius tenuitas. Al. Ceræ albæ,  
 resinæ ana quartarum 1. olei ʒ. 2. terebinthinæ ʒ. 1.  
 thuris, mastiches ana ʒ. dimid. adde pimpinellæ, me  
 langianæ, aut loco eius, telephij, maioris semper  
 uui, vel attractylidis, verbenæ vermicularis, aut po  
 tius temperuui minoris ana manipul. 1. coquātur  
 vino vt prius, dum duæ vini partes euanuerint, &  
 hæc omnia percolentur, exprimāturque atque ite  
 rum coquantur ad crassitudinem, tum adde resinæ  
 lib. 1. ceræ albæ lib. semis, mastiches ʒ. 2. refrigerē  
 tur vt prius, & lacte muliebri subigātur, leue colle  
 sicō est. Viride ex herois fortius est, & iā malignū  
 quid

Dini.

Viride ex  
herbis.

quid præ se ferentibus conuenit, quod ex cap. de  
 purgantibus repetendum est. Vnguentum gloriæ. *Bedegar.*  
 Olei bedegaris lib. i. cerę quartariū i. seminis alba-  
 rum rosarum semuncia. Oleum b-degaris non ita  
 parabile, quia quid sit Barbarorū bedegar parum  
 constat. Vteris autem vel spongiolis illis, quæ in ca-  
 nino rubo colliguntur, vel cymis attractylidis. Alio-  
 qui tenerioribus cacuminibus aculeatæ plātę, quę  
 ab herbariis Bedegar appellatur, vel eadem ē car-  
 duo syluestri, (quā cardonettam vocant) detrun-  
 cabis. Incoques autem horum quoduis oleo & vi-  
 no nigro, dum vinum exhalauerit, materiam vehē-  
 menter exprimes. Semen rosatum est, quod detra-  
 ctis foliis & apicibus luteis excusso capite decedit. *Semen rosa-  
rum.*  
 Et vermibus, neruosis partibus glutinandis, vtrius-  
 que symphiti, cynogloss. pilosellæ, vtriusque plan-  
 taginis ana manip. i. vermium terrenorum lib. se-  
 mis. conquassata omnia septem dies in ol. sesquili-  
 bra madent, deinde leniter cocta in suum oleum  
 exprimuntur, expresso succo & oleo, misce sepi-  
 arietini purgati libr. i. picis naualis lib. semiss picis  
 Græcæ quartarium i. gabani, opopanacis, terebint.  
 ana vnc. i. thuris mastiches ana semunc. alia liquan-  
 tur, galbanum, opopanax, thus, mastiche aceto ma-  
 cerantur, ex quo soluta aliis permiscuntur, & ex  
 omnibus efficitur corpus. Lumbrici terræ triti &  
 per se impositi, neruos glutinant. Aureum. Cerę  
 citrinæ lib. β. olei boni lb. 2 & β. terebinth. 3. 2. re-  
 sinæ & Colophonix ana sesquunc. olibani masti-  
 ches ana 3. i. croci 3. i. cera cum oleo liquatur, dein-  
 de resina, Colophonia, terebinthina confundun-  
 tur, sublatis igne, thus & mastiche insperguntur,  
 k postremo

## INSTIT. CHIRURGIC.

postremò resperſo croco omninò intinguntur. His ergò pharmacis vtendum erit, vbi cruorem & sordes exterſeris, vbi curaueris ne quid interſit vlcerum labris, vbi denique neque dolor, neq; phlegmone, neque alius caſus eſt, vnde glutinatio prohibeatur. Digitis, acu, fiſtulis, deligatione, diuiſa labra coniungenda ſunt, arida reſperguntur, illinuntur liquida, crassa, viſcidaque, vt in magnis vulneribus neque ſatis eò hærentibus impinguntur, ſuperdatur ſtuppa è vino nigro preſſa, ex eodem ſplenia, faſcias, ſubligacula madere vtile eſt, quanquam & aceto imbibiri poſſint, colliganda omnia eo deligationis genere, quod contineat, reformet, cogat, quantum videlicet caſus expoſtulat. Puluis ruber oui candido, poſtea quoque terebinthina excipitur, atque imponitur. Quoties commutatur medicamentum aſtuto vino fouetur vulnus. Rarius autem commutari debet, quarto primùm die, deinde ſexto. Linthea eodem vino inculcata ſuperimponuntur, atque hæc donec coaleſcat vulnus. A quo ſi qua macula relinquitur, detergente materia exteri oportet.

IACOBI



IACOBI HOLLERII

STEMPANI, MEDICI PA-

RISIENSIS CELEBERRIMI

de Materia Chirurgica.

PERIOCHE III.

De utili materia in vitiis ossium. CAP. I.

**I**AM explicanda nobis ea pars reme-  
diorum, quæ ad ossa pertinet. Vitiis  
ergo quæ ossa fecerint, eodem ferè  
momento succurrere oportet. Alioqui  
phlegmone succenditur, quæ saniem facit, agit cu-  
niculos, vlcera dispergit alta, exesa, & curanda  
motis, *suppûtes* inde vocat Hippocrates. Ex quo  
denigrantur ossa, cariem inducunt, syderatione  
corrumpuntur. Aliis femur claudicat, manca ma-  
nus est, ad solitos flexus torpet articulus, vel is ex-  
tortus est. Huic conuulsis nervis, distorto corpore,  
crudeli morte vita extinguitur. Ille gangrena &  
putredine cõtabescit, extinctoque sensu paulatim  
conficitur. Itaque in tam lubrica medendi parte  
omnem consilij rationem moueamus, maturimè  
occurramus, vt nihil naturæ pereat, nulla cicatrix  
nulla vestigia mali, aut honesta certè, relinquantur.

*Quæ negli-  
gitus ossium  
superueniât.*



## INSTIT. CHIRURGIC.

*Labores of-  
sum.*

Laborant ergo (vbi accessit iniuria) corrupta, fracta, collisa, fissa, forata ossa & mora articulis. Ad quæ vitia alia quoque suboriri solent. Accessio mali est, si cum vulnere læsa sunt, multò magis in articulis: vbi nerui, tendines, ligamenta, nuda carne & ossæ loca sunt, in quæ laxata ac commota & iam nouo casu imbecilla, excremēta corporis facilè decurrūt.

*Quam multa  
auxilia in-  
uentia ossibus.*

Adde quòd ibi cartilago est, in qua cicatrix formari nequit. Hic ergo asperior casus est, dolor, vigilia, febres, deliria, cōuulsio & mortes sæpè numero commouentur, & vt articulus maior est, ita periculum grauius creare solet. Verùm non alia chirurgiæ parte ditior suppellex veteris disciplinæ, nusquā hæc curiosa magis, quàm in ossium medelis. Infinita propè reperit, & literis tradidit, quædam etiam autoritate Principum ære publico in ciuitatibus exeruxit, quæ ad hanc curam ossium pertinerent, ferramēta varia, excisorios cultros, scalpra rasoria, limas, specilla, aliquot terebrarum genera, modiolos, forlices, forcipes, *μυνηφόβλακας*, volsellas, scalas, scamna, contos, repagula, vectes, glossocomia, canales, sphæria, stathmia, trochiscos, pennas, inceratos canaliculos, fistulas, seras, fila, byssos & auro texta, alia quoque plurima, quæ ad purganda, tendenda, reformanda, tentanda, constituenda denique ossa facerent. Et in vna deligandi cura

*Deligationis  
materiam.*

quamplurima vsu diuersa suis etiam nominibus veteres distinxerunt, linteola, fascias, hypodesmides, splenia, apodesmos, regulas, ferulas, spatulas, habenas, laqueos, mitellas, puluinos modò scroteos, modo molliusculos, nodos, acus, acias & alia sexcenta, quorum multa retenta sunt, alia antiquata, quædam

quædam deserta partim ignorantia, partim negli- *Deligatio.*  
 gētia. Adde quòd multis in rebus facilior, nec tam  
 operosa curandi via inuenta est. Atque hic quoque  
 peculiare nomen habuit deligandi forma, & *κατα-*  
*ρυστική* vocata est, quanquam non in omni quere-  
 la ossis ea necessaria est, sed aliquando in orbem,  
 aliquando in asciam ducta, nonnunquam etiam si-  
 ne deligationib id genus splenia vsurpantur. quo-  
 rum omnium ratio ex libris primum Hippocratis  
 de officina medici, de fracturis & articulis, deinde *Corruptela*  
 commentariis Galeni petenda est. Corruptum os *os.*  
 pingue est, nigrum, molle, cariosum, quod superna-  
 tis granibus vlceribus aut fistulis, hisq; vel longa  
 vetustate, vel putredine occupatis, euenit. Nudatur *Remediae or*  
 os cui vitiū accessit, vlcere exciso, subsecta carne, si *tupis ossis.*  
 latius serpit ossis iniuria: quā vlcus fuit. Abscessus  
 ossiū priusquam corruptelā trahant, partim melo-  
 tide, partim è sanie cognosci possunt. Hinc enim *Abscessus os-*  
 sifordes vberior, & vi maiore, quā pro vlcere, scatu- *sis.*  
 rit, eaq; tenuior est, non crassa, vt à carne, non gluti-  
 nosa, qualis est à nervis, neq; vnguinea, vt ab adipe  
 diffiuit. Adhæc in abscessu ossis oræ vlceris diffidēt  
 magis, ægrè coalescunt, & interiore quodam motu  
 vitiū significatur. Saniosis ossibus medicamēta cō-  
 ueniunt quæ plurimūm siccant. quorū materia ex *Medicamenta*  
 capite de purgātibus pharmacis petenda est. Quæ *in saniosis os-*  
 in superficiē extat caries, ea sola radula eximi potest, *sibus.*  
 sed ab igne tutius remediū est. Corruptū os ad viuā *Corruptum*  
 scobem eliminandum, exterebrandum, inurendum, *os.*  
 excidendū, peramputandum quoq; totum est, vbi  
 desperatur malū. Miserum quidē, sed vnicū præsi-  
 diū, & instanti exitio præferendū. Vbi ergo vlcere  
 k 3 conciso

## INSTIT CHIRVRGIC.

conciso vel amputata carne os vndiq; nudatū est; quod videatur pingue, nigrū, aut cariosum, semel iterūmve inurēdum ferro, aut scalpro deradendū, donec iā aliquid cruoris ostendatur, quæ integritatis nota est. Qui radit hæc, audacter imprimere ferramentum **debet, vt** & agat aliquid, & maturius desinat. **Finis est, quum in nigritie ad os album, in carie ad solidum ventum est.** Neque alia faciendæ sunt, cum in summo osse iniuria est. Sed hæc vitia aliquando secedunt oleo feruente, aquis quas fortes vocāt, & molliorib. cauteriis, de quibus capite de pyrotic. Nonnunquā etiam matura putredine, modò per se, modò leni tractu decidunt. Quòd si malum aliū descēdit, caries quidē specillo tenui explorari debet, quod vt cedenti ossi aliū infigitur, ita lōgius caries procedit. Nigrities colligi potest ex dolore & febre. Quæ vbi mediocria sunt, illa altè descendisse non potest. Manifestior tamen adacta terebra. Nam finis vitij est, vbi scobes nigra esse desiit. In maiori carie, maior asperitas & inæqualitas ferroprehenditur, & hoc quidem minus firmiter inhæret, & cito elabitur loco, cui impressum est. Igitur caries tota sæpius versata terebra excalpenda est, ex quo candente ferro foramina perpurganda, vt iam nullo affluente vitio, lacuna carne repleatur. At os quod vel nigrities totum peruasit, vel excedit caries, excidere oportet. Exciduntur ossa ferè in capite, pectore, & mēbris, eaq; modo scalpris, modo terebris & modiolis, quorum omniū ratio à Galeno, Celso & aliis tradita est. Syderatū membrū nō tam crudeli, quàm miserabili auxilio semel peramputandū est, in quo quicquid corporis

*Excisa ossa.*

*De excidentis ossibus.*

*Peramputatio membri.*

corporis emortuum est, lacerandum scalpello, & nouacula excidendum est. Siquid autem viue carnis, nerui, venæ, arteriæ superest, nec vrget casus, quâ parte corruptela definit, vincula arctissimè cōstrin-  
gēda, vt ea omnia defecta alimēto celeriter exole-  
scāt. Quod quum euenit, ea corpora ferro, vt prius,

*Vnde mort.  
amputatis  
membris.*

& nouacula excandā sunt. Hæc autē, quia nō pla-  
cuit Hippocrati corpus etiamdū viues ferramentis  
irritari, ne inde commotus dolor, hæmorrhagia &  
animi deliquia (quod ferè fit) ægrum è vita tollant.

*Alia ratio.*

Alij maiora vasa & neruos prius designant, medias  
carnes interfecant, & illa ipsa ad sanam partem filo  
illaqueant, vt intabescant mora, & sponte sua deci-  
dant. Quæ etiā arte hæmorrhagias & contusiones  
magis declinēt. Iam verò legitima ferra sit, & bene  
cōparata, quæ quàm celerrimè trāscurrat. Linteū  
interponi potest vino vel aceto madens, quâ parte  
cōmotā ferra viuentem carnem affricat, ne scilicet  
exasperetur caro, & profluiū sanguinis moueatur.  
Præfecto osse reliquæ partes contra hæmorrhagias  
cauterio inuruntur. At si viuentē osse circumductā  
caro emortua est, priusquàm malum in os transeat,  
excidenda illa est, & iniectis vinculis, omnis adi-  
tus, quo sanguis ad os decurrat, intercipiendus est;  
imperāda vitæ parsimonia, & ea alimēta quæ facile  
diffuant, nihilq; succi crassi lentiq; gignant, vt  
os ipsum cum suis vinculis paulatim emarcescat, ac  
tandem excidat. Ad celeritatē operis vbi vtrumque  
licet, maluit Hippocrates in articulis quàm medio  
mēbro ossa rescindi. Reliquis iniuriis ossium ferè  
accedit vlcus, idem astrictioribus linteis & ferulis

*Vicēra con-  
iuncta mēbris  
ossium.*

## INSTIT. CHIRURGIC.

ribus pharmacis, illud autem aliorum vlcerum le-  
gibus curari debet. At non antè vias claudere oportet quæ per vlcus ad ossa pertinent, quàm hæc sedulò explorata, & omni carie, sorde, nigredine per-  
purgata sint. Quin & præclusum iter patefacere oportet, & angustias ferro ampliare, deinde spògia molli aut penicillis implendù cauum, vt ne coeat, sed dehiscat vlcus, dum vel integendum carne, vel ferruminandù callo bene purù os videatur. In altis cuniculis spongia, linamenta, penicilli summa parte religantur filo, quod foras propèdeat, vt in tempore facilè reducâtur. Vt autem quæ succrescit caro toti suo ossi coalescat, purù os esse & siccum necesse est, inspergendumq; medicamētis, iride, māna, aloë, myrrha arido thure, aristolochia, & eo genere cephalicorū, quod capite de Sarcoticis descriptum est. Sed quæ continetur ossibus caro generatur, vt paulò siccior futura est, ita magis siccātibus gaudet, quo genere etiam deterfa, rasa, exterebrata ossa cōspergi debent. Vt verò ducēda carne ab ossibus recedis, ita vis siccantium temperāda est, donec iam cicatrix trahenda sit. Ac carne replere ossa, & fissa iungere sæpenumerò opus est, vbi callū gignere non licet, nimirum dissidentibus fracturæ labris, & vbi in maiorem circulū vel os ipsum maius excisum est, verū multò stabilius vinculū callus est.

*Regeneratio  
carnis in vi-  
tibus ossium*

*In fracturis  
cum vlcere  
ratio ferula-  
rum & lin-  
teorum.*

In fracturis cum vlcere, si quidem trāsuersum hoc est, idemq; magnum, ferulis abstinendum, in recto vlcere ferulæ ad latera cōmitari possunt. In vtroque maior copia fasciarum adhibenda, quia declināda astrictio, cōfirmanda tamen deligatio est, quod vel astrictio vel copia linteorū efficit. L. inteorū mul-  
tudo

titudo astrictioribus fasciis præferri debet, ubi molle corpus & cū fractura vlcus est. Astrictior deligatio & vi maiore confixæ ferulæ sæpenuerò syderant partes, atque exulcerant. In tumore, vlcere, inflammatione & dolore ferulis & omni astrictione interdiciendū. Ferulas Hippocrates septimo primū die, sublato metu inflammationis, adhibet. Nostri statim initio. Albucaſis in leui malo primo die in grauiore vitio quinto vel septimo. Solutis ergo linteis & refixis ferulis, si quid computruit, excindendum ferro, priusquam ad implendam carnem veniatur. Videndum quoque priusquam impleas, vt omnis diuissio ossis tuto cohæreat. At si qua squama aut fragmentum excesserit, ea suo ossi sedulo coaptanda sunt, aut si acumine carnem subintrant, molliter præcidere oportet, etiā diuissa carne & excisa, si res exigit, verū in columis fragmenti radix, quæ ossi suo etiā dum hæret, seruanda est. Alioqui scalpello vel ferrula leniter elimināda, aut vossella prehensanda est. Quòd si nihil molestiæ squamæ adferunt, neq; possunt suis ossibus reconciliari, vel medicamentis detrahes, vel ita fines, donec maturitate quadam per se decidant. Sic enim celeriter cogetur callus, & caro ossibus concreſcet. Quæ verò squamæ rapiuntur ferro, necdū maturè violentia reuelluntur, fistulas ægrè sanabiles relinquūt. Hic ergo declinanda vis est. Squamas detrahūt medicamenta in cephalicis descripta. capite de Sarcoticis, erucæ radix, vtriusq; bryoniæ, cucumeris agreſtis. Aristolochia peculiariter elicit testulas caluariæ. At qui demenda ossa sunt, medicamentis ficcari cōuenit, ratione vitæ simili, cauterio, radula quoque atteri,

*Syderate partes nimia astrictione.*

*Squama.*

*De detrahendis squamis.*

*Medicamenta.*

# INSTIT. CHIRVRG.

*In fractis & luxatis multis cura.*

*Desperata.*

*Non statim reponenda ossa.*

*Quando reformanda luxatio. Contra conuulsiones.*

vossella molliter agitari, perforari terebrâ, vt maturius, vell sponte sua, vel leui cômotione excidant. In fractis ossibus & loco motis multarum rerum cura est, ac circa initia omninò prohibēda fluxio, dolor, inflammatio. Os ergo quod vel abiit articulo, vel fractum dissidet, primùm quidem reformare atque cōstituere oportet, deinde ita cōtineret vi ne recidat, postremò confirmādum callo, carne, resiccatis humoribus, qui colligantia vincula relaxent. Primùm tamen ineunda ratio, an reponi possint, deinde an sine periculo reponātur, postremò qua arte conuenienter & celeriter, nimio dolore ac molestia reducātur. Concisis articulorum vinculis, dissidis cartilaginibus desperatio est, eumq; bene agitur cum ægro, si solùm claudicat, si mào mēbro, si deformato & obtorto articulo superesse datū est. Non reponendū (inquit Hippocrates tibiæ os quâ parte suo vtrinque articulo copulatur, siquidē rescissa cute per vulnus prominet, alioqui cōnuulsio, phlegmone, gangræna, syderatio cōmouentur, quæ ægrum breui momento è vita tollant. Quæ vt declines, quàm vt os reponas, potiùs cogitādum. Reformanda luxatio primo die, vel certè altero. Nam tertio & quarto quiescere oportet, quo ferè tēpore nouæ iniuriæ sese proferūt, hinc ad decimū tutior reponendi occasio est. Quòd si restituto osse cōnuulsio incidet, rursus articulum excludas, calida liberè irrigabis, fouebis oleo, & molli lana conteges. In luxatis & fractis ossibus hæc sunt præcipuè, τὰς, vel si mauiis, ἀντίτασις, διαπλάσις, ἐπίθεσις, ἀπόθεσις, vel ὑπόθεσις. Extēditur membrū manibus prehensum, vel iniectis laqueis, vbi vi maiore opus est, vt

est, ut diductis & adductis marginibus solati ossis  
 oræ oris molliter cōsueſcant, nihil exasperetur, ni-  
 hil diffringatur, quod in fracturis dēticularibus, ſca-  
 bris & ferratis ſæpè contingit. Videndum quoq; ne  
 in diſtentione neruus, vena, arteria, muſculus, tē-  
 do, ligamentum, atque inde os & mēbrum contra  
 naturam extorqueantur. Sed in luxatis, cōpages ar-  
 ticuli & oſſium copulatio prius recognoscēda est,  
 quàm multis, longis, prominulis & obſtipis capiti-  
 bus conſtet, quot, qui ſinus & acetabula, quam alta  
 hæc, quomodo inflexis alueis decliuibus, lubricis,  
 quibus ſcilicet capita illa & externa oſſiū tubercu-  
 la inferantur, quæ ſuperciliorū formasqua fide cer-  
 uices oſſiū cōtineantur, quibus vinculis iūctura ar-  
 ticuletur, quæ cartilagineſ intercedāt, qui tendines,  
 muſculi & nerui ad conſtantiā articuli concurrant,  
 in ſumma, qua omninò ratione flectant, tendant, di-  
 uertāt, atque vno verbo, copulentur. Vertebrae du-  
 plici capite prominent, duplici quoque acetabulo  
 ſinuātur, altera alterius acetabulis ſua capita infe-  
 rit, eadēque paria faciēs, & quaſi relata gratia ſuos  
 alueolos explicat, in quib. vicinæ vertebrae ꝑceſſus  
 reponantur, muccoſis vinculis vitæque cōiungan-  
 tur, quæ ſoluta, cæſa, arefacta, diſtacta morbo, ver-  
 tebras exarticulāt. Quas iam cognoscas ægrè refor-  
 mari, quia ſcilicet intelligas quàm multis cardinib.  
 quæque ſocietate cōcāt, quā deniq; vario implexu  
 conſerātur. Itaq; omnis articulata iunctura ſæpius  
 oculis ipsis vſurpāda, ſicq; animo & mēte cōcipiē-  
 da est, ut ad viuum preſſæ articulorū formæ cū res  
 exigat, oculis ipsis, ut ita dicā, obuerſentur. Sic.n.  
 explicatur opificiū naturæ, quod in fractis & luxatis  
 ſedulò

*Cognoscenda  
in luxatis.*

*Exemplum  
in vertebra.*



# INSTIT. GHIRVRGIC.

sedulò persequamur. Atque omnino qui extendit, componit, ligat, continet, hoc efficia, vt iusta natura teneatur *κατάστασις* Sic enim Hippocrates, quod naturali figura membri & partis Galenus definit. Extensum membrum loco redditum manibus tractari, palpari, & legitimè cōformari debet *διάπλασις* appellant. Quòd si neque sic constitutum est, ad *μοχλίαν*, lorum, habenas, & vsitatas machinas veniendum. Quæ omnia ex libris Hipp. & commentariis Galeni petenda sunt. Sequitur *ἐπίδεξις*, quam *καταρτικὴ* appellant, in qua multorum prouidentia est, sed maximè vt contineas, phlegmonem arceas, & procures callum. Ac primùm an sit deligandum, statuere oportet, tum qua deligandi forma, ac ferè à duobus principiis, varia tamè ratione. Ex quo decernendum quibus, quàm multis, longis, latis, quàm denique firmis fasciis opus sit. In splenis eadem versetur cura, idonea forma linteis quærenda est. Cognoscendum præterea vnde primum ineas, quæ sit futura progressio, quàm multi & quales circuli, quo modo distinguantur orbes, qui conueniant anguli, quibus interuallis, vbi & quando laxior vel adstrictior deligatio, qua parte desinat, quo loco & qua arte neantur nodi, acia ducantur, complicantur habenæ, quando regulæ, ferulæ, puluinaria, mitellæ, adhibenda sint, quandiu continere omnia, & quando soluere oporteat. Atque in sano membro probanda prius deligatio, quàm in ægro periculum facias. Postremò in ea figura collocandum membrum, in qua diutissimè constare possit, & minimè doleat. Iustos hæc commentarios desiderant, & hæc non tam docendi, quàm monendi causa

di causa dicta fuerint. Neq; ignorandum vnum os parum extendendum esse terebra, minúsq; inurendum, semel enim vltum ægerrimè tum callo, tum carni, recóciatur. Ac nec minima cura esse debet, vt ne diutiùs os apertum expositúmq; aëri maneat. Grauis enim ea consuetudo noua est, quia sic calor insitus aërem expirat. Sunt igitur tecta, & quàm minimùm licet nudata ossa. Sic enim conclusus calor, & non exhalans, saniem foras expergit, atq; ita purgata ossa celerius coniungit. Extorta valgo-<sup>In variis & valgis deligatio.</sup>rum crura pertractis intro vinculis & astrictis asserculis ita componenda, non quasi dirigas, sed non aliter quàm si à valgo varū transformare velis. Inflexis varorum cruribus aptanda omnia & colliganda sunt, quasi è varo valgum efficacias. In abscessu<sup>Abscessus ossium.</sup> parua ossium deligatio *καταματικὴ* locum habet, sed paulò laxior & sine ferulis. In magno non est deligandum *καταματικῶς*. Satis faciūt splenia vino insuccata nigro, subaustero, quæ deinceps atq; conuenienter hinc inde adhibenda sunt, nō vt hoc illi infideat. Longiora sunt, quàm quæ solū ambitum membri comprehendant. Nam si quadrantalibus<sup>Ratio spleniorum.</sup> esse oportet. Obliquè inseruntur membro & aduersa parte decussant. Atque hæc quidem spleniorum ratio alia quum os abscedit & saniosum est, alia eorum quæ in deligationibus fascias confirmant. Hic enim æqualiter affinguntur membro, ne alterum extremum alteri infideat, aut reduplicet, quum videlicet longius splenium est, nè breuius atque decurratum inane spaciū, & quasi fossulā relinquat. Ab vtriusque spleniis tum que longiora, tum

## I N S T I T . C H I R V R G I C .

*In iugulo & costis.*
 tum quæ breuiora sunt, inæqualis, aspera, & incô-  
 cinna fit deligatio, in qua æqualitas vel maximè  
 quærenda est. Alia rursus illa ratio est à plagulis,  
 quæ fracto iugulo & costis adhibentur, quarum pri-  
 ma atque altera in decussim collocantur, & se in-  
 tersecant, & tertia porrigitur in longum, obstipat fra-  
 ctura, & reliqua splenia confirmat. Aliter quoque ut  
 sunt vitia & partes commutantur. Sed hæc peculia-  
 rem commentarium requirant. In fasciis remedia  
 adhibentur, quæ madorem linteorum contineant.  
 Sic enim prohibetur dolor atque inflammatio. Fa-  
 sciæ initio plures & astrictiores, si neque dolor, ne-  
 que phlegmone, non vulnus, aut aliquid tale pro-  
 hibeat. Ac ferè inebriantur vino crasso, nigro, mo-  
 dicè austero. Vinum hoc superficiè cogit, vim suam  
 ad repellendum altius imprimi, ex quo præcidit  
 inflammationum causas. Quod nimium adstrin-  
 git, dolorem facit, tenue, album, giluum, fuluum, e-  
 tiam si contrahat, repudiandum tamen est ut totum  
 reprimetium genus, quod aqueo humore solutum  
 est, papauer, mandragora, cicuta, multò magis si in  
 articulis & nervosis partibus labor est, quia nò so-  
 la qualitas, sed & horum corpus intrò penetrat, &  
 nervosa lædit. Hinc etiam calor qui vitam fouet,  
*Lintea ma-  
dere opus est.*
 interdum extinguitur. Vino igitur crasso, nigro mo-  
 dicè austero, fasciæ & splenia saturentur. Minister  
 adsit, qui subinde affuso vino lintea perfudat, alio-  
 qui cum periculo resiccantur, quod ne fiat, noctu  
 præcipue & æstate providendum. Hyeme vini lo-  
 co œnelæo uti satius est, quo etiam tempore prius  
 intepuisse iuuat, & succidæ lanæ spleniis præferun-  
 tur. In fracturis & luxationibus ubi exertum os est  
& vlcus

& vicus facit, quoque cum periculo reponatur, <sup>Quando la-</sup>  
 quandiu conuulsio in metu est, abstinendum fasciis, <sup>na succida</sup>  
 & succisa lana vtendum est. Eaque, vt prius, im- <sup>pro fasciis re-</sup>  
 buenda vino, curandumq; est vt assidue irrigetur, <sup>tendum.</sup>  
 & non squalescat. Astringit leniter lana hæc, & tepido calore fouet. In his fumoso vino & nimis odoro ideo abstinendum; quòd caput feriat.

Atque hæc omnia decreta sunt veteris discipli- <sup>Alia quibus</sup>  
 nae, quæ Galeno probata sunt. Iustum quoque in- <sup>fasciæ im-</sup>  
 candis linteis medicamentum ad dolores & inflam- <sup>buuntur.</sup>  
 mationes, cui candidum è rosaceo vel myrtino fr- <sup>Ceratum al-</sup>  
 ctum. Alij contra eadem vitia aceto, oxelæo fascias <sup>bum.</sup>

imbuunt, detur id bene carnosâ parte & sine vlce-  
 re. Quòd si suspecta est ministri cura, qui negligenti-  
 tius fascias respergat, & nouo madore cõpluat, vnde  
 lintea exarescant, cerato albo vtendum erit. Adde  
 quòd cura illa odiosa esse potest. Verum ceratum  
 hoc vt repellat, & phlegmonem inhibeat, vno mi-  
 nus est efficax, & magis vsurpandum post initia, iam  
 abeunte periculo inflammationis, vbi fractura sim-  
 plex, nec in fragmenta varia contritum os est. Igi-  
 tur cerato pars ægra, fasciæ & splenia ilinātur, ad-  
 hæc extremæ partes, sed manus præcipue & pedes,  
 ne quod deligatione extringitur, infirmum scilicet  
 frigidumque membrum concipiat, ex quo putredine  
 tandem corrumpatur. Ceratum hoc <sup>Compositio ce-</sup>  
<sup>κρηνη</sup> <sup>καταχυματι</sup> veteres appellarunt. E cera pin- <sup>fatæ albi.</sup>  
 gui & duplo oleo conficitur. Oleum sit recens  
 rhodinum vel myrteum, Quòd si cera vetus fue-  
 rit, nec ita mollis, paulò plus olei miscendum erit.  
 Picato quoque veteres vsi sunt, si quid contusum  
 esset, si quid coquendum atque mitigandum

πικρὸν

# INSTIT. CHIRURGIC.

*Picatum cera-  
rum.*

*πικρήδων κηρώτην & πικρόκηρον* appellant. Eoque magis vsurpandum, quia confusa omnia & cruda, quæ ossibus incumbunt, quæm celerrimè sanie fecisse iuuat, ne subiecta ossa tempore corrumpantur. Atque hoc præcipuè in caluaria deinde reliqua ossium natura, magis etiam qua parte subsunt nervacea corpora, procurandum erit. Liquido cerato albo pix addita picatum facit. Ac tantum picis misceatur, vt inde color in nigrum trāseat, verum cerati corpus non immutetur. A pice molli vtrunque prætari potest, hæc enim media compage inter oleum & ceram ambigit. Quæ cera durior, vel huic pariter dura est. Mollienda manus itaque oleo inquinatur, atque hinc ad ignem pix illa pinsitur, voluitur, contrectatur, dum satis emolleſcat. Alioqui ceræ & picis oleum non duplum, sed ferè triplum misceatur, vt picatum inde coëat quod tam liquidum sit, quàm ceratum album esse opus est. Sed in confusis liquidius conuenit, vbi mitigandum. Ad coquendum iustiori corpore compingi debet. Eadem seruandæ leges hac parte, in eo quod *πίττον-  
ρον* appellant, resina ceræ mista. Ac resina liquida, qualis est larigna quædam & terebinthina, ceratum nimis diluit, nisi admodum exigua misceatur. Resina cōpage ceræ seruabit cerati corpus. Dilutum est ex ceræ ℥. 1. terebinthinæ liquidæ ℥. 3. olei ℥. 2. Solutum quidem & molle est, non dilutum nimis, ex ceræ ℥. 2. Colophonix ℥. 1. olei ℥. 4. Corpulentum satis vbi ceræ & resinæ vtriusque ℥. 2. olei ℥. 4. permiscentur. Sed de cerato quod resinam capit, plura capite de suppurantibus. Verum in luxationibus hoc cerato præcipuè vtendum, quia scilicet articulatæ

*Vis cerati re-  
sinati in luxa-*

articulata ossa magis cōtinet, & hinc lintea firmiùs affiguntur, hærent diutiùs, vincula verò humore laxa & victa melius exiccantur. Fracta deniq; firmiùs cohærent, & callo suo fidelius cōpinguntur. At quæ sine lētre linteis capiuntur, quale austerū vinum est, ante resiccantur, quā solvere oporteat. Ac tertio primum die ferè absolvimus. Sicca autē lintea duritie & asperitate lædunt, elaxatāque minùs continent. Hæc ergo ratio magis ineunda, si quando periculū graviùs metuitur, atq; ideo cura maior desideratur. In his vitiis ossium magnus *διὰ χαλκίτιος* vsus est. In metu inflammationis mollitur subduplo rosaceo, deinde austero vino imbuitur, illinitur parti, & in linteis adhibetur. Ex *Contra inflammationes.* aceto vini loco subigi potest, si neque vulnus, neq; neruacea natura, neque aliud quicquam prohibet. Contra œdemata & inflationes, quæ astrictione *Contra œdemata.* linteorum extuberant, idem medicamentū auxilio est. Omnia verò leuia sint & mollia, grāuitas enim opprimit, & dolorem creat. Idem durities efficit & exasperat, vtrunque callum retardat. Perfusiones fiunt ex aqua tepida, eo calore téperata, quem ma *Perfusiones.* nus perferat, in frigoris hydrelæon melius est. Perfunditur pars tertio & quinto die, quoties videlicet lintea absoluuntur, idque liberaliter, vnde prurigo acquiescat, & materia eius in halirum dispergatur. In articulis tepidæ vsus est, tensa relaxat, dolore *Contra pruriginē à deligatione.* mitigat, & inflammationi aduersatur. Iam septimo die tardius aliquando affunditur, non ut discutiat, sed euocet sanguinē, vnde concreto poro ossium fracturæ conserantur. Capitis fracturas neque vino, neque re alia, nisi quā minimū, madefacere

# INSTIT. CHIRURGIC.

*Decoctum  
vlmi.*

*Callus.*

*Quando gi-  
mendys cal-  
lus.*

*Alimenta ad  
poron.*

facere iussit Hippocr. Dioscorides ex veterum vsu corticem vlmi aqua incoquit, decocto fracturam fouet, & os perfundit quodiam egere callo videatur. Id de radice vlmi, nō cortice Galenus prodidit. *Πάγουρι*. Græci vocāt genituram calli, & inde *πα-  
γώτινα*, quæ callum gignant. Callus neque caro est, neque os, sed inter vtrumque ambigit, itaque de-posito metu inflammationis purgatis vitiis, quæ curam tardent, omninò cogitandum vt coeat porus, & inde affractæ partes solidetur. Ea quæ cura septimo primùm die ferè suscipitur ætate, decimoquar- to hyeme, quo iā tempore id genus periculis per- functa ossa videatur. Etenim intra ea spacia febres & phlegmone magna ex parte sese proferunt, quāquam aliquando latente vitio, & maleficium tra- hente vicesimo die & post vicesimum, nec opinan- tibus nobis eueniunt. Neminem vero latere arbi- tror non antè de poro cogitandum, quam contusa, in pus versa, deterisa vlcera & siccata, ossa quoque bene explorata fuerint. Hic ergo generatur callus, vbi moderanda perfusio, vt inde pars viuido colo- re floreat, & leniter attollatur, nimium est si subsi- det: & pallorem ducit. Fistulosa ossa & spongiosa, quæque plus humoris in se cōtinent, celerius coa- lescent, & callum contrahunt, quod in iugulo & id genus ossibus comprobatur. Alimenta sunt quæ probum sanguinem, crassum, viscidum, multum gi- gnant. Panis triticeus è farina primaria, triticum le- gatur gaue, densum, vnde ptisana cōparetur, car- tilagineæ animalium partes, neruaceæ, cutaceæ, pin- gues, ligamēta, tendines, tetioli, ventres lingue, ro- stra, capita hœdorū, veruecum, & porcellorū, agni-

na

na caro & suilla, palmulæ pingues, castaneæ, vinū  
 astringens, &c. generis eiusdem. *Medicamenta*  
 to emplastica, lenta, quæ modicè calfaciant, & sic- *porotica.*  
 cent è gyri similia, manna gummi, fabrili glutine,  
 mastiche, tragacátha, pingui cera, lachrimis & suc- *Triticea fari-*  
 cis generis eiusdem. Triticeam fariná probat Hip- *na.*  
 pocrates, quæ subacta longiùs trahatur, digitorum  
 sequax, hæc, vt reliqua liquore oui, myrrino, aqua,  
 vino, mucagine concorporatur, dum lentore quo-  
 dam bene cohæreat. Qualis si defit, & aridior tan-  
 tum ad manum est, thus pingue, eiusque pollinem  
 & fuliginem, liquidam resinam, mel quoque visci-  
 dum permiscebis. Sed alia quidem initio, resinam  
 & mel post initia, cum iam excesserit periculū in-  
 flammationis. Thus quoque in limacum mucco &  
 salua, aloë & myrrha, mel etiam, si quidem resiccā-  
 dum magis, in eodem mucco diu volutantur, & in  
 aluta impinguntur. Finge igitur aduersa parte ef- *Exemplum in*  
 fractum nasum, vt intro desideat. Eodē die aut non *naso fracto.*  
 multò post reformare oportet. Itaque quicquid in  
 cartilaginem incidit, excitandū leniter est subiecto  
 crassiore specillo, qua maximè parte delabitur  
 quod fractū est, vt sublatū mollitur suo corpori de *Specillū narium*  
 center coalescat. Lene fit specillum non asperū, ad *fracturum.*  
 digitelli formam fabricatum è buxo vel ebore, di-  
 gitis quoq; vtitur Hippocrates, sed præfert indices  
 vt qui narium cauis magis cōueniant. Ac suis quis-  
 que uti potest, alioqui magnitudine respondeant,  
 sintq; molles, quales pueri habent & mulieres. At-  
 que hos diutius insistere oporteat, vt quæ reforma-  
 ta iam sunt, contineant. Alioqui in longitudinem  
 implicata linamenta, & molli pellicula cincta cir-  
 cumsutaque



## INSTIT. CHIRURGIC.

cunſutæque intus adiicienda ſunt. Aut eodem modo compoſitum aliquid eſt arido penicillo & ſim-  
briis linteorum. Aut grandis pinna gummi vel fa-  
brili glutine illita, & molli pellicula circūdata, quæ  
deſidere cartilaginem non ſinat. Alioqui fiſtulas &  
tubos plumbo, argento, canna ad hanc rem compa-  
rare oportet. Fruſtulo pulmonis ouis aliquando v-  
ſus eſt Hippocrates, quod fortè aderat. Spongia nõ  
utendum putat, quia fortasſe humore raptò extur-  
geat, diſſoluâtque iuncta. Abſtinendum quoque  
omnibus, quæ vel vehementer ſpirent, vel grauiter  
oleant. Omnia verò memoratis medicamentis il-  
linenda ſunt. Vinculis autem & habenis illis ex a-  
luta molli non ita opus eſt, etiamſi quod fractū eſt,  
in latus torqueatur, ſi modò repoſitum aliis arti-  
bus contineri poteſt, vt plagulis, quas viſcida illa  
pharmaca inquinēt, & iis ſimiliter comparatis, quæ  
intrò naribus inferuntur. Emplaſtra quæ pertina-  
ciùs hærent, fotu tepidæ reuellūtur. Atque hinc ad  
catagmatica, de quibus antea. Sed horum materia  
in præſentia locupletanda nobis. Caninum cere-  
brum in linteo adhibetur, ſuperdatur lana incul-  
cata oui candido, iam ſqualeſcens commutari de-  
bet, quatuordecim diebus ſolidat. In Sardinia fon-  
tes eſſe calidos ſcribunt, qui fracta oſſa ſolident. Vi-  
num picariū in lana ſuccida efficit, vt luxata cele-  
riùs coeant. Purgatur hybiſci radix, atque hinc me-  
dulla raſa in ſplenio adalligatur. Poteſt adiici triti-  
ci farina, & cum liquore oui ita ſubigi, vt ſit cata-  
plaſma, radix illa aquam coagulat, in qua ſub dio  
horas aliquot maduerit. Muſco viticis vtuntur ve-  
terinarij, quernum alij, alij in vltimo lectum præfe-  
runt.

*Caninum ce-  
brum.*

*Hybiſci ra-  
dix.*

*Muſcus.*

runt. In honore est veteri exemplo quam conseruam vocant. Muscus est densus, herbaceus, spon- *Conserua.*  
 giosus, hærens aquatilibus petris, cuius efficax natura nobili historia consignata est. Putator quidam *Historia.*  
 ex alta arbore deciderat omnibus ferè ossibus con-  
 fractis. Præsto aderant amici, qui corpus eius vni-  
 uersum eo musco obligarunt, atq; ita relatum do-  
 mum in quiete tenuerunt. subinde conspersa aqua  
 ex eo flumine, quod muscum alluebat, ne videlicet  
 muscus emarcesceret. Rarò nec nisi deficiente her-  
 ba remedium mutatum est. Atque hac medela in-  
 credibili celeritate cõualuit. Æstate bene carnosio  
 duròque corpore, recenti malo exẽplum vetus li-  
 ceat imitari. Vetus est & vulgò familiare auxilium  
 in iis, qui ex alto præcipites aliquid fregerunt, aut  
 contuderunt. Pellis ouila recens detracta corpori *Pellis ouila.*  
 affigitur, quæ myrteo tepido vel rosaceo perfundi  
 potest. Sed eos præcipuè iuuat, quibus aliquid  
 cruoris in cutem diffusum est, concoquit enim ac  
 digerit. Poroticò est, farinæ triticeæ ʒ. 6. sanguinis  
 draconis, mastiches, thuris, sarcocollæ ana ʒ. i. om-  
 nia oui candido iuncta in linteo vel aluta alligan-  
 tur. Triticea farina, gummi & manna incoquantur  
 aqua, fit cataplasma quod reprimat, continet, & po-  
 ron gignit. Atque hic possunt è tragacantha, gum-  
 mi, sarcocolla & aliis id genus mucagines colligi  
 ad cataplasmata, è pauca materia ferè, sed decu-  
 pla ad muccaginem conficias. Iam verò celeberrim-  
 um, & medicinæ veteri decantatum remedium,  
 Isis appellatum, quod in neruorum vitiis describe- *Moschionis.*  
 tur. Laudatum quoque Moschionis catagmaticon,  
 inserto callo vulnera coniungit, contusis testiculis  
 1 3 & aliis

## INSTIT. CHIRVRGIC.

& aliis partibus medetur, hydropicos liberat. Exerta sedis tubercula reprimat, & rhagadas sanat dilutum butyro, gutturosis remedio est, omnem durtiem dissoluit, luxatis & contortis articulis prodest, clauos adimit, qui in pedibus & manibus sine ulcere excitantur, atque omninò multiplicis usus est. Cuius mistura sic habet. Lithargyri, picis, seu vitulini ana ℥. viginti, terebinth. vnc. decem, manne, thuris tantundem, ceræ vnc. 5. æruginis vnc. 1. opopanax vnc. 1. galbani tantundem, olei ricini, aceti, succi mori ana heminam vnam, picis liquida hemina dimidium. Lithargyrus leuissimè teritur, & fictili vase vel æneo cum ricinino coquitur, vbi efferbuerint, adeps & manna iniiciuntur, assidue mouentur dum coeant & spissentur, hic pix, cera resina admiscuntur. Iam non inquinantibus galbanum immittitur, deinde ærugo & opopanax aceto resoluta. In alio vase mori succus & pix liquida ad crassitudinem cocta cæteris permiscuntur, coquuntur rursus ad puritatem, ex quo in vas aliud, quod vinum habeat, deponuntur, atque ita permittuntur triduum, postremò ex eodem vino pista ad usum reponuntur. Adhibetur pharmacum in linteis, & in aluta fractis ossibus intenditur. Alioqui è duplo rosaceo dissolutum non aliter quàm ceratum albū fasciis illinitur & plagulis. *Ægyptia* Andromachi mollit, digerit, adstringit, vulnera cruenta iungit, & alia adiuuat, vomicas exigit, permagna vulnera ense facta etiam profundissima triduo glutinat, præcisos neruos & musculos committit, luxatis, fractis, contusis, attritis & contortis ossibus remedio est, & contra inflammationes valet, dolentes

*Ægyptia*  
*Andromachi.*

dolentes neruos & musculos lenit, ferarum mor-  
 bus adhibetur, lippiētibus & cephalalgicis solatio  
 est impacta fronti, callos emollit, & scirrhus edo-  
 mat, ac breuiter optimum ad plurima remediū est.  
 Describitur à Græcis Galeno & Aëcio, vitiosis iā  
 & corruptis tum Græcis tum Latinis codicibus.  
 Nos ex Galeni sententia ita restituimus. ℞. ceræ, li-  
 tharg. an. denar. 144. ammoniaci denar. 72. terebin-  
 thinæ ℥. 4. & semiss. alias ℥. 4. succidæ lanæ vstæ ℥.  
 2. & ℥. 2. aristolochiæ, thuris, squamarū æris, & sto-  
 matis an. ℥. 1. myrrhæ ℥. 3. aliās ℥. 4. opopanacis de-  
 nar. 2. olei ricinini, sicyonij vel antiqui libr. 4. &  
 semiss. Sic enim Galenus pro sex heminis olei An-  
 dromachi, Asclepiades autē heminas 3. scripsit. Li-  
 thargyrus oleo coquitur dum concreseat, squama  
 iniicitur, vbi non inquinant, cera conspersa mari,  
 vt voluit Asclepiades, deinde ammoniacum sedulo  
 contusum imponuntur, liquatis his terebinthina  
 additur, auferuntur igne, hic thus & lanarum ci-  
 nis insperguntur, refrigerata manibus conuoluun-  
 tur, & vsui sunt. Nigrum catagmaticum Asclepia-  
 dis, quod qua optimum, ἀσκληπιᾶς vocata est, admi-  
 randa in fracturis, etiam ossibus depresso, immersa  
 hæc & ab aliis seiuncta callo copulat. Litharg. bi-  
 tuminis an. ℥. 25. ceræ, picis aridæ an. ℥. 12. & semis.  
 resinæ picæ, terebinth. ana ℥. 6. & ℥. 2. aluminis,  
 propoleos ana denar. 38. ammoniaci ℥. 3. æruginis  
 denar. 10. & semiss. olei sextar. 4. Lithargyrus in o-  
 leo coquitur, dum non contamineat, cera & bitumē  
 seorsum liquefcunt, neque commouentur, his pix  
 fusa traiecta que colo coniungitur, omnia lithar-  
 gyro vniuntur. Ammoniacum verò bene contu-  
 sum

## INSTIT. CHIRVRG.

sum postea immittitur, atque ita coquuntur omnia in solidum corpus, hic præmollita cera & propolis permiscuntur, ubi probe coierint, subducuntur igne, tumque alumen & ærugo in pollinem trita resperguntur, versantur omnia, & oxycrato mersa subiguntur. Panalithes ad cōtusa, fracta etiā cum vulnere, vulnera neruorum & vertebrarum, purgat collectiones, incisum scrotum solidat, venenatos morsus bestiarum sanat, aliaque præstat plurima. Olei dulcis ℥. 9. bituminis, ceræ, resinæ piceæ, picis aridæ ana ℥. 1. lithargyr. cerusæ, æruginis ana denar. 10. thuris, ammoniaci, myrrhæ, aloës ana ℥. 1. opij, succi pomorum mandragoræ ana denar. 6. aluminis, calchanthi, chalciteos, croci ana semunc. aceti quod sufficit. Quæ teri possunt omnia à lithargyro ad crocū in puluerem trita ex aceto conducuntur in mortario, dū sit luti crassitudo. Oleū, cera, bitumen in fabales pilulas diuisum nihil versando colliquantur liquatis pix & resina commiscuntur, colantur omnia, atque reponuntur. Fracturis ossium caluariæ, cartilaginum, vtilissimum est Barbarum, quod capite de hæmorrhagia describitur, & alia, quæ superiorib. libris scripta inuenies. In fracturis prima cura sit, vt initio repellas phlegmonē, & dolorem prohibeas. Tertio iam & quinto die si quid contusum erit, in pus & saniem conuerteres, suppurationem sedulo purgabis, siccabis vlcus, & si qua ossis vitia sunt, corruptela, caries, male iuncta squama, ea omnia diligenter adimes, fracturæ partes rite coaptabis, & callo iunges. At postremū vlcus implendū & cicatrice claudendū est. Contingit aliquando in capitis nuda mēbrana, veminus

*Panalithes.*

*Ordo curationis in fracturis.*

minùs tergēdo siccandoq; quam cōueniat, fungus succrescat, quia videlicet in tumorem laxū & mollem membrana extuberat. Hic ergo siccandum magis, & quæ tergeant, incidant, laxent, intermiscenda. Concreti calli signum est, quum iam sine vlcere exudante sanguine fasciæ intinguntur. Tū enim coactus porus asperginem sanguinis ē spongiosis ossium cauernis foras extringit. Id ferē fit criticis diebus 14. 17. 20. 21. & hinc succedentibus septenariis. Signum quidem à veteribus annotatum, quanquam aliquando sine eo calli concrescunt. Conueniens callus est, qui neque maior, neque minor, durior aut mollior quam oportet, neque distortus est. Iustus callus confirmari debet medicamentis, quæ *ἐναμμα* vocant, quæque cruentis vulneribus adhibentur. Siccant leniter, & callum mediocriter confirmant. Ac de his multa capite de glutinantibus. Callum confirmat affusum vinum, quod *τεθαλασσωμελον* & *θαλάττιον* Græci, Latini salsum & marinum vocant, quod si defit, salem vino leniter adstringente liquefacere oportet. Idem vinum efficit, in quo balauſtia, rosa, myrrha, muscus, qui veluti canities quædam quercui inheret, absynthium, vlmī cortex & radix præcoxerint. Addunt poroticis quæ callum durant bolum armenam, galbulos cupressi, & alia id genus. Sed hic moderatio quædam adhibenda est, ne nimium stringendo nimium alteratur callus. Confirmant poron rosacei ℥. 4. resinæ ℥ 3. ceræ ℥. 2. Colophonix, mastiches, thuris ana semunc. coni cupressi, radices erythrodani ana ℥. 1. Melius fiet autis emplasticis, minuto oleo, & adiecto momento

*Conueniens  
callus.*

*Mista quæ  
confirmant  
poron.*

## INSTIT. CHIRVRGIC.

croci. Al. Thuris, farinae pistrinalis picis, mastiches, boli armenæ ana ℥. 2. sepi arietini, ceræ albæ ana selibr. Liquefactis ceræ & sebo reliqua infriantur, in mistura linteū sæpius inculcatur, & satis inquinatum fracturæ impingitur. Sparadrapum vocant. Utuntur Apostolico & Oxycroceo. Apostolicon materiam attrahit cogendo poro, siccatur, confirmat. Oxycroceum duriores poron magis emollit, quàm extenuet, vtrumque emplastricon, & gignendo callo idoneum est. Iam verò constare arbitror remedia comparari, vt mollis & dura corporum natura est, vt alio callo tibiam messoris, alio pueri conseras. In hoc enim minùs siccantia, minùs stringentia iustum poron contrahent. In messoris fortioribus omninò vtendum est. Callus maior extenuandus est deducta parte alimenti, & mutata qualitate diu leniterque affricanda pars est ex oleo, sale, nitro Eadem calida marina foueri debet, induciq̃ue malagmaris quæ discutiant, quæque contrahant, colligenda arctius, oleribus vtendum & vomitu. Alterum membrum perfricandum, vinciendum molliter, & sinapisimo illinendum, vnde plus sanguinis excipiat. Paulus in recenti callo, qui supercreuit, vehementer stringentia instituit, arctissime ligat, lamina plumbea interdum apposita. In eo verò qui iā vetustate induruit, si quidem pudendum inde ac deforme membrum est, neque officium facit cutem aperit, deradit, poron terebra pertundit lacerat scalpro, quodque videtur superesse, peramputat. Quod si nullum naturæ munus per callum intercidit, si nullus aut non ita conspicuus membri pudor est, nullus denique dolor

*Sparadrapū.  
Apostolicon.  
Oxycroceū.*

*Callus maior*

*Excrescens  
callus recens  
& vetus.*

dolor, præstabit abstinere ferro. Qui verò infra modum crescit, aut non crescit quidem quo iam tempore admotis auxiliis debuit coalescere, alia ratione promoueri debet. Ac ferè tardatur callus, *Vnde tardatur* quia nimium ac sæpius fouetur locus, parum con- *porus.* uenienter adstringitur, sæpius & ante tempus fasciæ resoluuntur. Non raro quoque in ratione vitæ peccatum est. Omnia ergo commutanda in melius, ac de integro ad præcepta artis, ad auxilia & alimenta, quæ callum gignant, recurrere oportet. Quod si atrophiam & inopiam alimenti totius corporis, callus non prouenit, in primis consulendū corpori, deinde affectæ parti, postremò ad curam calli decurrendum est. Sæpè etiam astrictioribus linteis effractum membrum vitium contrahit, atque intabescit. *Extenuati membri curatio.* Hic ergo instauranda vita est, distrigenda ligatio. Ac de remediis quæ ad hanc rem faciant, dropace, sinapismis, & alijs, dicentur quædam capite de Pyroticis. Sed quia hic casus vitiosa ossa interdum sequitur, pauca quoque hoc loco contra hoc genus mali differemus. Extenuatum membrum vehementer iuuat commoda deligatio, sed cōtrā quàm in fracturis. Marcescente tibia femur superius alligamus ab inguine ad genu deducta fasciâ, atque iniitiâ quidem, qua scilicet inguen proximum est, arctior, deinde paulatim relaxatur. Sic enim per communes venas quasi riuulos sanguis deorsum exprimitur. At contabescente dextro femore, vel toto crure, femori sinistro fascias iniicimus à genu ad inguina ductis orbibus, atque iniitiis adstrictior deligatio, astricta quoque, sed minus, quo propius inguen appetit. Quæ quidem arte aliqua pars



## INSTIT. CHIRVRGIC.

pars sanguinis veluti diuerticulo in gracile mēbrū  
recurrat. Sit autem ea ratione temperata deligatio,  
vt neque dolorem creet neque vniuersum sangui-  
nem à sano mēbro reprimas. Hoc enim alere fruga-  
lius, nutrire tamen certū est, quod cum languenti  
membro aliquid proprij alimenti impertiat, reti-  
neat tamē vnde tenuiter, sed commodē, nutriatur.  
Eadem ratio in superioribus membris seruāda est.  
Arescente vlna brachium deligamus, contabescen-  
te brachio vel tota manu, ad reliquam manum vin-  
cula conuertimus, frictione, perfusione, metasyncri-  
ticis vocatis, dropacibus, sinapismis ea ratione vtē-  
dum erit, quę capite de Pyroticis describetur, sunt  
etiam acopa ad mēbra confecta macie accommoda-  
ta, quale est Damocratis. Illinitur à cibo, marcidos  
exuccosque senes reficit, & calore fouet, Hyeme &  
in frigoribus inūgitur dormituris vespere. Ammo-  
niaci, ceræ albæ, mellis recētis, adipis anserini recētis,  
thuris an.  $\mathfrak{z}$ . 10. galbani, medullæ cerui, cæsypii,  
terebinthinę pellucidæ an.  $\mathfrak{z}$ . 4. vini falerni, alioqui  
gilui odoriferi ad circiter heminas quinque, olei he-  
minas 40. Parandum est maiusculo mortario, thus  
& ammoniacum confringuntur, & affuso vino ma-  
cerantur, teruntur, circunducuntur duro cochleari,  
dum sit mellis crassitudo, mel, cæsypus, medulla cer-  
ui deinceps immittuntur, versantur, circumaguntur  
donec cum aliis bene coeant. Dum hæc fiunt, cera  
figulino vase cum oleo eliquatur, ex quo adeps, te-  
rebenthina galbanum permiscuntur, vnita omnia  
transuasantur & spatula comouentur, refrigerata  
pinuntur manibus, postremò aliis in mortario co-  
iunguntur, fitque liquidus bonique mellis crassitu-  
do.

*Acopon Da-  
mocrates ad  
membra ta-  
bida.*

do, stanneo vase vel buxco reponi debet. Nervorum <sup>Distortus callus.</sup> doloribus, perfrictionibus, inflammationibus vteri in pessis vtilissimum est. Distortus callus, si quidem mollis est, laxante fotu & diaphoreticis exinaniri debet, fouetur tepida, hydrelæo, althææ, & similium decocto. Discutitur arida ficu mista stercori colubino. Sed vtrumque genus medicamentorum libr. i. abundè explicatum est, si verò nimium induruit eadem quæ in supercrescente & inueterato poro consilia sunt. <sup>Mollior callus & durior.</sup> Mollior astringentibus firmari debet. At vix durior esse potest, nisi ea de causa fragilior videatur, vbi nouo callo opus est. Est cum in cartilagine, neruo, ossè mucosus humor colligitur infirmitate naturæ, quæ concoquit, albus is est & viscidus, qui similitudine puris medico possit imponere, cedit enim digito pressus atque dilabitur. Is si negligitur, sic ossa afficit, vt hæc inde corrumpantur, vicinæ carnes vitiū trahāt, & mucco elanguant. Ex quo fit, vt relinquunt ossa, societasq; illa & copulatio quæ ossibus est cum carne, dissoluatur. Aliquando quoque in tophos humor ille concrecit, sed de tophis postea differetur, vt de gangliis, quæ inde etiā commouentur. Contusis nervis, ossè, <sup>Mucosus humor quomodo vacuandus.</sup> cartilagine mucus ille magna ex parte nasci consuevit, qui cum crassus sit, lētus & frigidus, & in alto desideat, nō ita facilè vacuari potest. Curandum tamen, vt laxata cute, fusa incisaque materia in halitū & vapores sensim expiret, alioqui facto vulnere repurgari debet, quanquam partium ratio prius, habenda est, alioqui periculum fit, ne vel occidas vel grauiter lædas. Quod in igne similiter animaduertere oportet. Finge igitur contusa costa, fracta, collisa,

## INSTIT. CHIRURGIC.

collisa, coisile mucum, & desperatis aliis auxiliis ad ferrum & ignem decurrendum. Periculum imminet, ne venæ, arteriæ, nerui qui interferuntur costis, conuulnerentur, ne vel ferro vel igne intima membrana violetur. Inueterato malo, inquit Hip. & desperatis aliis remediis, si quidem dolor est, & mucum illum caro lateris concepit, optimum in igne remedium est, videndū tamen, vt neq; os contingat ignis (nisi iam corruptum atque syderatū videtur) neq; superficiem solam transcurrat, sed carni prudenter imprimatur, vt ad membranam nō perueniat. In fractis & dimotis ossibus inflammationū reliquiæ disperguntur, ne inde rigeant articuli, & ad suos motus colligentur. Disperguntur pharmacis quæ molliant atque discutiant, frictione & motu, frictio sit lenis, mollis, quæ paulatim intendatur circumductis manibus modo sursum ac deorsum, modò in latera & orbem, vt inde musculorū fibræ molliantur, & reliqua inflammatio euanescat. Leniter quoque mouendus articulus, vt paulatim & sine dolore naturæ suæ consuescat.

### *De remediis neruorum. C A P. 2.*

*Vitia neruorum.*

**S**equitur neruorum locus, in quo tendines & ligamenta includantur, neque subtilius de nominibus disputetur, qua parte præcipuè rerum nō verborum doctrina requirenda, & cura sedulò suscipienda est. Igitur vulnerantur nerui, contunduntur, dolent, torpent, rigent, contorquentur. Sauciato neruo conuulnerari caro ferè consuevit. Sauciatur, quia pungitur & inciditur. Quod cum accidit, omninò procuretur, vt ne ante tēp<sup>9</sup> os vulneris coeat, & iungatur cutis, vnde sanies nerui suo veluti

*Vulnera neruorum.  
Causa.*

veluti emissario interclusa, nervos laceſſat, atq; hinc  
 oriatur dolor, phlegmone, febris, deliriũ, conuulſio  
 ad quæ horrendæ mortes poſtremò inſequantur. *Vitanda in  
 nervis.*  
 Excludenda ſunt à nervorũ cura, quæ certè nervos *Frigidum  
 quantum no-  
 ceat nervis,  
 hiftoriis oſtẽ-  
 ditur.*  
 contingant quæcunque vel natura ſua vel aduerti-  
 tia qualitate refrigerent, quæcunque acria, quæ hu-  
 meſcent, laxent, molliant, concoquāt, putrefaciāt.  
 Cuidam ad flexum natium qua in femur deſinit,  
 coit, abſceſſus, expurgata ſorde detectus nervus eſt  
 qui frigore percuſſus vniuerſum crus ſtupidum re-  
 liquit. Alteri vulnus magnum in brachium illatum  
 eſt cæſis etiam nervis, qui à cervicis finibus per bra-  
 chiũ decurrūt. Adhibitis iuſtis remediis, lanæ quo-  
 quæ oleo calente tinctæ ſuperdatae ſunt, iſſidemque  
 obſtipata ceruix cõtra iniuriã frigoris. At his egreſ-  
 ſus domo publico ſe dedit, vbi paulatim frigefcẽte  
 lana oleum quoque refrixit, ex quo dolere cœpit,  
 tenſoque membro & ad cervicem uſque progreſſo  
 malo, totus ferè conuulſione riguit. Omnino ergo  
 vi frigoris vindicandus nervus eſt, multò magis cũ  
 vulnus acceſſerit. Frigidum enim, inquit Hippo-  
 crates, vlceribus inimicũ & nervis. Itaque dũ hi cu  
 rantur, quumque inferuntur pharmaca, non ſolum *Hippoc. aph.  
 18. & 20.  
 lib. 5. Aphor.*  
 videndum erit, vt ne hæc imponatur frigida, ſed e-  
 tiam ne vulnus aut certè quã minimũ frigori ex-  
 ponatur. Inuſta ala vetat Hippocrates, ne dum cu-  
 ratur vlcus, brachiũ altius attollatur, veritus ſcili-  
 cet ne ita explicata ala excepto frigore violetur.  
 Idq; metuendũ magis, quũ in vlcere dolor eſt quẽ  
 viſtio cõmouit qualis eſt vbi cauterium impreſſe-  
 ris, deinde etiã ſi locus neruaceus eſt, & aliquid ner-  
 uorũ nudum exiſtit. Grauior quoque iniuria acriũ  
 eſt, *Acria quan-  
 tum noceant.*

## INSTIT. CHIRVRG.

est, quæ cum admota cuti vehementer lædant, ægrum quidem præcipitabunt, si nudato nervo continenter inferantur. Quidam posteriore tibia vulneratus est, qua parte tres illi muscoli in tendinem coeunt, qui calcem cōprehendit, atque hinc in plātam exporrigitur, itaque aperto nervo medicamentum quod habet euphorbium continentur illitum est. Ex quo dolore factō, consuulsis nervis, atroci morte sublati sunt. Tolerabilior fortasse videatur, quæ nihilominus periculosa est medendi via, iam olim Theſſalo & antecessoribus Galeni familiaris. Cuidam ergo diuisa cute cōpuncto nervo vulnerata stylo manus est, huic pharmācum Theſſalus impexit quo cutis coalesceret. Atque inde orta inflāmate cataplasma ē farina tritici, hydrelæo cōcta instituit, ex quo cōtabescēs æger intra septimū diem iugulatus est. Gladiator quidam ad genu quā patella est, & tenuis latusque tendo sese explicat, vulnus acceperat, in quo capta curādi via vſitata Theſſalo, ortaq; inflāmate idem adhibitum cataplasma, calida aqua liberaliter affusa cōspersum quoque oleum est. Atque hoc genere curandi tum hic gladiator periit, tum alij rapti sunt, alij claudicarūt, quibusdā manca, cōtorta, inutilis manus redita est, multis putruere articuli, ac breuiter quibus superesse datum fuit, graue aliquod detrimentum corporis incurrerunt. Colligendum ergo peccasse Theſſalios, qui implexum morbum quai vnum & simplicem curarent, & quum mēderentur morbis, nullam rationem affectæ partis susciperent. Peccatum quoque hac parte, quod calida fōtus, conspersus oleo, & cataplasmate illo inductus nervus est.

Hæc

*Viriosa curādi via Theſſali.*

*Allia inimica nervis.*

*Explicatur Theſſaliorū peccatum*

Hæc enim vt alia genera inflammationum iuuare possint, inflāmati neruorū vulneribus inimicissima sunt. Atque hæc obiter de vitiosa illa curandi via. Nunc autem legitima medendi ratio explicanda, & iusta neruorum remedia describenda sunt. *Legitima curatio.*  
 Atque si lubet, ad curam reuocetur, cui manu stylo vulnerata neruus suffixus est, & alter gladiator, qui *Optimum docendi genus.* ad genu vulnus acceperat. Optimum enim docendi genus atque clarissimū, quod suis legibus quidē & præceptis cōstat, exēplis quoque ita illustratur, vt tota curādi ratio veluti quædam rerum historia *Hypothesis.* sub aspectū veniat, & quasi oculis ipsis vsurpetur. Quæ profectò via hac præcipuè medēdi parte cōsectanda nobis, in qua præcipitia multa occurrūt, & non nisi graui iniuria vitæ aberratur. Itaque ponamus confixū neruum vulnerata manu leue quidem vulgari sensu, at reuera periculosum vulnus, etiam si stylus tā subtilis quā acus pupugerit. Etenim orietur dolor, & ille malorum versus notatus initio cōnectetur, si vel negligas, vel aliena remedia instituas. Quæ omnia duplici ratione defugere oportet. Primū quidē iusta medēdi via, deinde vbi remediis nihil proficias, præfecto neruo, vnde grauioribus illæ iniuriæ cōmouentur. *Duplex ratio curandæ.* Nam non solum neruo, sed capite musculi vulnerato, si quidē alia auxilia desperatur, ad ferrū decurrere oportet, omninoq; præcidendus tendo, & neruus est. Sed (si datur) alia prius ineunda medēdi via, primūque animaduertendum, an os vulneris & via ad neruū fatis dehiscat. Vbi enim angustiora sunt, & præterea metus est, ne celeriter coeant, in crucē vel decussē confixam cutem intersecabis, multò magis si quid grauioris

## INSTIT. CHIRVRGIC.

uioris iniuriæ imminet, vt sit, qua sanies effluat, qua trāspiret neruus, qua deniq; vis medicamēti ad punctum neruum permeet. Ac plethorico deplendus sanguis statim initio. Cacochymo vitiū phar-  
maco expurgandum est. Dextra manu læsa è mal-  
leolo dextro sanguinem detrahes, dextro pede vul-  
nerato, axillaris dextra aperiēda est, interfecta cute  
vel alio facto vulnere, si quid cruoris inest, lanā, li-  
noxylon, linteolū molle specilli nucleo adalligabis:  
intingesq; sapa vel melicrato, ne asperitate ledāt,  
tum exprimes, & cruorem inde molliter exterge-  
bis. Ac dulci sapa vti oportet, nō ea quæ astringat.  
Post initia loco sapæ vinum dulce, deinde etiā vi-  
num albū, quod minimū aquæ sustineat, vtile est,  
quo iam tempore ad cicatricem vulnus adducitur.

*Fotus ex oleo  
& exelæo  
cōpuncto ner-  
uo in manu,*

Fugiendum vinum quod acre est. Ex quo oleo ca-  
lente manum vulneratam, carpum, alam, ceruicem  
totā, sed præcipuē qua in dorsum abít. & dorsi ini-  
tium largiter fouebis. Sic autem oleum calere de-  
cet, vt neque mordeat feruore, neq; tepore soluat.

*Lanarum  
refus.*

Oxelæo similiter vti licebit æstate quidem, & bene-  
carnoso ægro, verū neque hoc, neque oleū con-  
tingat neruum. Atque his locis omnibus superdan-  
tur lanæ eodem oleo delibutæ, & aliæ siccæ super-  
alligantur, ne qua parte subeant frigus. Æger domi  
desidet tepido cōclauí, vino interdicitur, parsimo-  
nia imperatur, procurātur omnia, quibus series illa  
malorum auertatur. Ac pro lanis complicata linteae  
æstate, hyeme linoxylon vsurpari potest. Bis térve  
vno die resoluuntur omnia, sæpius etiam hyberna-

*Quando sol-  
wenda lana.*

nocte, & vbi intercidit aliquid nouæ iniuriæ. Repe-  
tatur oleum, & lanarū calor refouetur, omnino quæ  
adhibetur

adhibetur cura, ut ne quid frigeat, quæ omnia ad quintum & septimum diem versanda sunt. His rebus ita prouisis, simul atque sanies vlceris existit, de medicamento cogitandum erit. Quorum ferè duplex *Duplex genus medicamentorum in vulneribus neruorum.* genus est. Atque illud quidè abundè siccat, leniter astringit, digerit, & aliquando exterget, quæ omnia sine vlllo morfu & aspredine efficere oportet, datur hoc in conceptis linteis, & exposito neruo adhibetur. Vbi enim opertus neruus est, altero tantum genere uti licebit, quod longius quidè à neruo, superdatur cuti temperatura molli in plagulis, ut vicina quoque cõprehendat. Atque hoc paulò acrius est, *Secundum genus.* sed ut ne mordeat, tenui natura, valde siccat, moderatè calefacit, apertū vulnus cõtinet, & saniem nerui foras eripit. Aperto neruo carptū linteolum primo genere delibutū inferitur. Ac medicamenta iam non oleo, sed dulci sapa soluenda sunt, deinde hoc genus acrius in splenio superaccommodatur, ex quo modò cataplasma impingitur, modò lanæ ad alligatur, oleumq; & alia, ut prius, quandiu videlicet res in metu est, sedulò adhibetur. Accedunt ad hæc quæ purgēt vlcera neruorū, quæ neruos glutinēt, quæ putredini aduersentur. Priuatim quoq; in punctis neruis abscessus quidem parui, distincti spatiis suboriuntur, & vicina occupāt, quibus remedia inuenta sunt. Atque operto neruo regenerata carne ad acria veniendum, ut ad ea quæ ex euphorbio, & similia, quæ nõ nisi periculo nudatum neruum attingant, etiāsi non ignoro, qui experientia freti (ut affirmant) externum neruum candenti ferro curēt, *Particularia materia.* atque ita omni iniuria prohibeāt. Nunc ergo ad ea omnia materia remediorū deinceps explicetur, ini-



# INSTIT. CHIRVRGIC.

*Olea.*

tio ducto ab oleis. Olea cōueniunt ad fots, & quibus pharmaca diluantur, dulce, bimum trimūve. nō astringens, anethinum, chamēmelinū, zambacinum, lumbricinū, hypericinum, canabinū, caryinō, rosaceum, in quo terreni vermes inferbuerint, terebinthinū, ricininum, sicyonium, rutaceum, galbaninum, styracinum, sinapinum, raphaninum, ex ouis pressum, & alia quæ in anodynis descripta inuenias.

*Medicamenta in nudis nervis.*

Leuiora initio, quādiu dolor metuitur, acriora ubi iam discutiēdum est. In medicamentis quæ aperto nervo adhibeas, alia mitiora, alia magis cōtrahunt.

*Lauāda cera, resina, & metallica quando.*

Atque hæc materia secūdo libro ferè explicata est. Cera utimur, resina, & metallicis prius elotis. Calcem ex aqua dulci sepius extinguimus, sepius lauamus, ex quo solutā plurimo rosaceo nudato nervo imponimus, at rosaceo sine sale cōparato uti conuenit. Quidā etiam ex matura bacca oleæ confectū volunt. In eodem vsu est *διὰ πομφόλυγος*, quod hoc loco ita conficiatur. ℞. cerusæ, pompholygos, lith. an. ʒ. 2. cadmiæ ʒ. 4. medullæ cerui ʒ. 3. ceræ. olei rosati an. ℥. i. olei myrtini ℥. β. metallica trita, cribrata, lota, liquatis aliis intermiscantur, coquuntur omnia dū non inquinant. In vsu (quod & de aliis crassioribus pharmacis semel dictum sit) diluēdum oleo, æstate, rosaceo, hyeme, chamæmelino & aliis

*Phœnicinum. Pastilli.*

generis eiusdem. Phœnicino similiter utēdum erit, quod minus habeat chalciteos. Pastillorum eadem ratio, Polyidæ, Andronis, Pasionis, qui in hæmorrhagia describentur. Calchātho loto & reliqua materia minuta in pollinem cōparentur, diluuntur ut prius, & durioribus naturis magis cōueniunt. Calx sub canicula tertio lauāda mari, atq; imbuta oleo,

aperto:

operto neruo opponitur. Melius elota & magis resoluta sapa, vel vt aliis placet, multo oleo etiā expósito neruo adhiberi potest. Aqua verò in remediis neruorū omninò abstinendum, nisi vbi calor & acrius medicamentū téperandum, sic enim misceri potest. Efficiendum, tamen est, vt dum liquantur illa, absumatur aqua in halitum, & solā vim, quæ téperet, relinquat. Amicum neruis *διὰ τὸ μέλιτος* tetramyron appellant, quod iam exoletis myracopis confici non potest. Non longè aberit quod hac temperatura comparetur. Mellis, terebinth. liquide ana  $\mathfrak{z}$ . 3. olei nardini, costini, rosacei, chamæmelini ana  $\mathfrak{z}$ . 3. vini odoriferi libr. 1. foliorum maioranæ, calendulæ, florum chamæmeli, anethi, meliloti, rosarum, rosmarini ana drach. 2. cinamomi, radicis a-cori, cyperi ana drach. 1. Hæc omnia nocte integra macerentur vino, postridie olea superaffundantur, coquantur omnia dum expiret vinum, reliqua cōcepta colo traiciantur expressum oleum mellis & terebinthinæ seorsum fufis vniatur, moueantur omnia in cineribus, sublatis igne puluis respergatur ex ambaris & moschiana granis duobus. Sūt & alia id genus, quæ in anodynis describentur, quæ ceræ, terebinthinæ & melli mista ad rem præsentē pertineant. Sunt qui solo melle ex rosaceo pisto vti soleant. Est & hoc è melle quod conueniat. Litharg. olei veteris ana  $\mathfrak{z}$ . quatuor, Colophonie, ceræ lotæ, axungie veteris ana  $\mathfrak{z}$ . tres, & ad circiter  $\mathfrak{z}$ . 3. Lith. oleo coquitur, deinde axungia, postremò cera & Colophonia seorsum fusa coniunguntur, in vsu soluitur vt prius. Aliud. Ceræ  $\mathfrak{z}$ . 1. terebinth. semuncia, olei mastichini  $\mathfrak{z}$ . 3. mellis semunc. coquuntur omnia

Adde melle.

## INSTIT. CHIRURGIC.

molli carbone, subductis igne, insperge pulueris  
 lūbricorū, mirrhę, radicis symphiti an. 3. i. versen-  
 tur omnia, & sedulò coniungantur. Ægyptia An-  
 dromachi, Giliuum Halięi, Isis, quę in his libris scri-  
 pta inuenias, soluta rosacei vsui sunt. Sed quę pa-  
 rantur melle, magis tempestiua sunt, quo tempore  
 sordescit vlcus. Quę verò fiunt è metallicis, & sic-  
 cant magis, leniora quidem initio, fortiora post ini-  
 tia vsurpāda sunt. Turunda posteris imbuitur tere-  
 binthina oui luteo, & momento croci, inferiturq;  
 decliui parti vulneris, qua emissariū sordis patescit,  
 terget & lenit. Iam verò quę purgent vlcera ner-  
 uorum, quęq; glutinent, ex secundo libro repetē-  
 da sunt. Peculiariter nervos cōiungit vocata Cizi-  
 cene. Thuris quā optimi, myrrhę, aristolochiæ,  
 chalcitidis vītę lotęq; iridis, galbani ana semunc.  
 lithargyri, terebinthinę an. 3. i. olei 3. 9. Omnia a-  
 heno capta blandis cineribus coquenda sunt, mo-  
 uendāque sine requie, postremò in frigidam mersa  
 manibus cōiunguntur. Aliud. Carnis limacum 3. 2.  
 myrrhę, thuris, picis torrefactę ana 3. 1. Tundun-  
 tur carnes, reliqua verò in puluerē trita sedulò in-  
 termiscentur. Aliud. Carnis cochlearum bene con-  
 tusā 3. 3. farinę pistrinalis, picis siccę, pulueris lū-  
 bricorū & radicis symphyti ana scrup. 2. terebin-  
 thinę è vino lotę semunc. iungātur omnia. Vsitata  
 sunt vnguentum de vermibus, Basilicum magnum  
 Mesuę, emplastrum relatum ad Andromachum,  
 Diachylon in linteolo, inciso nervo soluta adhibe-  
 tūr, soluuntur rosaceo & terebinthina mistis. Inte-  
 stinum terrę per se intritum & appositum, vel aliis  
 cochlearum more intermistum. Atque hęc obiter.

Nunc

*Cizicene quę  
glutinent ner-  
uos.*

*E limacibus.*

*E cochleis.*

*Vsitata poste-  
ris.*

Nunc autem breui compendio omnia cogamus. Compuncto nervo prima ratio totius corporis habenda est, vt vel purgetur pharmaco, vel phleboto-  
 mo depleatur. Deinde prouidendū, ne diuisa cutis  
 celerius coëat, quod si metuitur, intersecādum at-  
 que ampliandum vulnus est, extergendus cruor, &  
 si expositus nervus est, primi generis pharmaco in-  
 tegere oportet. Oleo fouēda manus, carpus cubiti  
 articulus, ala, ceruix, superalligandæ lanæ, instituē-  
 da vita, quæ grauiores casus prohibeat. Qui si iam  
 existunt, neque remedio locus est, intercisa cute, sa-  
 tis ampliato vulnere medium neruum præcides,  
 hic enim detrimētum partis certo exitio vitæ præ-  
 ferendū. Præsecto nervo extra periculum æger est,  
 & communi illa curandi via vulnus claudere oportet.  
 Iam verò infecto nervo & plaga satis hiāte, ead-  
 em captanda medendi via, quæ aperto nervo ex-  
 posita est, nisi quod relicto primo illo genere phar-  
 macorum, tantum vtimur secundo, de quo iā com-  
 necatur oratio. Aque hæc materia in multiplici  
 natura rerum posita est. In cerealibus subtilissimus  
 est orobus, hoc lolium calidius est. Lupinus quoq;  
 & cicer in vsu sunt. In farinā commoluntur, inco-  
 quantur, lixiuii coguntur omnia in cataplasma. Li-  
 xiuiū, vt est materia vnde excolatur, ita vel acrius,  
 vel clementius esse par est. Præstantissimum è ficu  
 & tithymalis. In liquabilibus succus est Cyrenai-  
 cus, medicus, scordolascr, quibus Assæ nostræ &  
 Benzoinū successerunt, sagapenū, propolis recēs,  
 opopanax, galbanum, pix, resina, terebinthina præ-  
 cipuè & larigna adeps qui sit tenui & calida natu-  
 ra, ex feris, prædatoriis auibus & rusticis, de quibus

*Cōpendium  
 eorum quæ  
 dicta sunt.*

*Secundum  
 genus phar-  
 macorum.*

*Ceralia.*

*Lixiuuium.*

*Liquabilia.*

## INSTIT. CHIRVR GIC.

*Plante.*

*Metallica.*

*Formula  
quadam.*

in attrahētibus. In plantis tithymalorum succus & cinis, succus & puluis maioranæ, calaminthæ, fabianæ anagallidis, baccarū lauri & iuniperi, acori, maioranæ aristolochiæ, mei, gētianæ, ireos, enulæ, bryonia. Ad hæc piper, cariamomum, zinziber, caryophyllon, cinamomū aliaq; id genus. Metallica vñ sunt, mysi, chalcitis, squama, ærugo, chrysocola, calx, sulphur viuū, vitrioli genera, arrhenicū. Fermentū quoque vtile est, sed quā vetustissimū, euphorbiū, castoreum, stercus colūbinum. Postremò quoque multarum rerū vsus est hac parte, quas in attrahentibus scriptas inuenias. Terebinthina per se in natura molli, in dura cum tantillo euphorbij satis efficit. Eadem ratio propoleos, si quidem pinguis est, durior conueniente oleo vel adipe molliatur. Fermentum vetus per se, cum propoli pingui, melle, pice liquida vel pari terebinthina mistū. Lacte etiā tithymali leniter intingitur, ex aceto pistū efficacius est. Sagapenū, terebinthina, oleum simul liqueſcunt, vel cum his, sagapeni loco galbanum, opopanax & alia id genus, tantumq; olei intermiscendum, vt sit tēperatura mollis. Resinis liquidis, terebinthina abietina, pinea. vtendum siccis, fricta abietina terebinthina, strobilina, quæ durioribus idonea est, pauco oleo soluēdæ sunt. Sulphur viuū, non lapidiosum, tenuium partium, aut castoreū ex oleo subigitur eodem temperamēto. Mollia enim hæc omnia, & compage, quæ consistat quidem, sed non diffluet, esse oportet, sordium instar in mollioribus corporibus, crassitie mellis in durioribus, retrapharmaco duodecima pars sulphuris, arrhenici, euphorbij, calcis immiscetur, soluendum prius ex oleo.

oleo. Medicamēti ex euphorbio plurimus vsus est, <sup>Ex euphor-</sup>  
quod quia in ceratis ferè est, de his quoq; breuiter <sup>bio.</sup>  
nobis differendum. Igitur cerara variè cōcinnātur <sup>Ceratorum</sup>  
è cera, pice, resina, propoli, adipe & oleo. Simplex <sup>ratio.</sup>  
è subdupla cera, vt in catagmatico, pari, vt empla- <sup>Simplex.</sup>  
stro de suptripla & subquadrupla ad oleum, vt in  
acopis, temperatur. Miscetur adeps & terebinthina  
liquida sed utroque misto oleum iusta ratione mi-  
nuendum est, ne tēperamentum liquidius diffuat.  
Picatū, quodque aridam resinam capit, è cerę parte <sup>Picatum.</sup>  
vna, tribus & quatuor olei, subdupla pice vel resi-  
na ad cerā cōpingitur. Quæ ratio seruari potest in  
ceratis quę galbanum, propolim, sagapenum & alia  
id genus concipiant. Terebinthina & quæ liquida  
sunt, subtripla cera commiscetur, duplo interdū  
misto oleo, interdum triplo. Iam verò euphorbij <sup>Modus eu-</sup>  
bimi & trimi ferè æquale pondus, & ceræ tempe- <sup>phorbij.</sup>  
ratur ad 3. i. ceræ 3. 6. euphorbij recētis sexta pars  
satis esse potest. Quarto, quinto & sexto anno æ-  
quale sit ceræ euphorbium, vetustiore vtēdum nō  
est. Sextula euphorbij aliquando satis esse potest.  
Et vt sunt corpora, vt vicina cuti, vel lōgius ab hac  
punctura, ita lenius & acrius pharmacum misceri  
debet. Ac quātò plus ceperit euphorbij, tātò acrius  
futurum est. Sed omninò in euphorbio annorum  
habenda ratio. Neque aliter stercore columbino  
& puluisculis acrioribus qui ceratis inspergantur,  
vtendum erit. In cerato è stercore columbino mo-  
dus stercoreis interdum deceditur, tantumque æru-  
ginis crudæ sufficitur, quantum stercoreis subtraxe <sup>E stercore</sup>  
ris. Ceratum aliquando succis illis plantarum im- <sup>columbino.</sup>  
buitur, aut puluisculis permiscetur. Verùm exēpla  
m 5 quædam

## INSTIT. CHIRVRG.

quædam subiicere melius est. Acerrimum erit, cerę sesquuncia, olei vnciæ quatuor & ß. euphorbij, recentis semunci. In medio tantum drachmæ tres euphorbij, in infirmo ad circiter 3. 2. Satis vñtatū est veteribus quod sequitur. Cerę 3. 1. terebinthinæ liquidæ, picis ana semunc. euphorbij recentis drac. 2. Euphorbiū liquatis aliis permiscetur, vel ex oleo tritum confusis cæteris cōiungitur. In vñ vim medicamēti sensus iudicabit. Acrius arrodit, & os vulneris amplificat, hinc quoque rubor & dolor grauis in ambitum excitatur. Hoc ergo celeriter reuelandum, relictoque linamento quod fortasse incubat neruo, oleo paregorico fouendus locus est, donec acquiescat dolor. Hicque benignius ceratum misto adipe deducta parte euphorbij, imponendū. Languidius neque sensum vllum, neque calorem mouet, auctoque euphorbio acuendum est. Iusto verò pars molliter incalescit, & leni quasi prurigne titillatur. Atque hæc in cerato de euphorbio de probando pharmaco in toto hoc genere cōmunia sunt. Cæterum falli contingit quod à languidiore medicamento pariter atque ab acriore dolor excitatur & inflammatio, idque præcipue vbi vulnus cutis angustius est. Nam cum medicamentum non attrahat, aut attrahat quidem, sed minus quam cōueniat, sanies multa colligitur, quæ incidens neruo eas iniurias accersit. Sed ab acriore paulò post quā adhibitum est, à languidiore multò post dolor & alia id genus commouentur. Atque hæc medicamenta bis tēre interdū absolui debent, nocte non mutantur nisi longiore. In medicamento quod è metallicis cōficitur, vñrata veteribus, Misf, erugo, calchitis

*Probatio medicamenti.*

chalcitis & squamæ æris. Misy & chalcitis exoleta sunt, nisi ad vitrioli & cuprosæ genera decurras. In his thus additur, adeps, resina, galbanum, quæ vim metallorum emolliant. Oleum sesquialterum ceræ, cera dupla, tripla, media inter hæc ratione ad metallica. Eadem resinæ sextupla est, thuri vero & galbano noncupla, quintupla & septupla est. Validissimum est, ceræ  $\text{℔. i.}$  olei veteris sesquilibra, hyeme etiam ad circiter  $\text{℔. 2.}$  chalciteos crudæ  $\text{℥. i.}$  misyos  $\text{℥. 2.}$  squamæ æris  $\text{℥. 3.}$  terebinth.  $\text{℥. 2.}$  galbani sesquincia, thuris  $\text{℥. 3.}$  hic cera quadrupla thuri, octupla galbano, sextupla resinæ, dupla metallicis. Infirmū ceram triplam capit ad cremata metallica, augétq; modum thuris & galbani, ut utriusque pondus ferè subduplum sit ceræ, ad libram vnam ceræ, galbani uncias duas, thuris uncias tres. In medio media seruanda ratio. In his cera sit mollis, resina liquida, thus & galbanum utraq; pingua. Metallica modò cruda, ut sit acrius pharmacum, modò cremata, ut sit clementius, vsurpantur. Eadem sub canis ardoribus ex aceto acerrimo pluribus diebus inte-runtur. Acetum vetus præferendum, quod nihil austerum, nihil vinosum resipiscat. Sed hac arte squama præcipuè elaboranda est. Thus quoque eodem aceto leniter interi utile est Cera, oleum, resina colliquantur, thus & galbanum intermiscantur, metallica in aridum pollinem versa paulatim resperguntur, voluuntur spatula in prunis, & sedulo coniunguntur. Aliud est è metallicis, quod à Galeno descriptum est. Ceræ uncia sex, olei uncia nouem, misyos  $\text{℥. 6.}$  chalciteos denarius vnus, squamæ uncia, duæ & sem. thuris sesquincia, galbani uncia duæ

*Proportio ce-  
ræ ad oleum,  
metalla, &  
alia.*

Magda-



## INSTIT. CHIRURGIC.

Magdalides inde fictæ vsus tempore diluuntur, & inlita linteolis applicantur. Est & tertium genus *ἁλὶ τῶν τικτῶν*, è liquabilibus, quod & punctis nervis, & canum moribus auxilio est. Sed hoc vt alia è metallicis, duris corporibus idoneum est, quam aliquando in teneris naturis infirmo pharmaco vtimur, cerato *ἁλὶ στατῶν* temperamus, oleo deniq; prolixius habetamus. Picis  $\frac{3}{4}$ . aceti acerrimi  $\frac{3}{4}$ . 6. & ad circiter  $\frac{3}{4}$ . 4. opopanax  $\frac{3}{4}$ . 1. Pix sit mollis, inferuescat aceto dum cōsistat, opopanax aceto fusus aliis coniugatur in calidis cineribus. Dilatum manu in magnitudinem vulneris interdū apponitur, si quidē durum corpus est, in molli diluitur oleo, & in splenio accōmodatur. Ægyptia Andromachi, Giluū Haliæi & alia, verū paulò crassiora, nec ita diluta, in eodē vsu sunt. Sequitur Isis illa sacra, & ex templorum adytis repetita, quæ iudicio veterum omnia emplastra superat. Ex Vulcani templo Ægypto translata est, hieroglyphicis primum descripta. Erant hieroglyphica monumenta rerum in mysteriis Ægyptiorum descripta, non literis, sed formis animalium & mutarum rerum, ne prophano vulgò innotesceret, qualia Orus Apollo Græcus author cōmemorat. Scribonius Glichoni, Græci Epigono, alij Hermioni hierogrammateo attribuunt. Nervis punctis & venenatis moribus utilissima est, curat artuum fracturas etiā cum vulnere, effractam caluariā persanat, facit ad detectam membranā tegentē cerebrum diluta rosaceo, demersas squamas ossiū, & testulas caluarię extrahit. Cephalalgias veteres persanat, si raso capiti dies viginti infideat. Imponitur fronti contra hæmorrhagias

gias narium, & fluxiones in oculos. Anginosus affigitur collo, glutinat, incarnat, mollit, & fistulis inditur, dilutum rosa, in collyriis. Celeriter pus generat idemque per spiracula exorbet latente via gāgrānas & putredinē compescit. Suppurationibus māmaram prodest, prolapsis intestinis è vulnere ac repositis, post arctatū vulnus fibulis, aut sartum acia, vtilissimè imponitur. Lateris, stomachi, vētris, iecinoris, lienis frigidum dolorem sedat. Ad luxatum omne, & eiectum, & repositum articulamentum bene facit. Podagricis mirificè prodest. Cācros serpentes, & carbunculos reprimat, purgātque. At neruorum vitia omnia acopo meliùs facit, trahit aculeos, parotidas & callos discutit. Adenas vlcera & membranas ita eliquat, vt per se decendant, vacillantes vngues vel confirmat, vel extrudit. Commotū dentē stabilit, vlceribus narium medetur, ac breuiter præter cetera admiranda est. Sed variè describitur, mistura hæc magis placuit. Ammoniāci, æruginis rasæ, salis ammoniaci vel fossitij, squamæ æris more veterum vsti, aluminis, aristolochiæ rotūdæ, & vt Scribonius, sarmentitię, thuris an. ℥. i. myrrhę aloës, galbani, aut vt Asclepiades mannæ ana sesquuncia. Scribonius sextans, cere ℥. i. & semunc. vt *Misura.* Heras, Andromachus, Asclepiades: Scribonio triēs, aliis ℥. i. Colophonię, terebinthinæ an. ℥. 2. & ℥. i. vt Andromachus, Heras, Paulus, alij scribunt denarios sex, alij denarios sexaginta. Quidā codices habent denarios centum. Scribonius terebinthinam omittit, & Colophonię scribit pōdo quatuor, aliās pondo duo. Adhęc olei veteris sesquilibra, cui rationi consentit Scribonius, & sextarium scribit, alij ℥. i.

# INSTIT. CHIRVURGIC.

℞. i. ponunt, alij selibram, heminas duas, heminae  
 dimidium ℥. 3. Certum est autem copiosum oleū  
 esse necessarium, ut pharmacum consistat. Epigo-  
 nus addidit succi radice dracontij sesquunciam, alij  
 præterea succi feridis ℥. i. succi marrubij sesquunciam.  
 Galenus sine succo feridis aliquando confecit, &  
 alumen sustulit. Veteres ferè tantum sex denarios  
 vsti aluminis miscuerunt. Alia teruntur, alia lique-  
 fiunt pro sua quæq; natura, excepto galbano, quod  
 in mortario cum tritis pharmacis circumagatur, ace-  
 to paulatim fuso, idque melius in sole, ex quo aliis  
 liquatis intermiscentur omnia, ubi verò sublata fo-  
 co intepuerint, manibus aceto tinctis diu versan-  
 tur, ærea pixide ad vsus reponuntur. Medicamentū  
 diluitur vino, vel aceto, ubi glutinandum, aceto, ubi  
 molliendum. In gāgræna & putredine succos illos  
 recipit, in vulneribus neruorum succum dracontij  
 alumen ubi repellendū. In punctis neruis sit com-  
 page mellis, in aliis modò crassius, modò liquidius,  
 ut res & corpora postulabūt. In proxima laude est  
 ἀνικτόν, cui propter insuperabilem virtutem no-  
 men inditum est. Parem Isidi vim habet, diluitur  
 ferè oxelæo, immittitur fistulis, contractos articu-  
 los laxat, mollit, digerit. In abscessu vëtris, coli, cras-  
 sius dilatatum manu imponitur, thorulus oxelæo  
 calente madens superimponitur, qui bis quotidie  
 eodem oxelæo irrigandus est, tertio primū die vel  
 quarto absolui debet. Hic si quid exasperauit, fotu  
 olei mitigatur, ita efficit, ut ne purulenta vomica  
 colligatur. Iam collectam extenuat, & per intestina  
 quasi miraculo depellit. Reliqua verò Isidi simili-  
 ter efficit, mistura sic habet. Squame æris ℥. 7. & ℥. 2.  
 aliàs

Compositio  
 Aniceti.

aliàs ʒ. 6. & semis in aliis sesquuncia, pyrethri, her-  
 be pedicularis, cocci, cnidij, feminis sinapi, ca-  
 chryos, alioqui granorū paradisi, stercore colūbini  
 aristolochiæ sarmētitæ, æruginis, cyperi, feminis  
 erucæ. cumini an. ʒ. 2. aliàs denar. 6. nitri, salis am-  
 moniaci an. ʒ. 4. baccarū lauri, mannæ, iridis an. ʒ.  
 15. al. ʒ. 2. & semis. aceti acris sextarij 16. al. 12. de-  
 cocti caricarū cyathi 4. & sem. hoc est, ad circiter  
 ʒ. 7. olei heminas 5. hoc est ad circiter lb. 4. Tun-  
 duntur primū quæ teri possunt, ex quo aceto sparsa  
 iterū contunduntur sub canicula, vbi versata diu  
 exarescant, hic iniecto ficuum decocto & oleo om-  
 nia coniungātur. Reposita in ære rubro per inter-  
 ualla aceto respergantur, vt feruentur mollia. In  
 vsu ʒ. 2. dissoluuntur aceto. & cum sextuplo cerato  
 quod resinam habet, octuplo, quadruplo permi-  
 scentur. Descriptum prius decoctum caricarum &  
 ceratum, quod resinam habet. In cæsis nervis non  
 alia pharmacorum ratio. Linamenta primo gene-  
 re delibuta nudato neruo imponuntur, aliud esse-  
 cundo genere superdatur in plagula, cataplasmata,  
 lanæ, & alia similiter comparantur. In transuerso  
 vulnere vt periculū maius est, ita liberalius deple-  
 tur sanguis, seuerior vitæ lex ponenda est. Iam sit *Transuerso*  
 exemplo gladiator ille, qui priore femore, qua mu- *casi.*  
 sculi in patellam abeunt, transuerso vulneratus sit,  
 Magnum sit vulnus & profundum, vacuandū cor- *Hypothesis.*  
 pus. Purgandum vulnus cruore terfo. nudus cæsus-  
 que neruus bene diluto pharmaco è primo genere  
 in carpto linteo obstitipandus est. Superdandæ lanæ  
 oleo vel oxelæo delibutæ, totum crus oleo fouea-  
 tur, inguen, ile, pubes, spinæ pars, quæ lumbis &  
 coccyge

## INSTIT. CHIRVRG.

coccyge intercluditur, ac breuiter tota spina dorſi & ceruix calente oleo irrigentur, contegantur lana ſuperiore ratione. Sæpiùs abſoluatur vt prius, præſcribatur quies, vinum excludatur, decubat lecto, omnes aditus frigoris intercludantur. In eã figuram componatur femur, in qua citra dolorem permaneat, quod & puluino molli innitatur, leniter proclinetur parte aliqua, vt cū cœperit eſſe ſanies, cōmodè repurgetur. Quo tempore ad ſecundum genus pharmacorum veniendum, quale eſt quod habet euphorbium. Sed hic labris nimium diſſidentibus futura opus eſt, quæ & muſculos capiat, & ſubiectas membranas intertextas carni, & carnem ipſam altiùs cōfigat. Verùm adhibēda cura. ne vel neruus, vel tendo, vel vas denique magnum tranſcurſu acus vulneretur, deinde etiã vt decliui parte emiſſariū relinquantur, qua ſanies deſſuat, quæque medicamēta vulnere inferantur. Iam verò vbi & vulnus purum, & inteſtus carne neruus eſt, vbi iam omnia in tuto poſita ſunt, ad communem vulnerum curationem te conuertes. Longa quidem medendi via, ſed hic præcipuè cogitandum, vt ne cū nimium properes, tardiùs abſoluas. In rebus dubiis, & quæ non vrgent, ſat citò, veteri ſententia ſi ſat bene. In recto vulnere minor metus eſt, diligatione vtendum, parciùs depletur ſanguis, neque futuris opus eſt, ſi quidem faſciis cōiungi poſſit, in pharmacis ea ſeruetur ratio, quæ in trãſuerſo præſcripta eſt. Nunc de putredine & abſceſſu, quæ vulneribus neruorū malè curatis ſuboriri ſolent. Adoleſcens Galeno cōmiſſus eſt, cui ex contuſione medij digiti articulus computruerat. Itaque Galenus

contuſum

*Sutura.*

*De putredine.*

*Hiſtoria.*

contusum locum cataplasmate ex hordeacea & lixiuio induxit, tensa verò in ambitum & cognatione dolétia oleo calête liberaliter perfundit. substracto deinde cataplasmate madentem locum molli-ter exterfit lana quidem sicca, ex quo subiecit catagmaticum ceratum, quod oleo ad ceram duplo conficitur misit euphorbio. Communis enim curandi ratio puncti cæsi, contusi nervi & tendinis. Adolescens ergo postridie melius habere cœpit, dolorque & tensio ad brachium satis remissa est, quo die pro hordeacea orobi farinâ lixiuio iunxit. Tercio die omnia repetita sunt, fatus, ceratū, cataplasma. Hicque superior manus & brachium omni iniuria liberata sunt. Sed in contuso articulo semipit tre corpus membranaceū apparuit, ex iis quę mediis tendinibus cōnexa in seriem digitorum extenduntur, quod leniter commotum facîle decidit rectē quidem quod computruerat leni tractu cōmotum est, etenim tum demum rescindi ferro aut volfella, vel digito putrefacta reuelli debent, quo iam tempore veluti maturitate quadam facîle secantur, neque maior vis nondū. maturis inferenda est. Itaque separatis putridis membranis, cum incolumis tendo nudatus esset, Polyidæ pastillus sapa dilutus in carpto linteo adhibitus est, & ceratum superdatum, quod capit euphorbium, cui cataplasma ex orobi farina & lixiuio adiectum est. Quarto die nō aliud superesse visum est, quam vt reliquias inflammationis discuteret, alioqui ad cicatricem sese conuerteret. Cū ergo nescio quid durum relictuū esset, abundē siccantibus vti instituit, vsusque est Ifide medicamēto, postremò ad epulotica transiit.

# INSTIT. CHIRURG.

Atque hoc exemplum tibi positum sit ad contusos  
 nervos & putria, in utroque conferunt initio cata-  
 plasmata ex hordeacea vel fabacea cocta oxyme-  
 lite postea aliquid lixiuij additur, & reliqua farina-  
 rum genera usurpantur orobi, lolij, cicerum, lupino-  
 rum, postremo solum lixiuium sine oxymelite co-  
 quendis farinis, utile est. Plura contra putria in pur-  
 gantibus, in contusis sed opertis nervis & cute in-  
 tegra oleum satis esse potest, quod laxet, discutiat,  
 & dolorem leniat, qualia in anodynis scripta sunt.  
 In dolore pix liquida & paregorica misceri possunt.  
 At simul contusa cute & ulcerata, siccandum simul  
 & constringendum, ubi salutare cataplasma athle-  
 tarum ex oxymelite & fabacea farina coctis, reces-  
 contusum membrum, fluentem calidum sanguinem  
 a recens caeso animali excipiat, eoque immergatur  
 aut in thoracem animalis via facta immittatur, in  
 abscessu, qui punctura in ambitum nascitur, Ori-  
 basij pharmacum accommodatum est. Cera, Co-  
 lophonias, butyri ana ꝑ. i. picis aridae, mellis ana se-  
 munc. ærug ꝑ. 2. ærugo in puluerem trita diutissi-  
 me in aceto volutatur, & liquatis aliis sedulo per-  
 miscetur, coquuntur omnia mota assidue dum con-  
 sistant, iam ad reliqua nervorum vitia properemus,  
 ac de dolore in anodynis. Torpor motus & sensus  
 iniuria est, qui & stupor appellari potest, ubi præ-  
 cipue anatomica ratione recognoscenda nervorum  
 radix est, quæ semel læsa suum vitium longè late-  
 que disseminat, cuique remedia primum adhiben-  
 da sunt. Frustra enim digitum acopo fouebis, ubi  
 ex eo obtorpuit, quia in alio ceruix. quo loco dor-  
 si exterminat. Et ante remedia de causa mali quæ-  
 sitio

*In contusis  
& putribus.*

*Abscessus.*

*Torpor.*

stio habenda est. Torpor ergo & in totum corpus *Speianda in*  
 spargitur, & in membra præcipuè, crura & manus, *torpore.*  
 plurimum quidem à refrigeratione, deinde neruo-  
 rum angustia, quia vel luxata vertebra, vel innato  
 tuberculo opprimatur. Aliquando quoque excepta  
 aura torpedinis genus hoc vitij nervus inuexit.  
 Quòd si nihil horum incidit, ad ignaviam referen-  
 da, & in erroribus vitæ causa querenda est. Quibus-  
 dam solennis vacuatio, arthriticis, status materiæ  
 cursus recurrente periodo in nervos corporis re-  
 spargitur. Quartanæ & alij morbi id genus in stu-  
 pore, resolutionem corporis degenerant. Intem-  
 peries quoque hoc genus vitij nonnunquam gi-  
 gnit. Itaque in torpore, in obsoleto sensu corporis  
 & motu, de causa mali, de origine nervorum, qui in  
 læsas partes abeunt, quæstiones primùm habeantur.  
 Calefaciendum quod refrigit, reponendū, con-  
 stituendūque quicquid loco secessit, incidendus  
 humor, atque dispergendus, quia acetabula, vincula,  
 nervos, articulamenta denique infarcit, curanda  
 tubercula, laxandæ angustia, reformanda vitæ lex,  
 incitanda vacuatio, diuertendus materiæ cursus, &  
 omninò contraria remedia contrariis vitiis adhi-  
 bere conuenit. Quæ calefaciant, & hinc nervorum  
 iniuriæ repugnent, ampliter scribentur in dolo-  
 rum remediis. De luxatis ossibus superiore capite  
 satis disputatum est, reliqua auxilia partim ex pri-  
 mo libro, partim ex adytis medicorum repetenda  
 sunt. Quod autē ad originem pertinet, ut suo que-  
 rē loco medicamenta imponantur, meminisse *An seruato*  
 decet, nonnunquam motum obolescere: seruato *motu pereat*  
 sensu, aliquando verò permanente motu abo- *sensu, &*  
*contra.*



## INSTIT. CHIRVRGIC.

Ieri sensum, vtrūque etiā interdum obtorpesce-  
 re. Atque vbi idem neruus tum ad sensum, tum ad  
 motum à natura parti datus est, seruatō motu inco-  
 lumem sensum esse oportet. At incolumi sensu nō  
 protinus motus integer est. In multis corporis par-  
 tibus neruorum fibræ ad sensum in superficiem ex-  
 plicantur, rami verò musculis inferuntur, vt mo-  
 ueāt, vbi saluo altero motu, si lubet, sensum exole-  
 scere contingit, multò magis cum alio atque alio  
 ortu vtrique enascuntur. Multis quoque partibus  
 ad varios motus multi nerui, tendines, musculi à  
 variis locis inuecti sunt, quod in capite, artubus,  
 ore, thorace, & maxillis, atque adeò toto corpore  
 facilè intelligat, quicumque in anatomica discipli-  
 na fuerit exercitatus. Vt ergo iniuria paris est, ita  
 requirendus neruorū ortus, cui (si opus est) reme-  
 dium instituas. Ridiculum enim intremiscētibus  
 vel contortis labro & genis ad eos neruos confu-  
 gere, qui à tertiā cerebri propagine in totam ferè  
 faciem disperguntur. Motus enim in vitio est, neq;  
 sensus iniuria ad quæstionem proponitur, requi-  
 rendum ergo, nunquid detrimenti ceruix accepe-  
 rit, qua parte latus ille musculus longè latèque in  
 faciem explicatur, num qua relaxata vincula, nun-  
 quid iniuriæ à temporalibus musculis & neruis  
 primū ortum sit. Neque absurdum minùs quod  
 sequitur. Cuidā in itinere è pluuiā & frigido Aqi-  
 lone suprema ceruix inalserat, læsa quoque graui-  
 ter ea iunctura, quæ ad vocatum dentem articula-  
 ta est. Atque hinc optimo iure sensus caluarie  
 obtorpuisset, quia ab ea vertebra sublatis neruis, vis  
 sentientis animæ capiti inspiratur. Igitur cum fru-  
 stra

*Exemplis res  
 declaratur.*

*Historia  
 quedam.*

stra calidis medicamentis pugnatum esset, quæ capiti impingebant, accersitus. Galenus ad dentem vocatam vertebra remedia conuertit. Igitur recalsacta parte, quæ primùm in alserat, sensus caluarie celeriter instauratus est. Multis iunctura illa frigore perculsa, ut & tertio & quarto articulo colli modò constans, modò intortum dolensque riget, neque pro libidine conuertitur, ubi frustra capiti remedia imponas. Sed adhæc designandæ partes, unde vincula procedant, oriantur nervi, inducantur muscoli, quibus ceruix capiti colligatur. Sed & post dentem articuli vel pelluntur loco, vel frigore percelluntur, atque hinc laborant muscoli, qui è collo in thoracem sese explicant, ex quo efflatu intercepto materia vocis, vox quoque interdum supprimitur. Verùm omninò meminisse oportet in tota spina leues esse iniurias, quas frigus intulit, grauiorès quæcunque vel phlegmone, vel tuberculo commouentur. Asperissimum malum est luxatis articulis, multò maximè cum intra pulsa, & in obliquum vel angulum torta vertebra est. Sic enim nervi angustius comprimuntur, qui è spina quidem exigui paucique foras discurrunt, plurimi verò atque præcipui feruntur intrò, & semel læsi longè grauissima pericula interminantur. Quidam subiectis istumis obmutuit nudato nervo, eoque perfrigerato, qui vocem fingit. Alteri in dorsum deturbato vox intercepta est. Atque hic curato dorso, ille concalsactò vocali nervo vocem recuperavit. Pausanias sophista in dorsi initium præceps corruit, atque hinc seruatò motu, intermortuus sensus est, qui vltimis duobus di-

*Efflatio læsa.  
Comparatur  
in se spine  
iniuria.*

*Nervi e spina  
foras & in-  
trò.*

*Historis ex-  
plicatus locus  
cui remedia  
imponis.*

## INSTIT. CHIRURGIC.

*Accidentia  
manuum in  
gravi pleuri-  
tide & peri-  
pneumonia.*

*In visus ma-  
nuum.*

*A dorso &  
lumbis iniu-  
ria.*

*Suppressa &  
sine voluntate  
mictus urinae.*

gitis & dimidio tertij inspiratur: in gravi peripneumonia & pleuritide, ad extremos vsque digitos sensus quibusdam violētus est, plurimis brachium condolescit, aliis quoque motus leniter obtunditur, læsis scilicet nervis qui à dorsi initio prima costarum spatia intercurrent, & in brachium, vltimam, extremos quoque digitos sparsi deferuntur. In torpore & tremore manuum recognoscendum, num quid vitij ea parte spina fecerit, quæ quarta & nona vertebra intercluditur. A sexta quidem, septima & octava in totam manum nervi dimittuntur intermixtis fibris à superioribus articulis. Sed è septima & initio dorsi, interiore manu & posteriore plures decurrunt, in vltimam, vltimos digitos & dimidium tertij disperguntur. A superioribus coniugiis vertebrarum in superius brachium, exteriorem, priorēque manum, maiores quoque digitos nervi disperguntur, quanquam ita hi omnes sese implicant, vt non faciliè in medio cursu & finibus separentur. Cervice læsa, quartum spondylium quarto conferitur, offenditur respiratio, quia hinc diaphragma nervos excipit. Affecto dorso & nervis, qui costarum spaciis interferuntur, vox hominem deficit, quia maior vis illa spiritus, qui materia vocis est, non offlatur. Lumborum iniuria & inde laborante abdomine ingrauescit respiratio, & excrementa segnius depelluntur. Quidam è scala præceps in lapidem impexit, qua lumbi sacrum os exarticulavit, isque locus intro compulsus & obliquè luxatus est. Ex quo cœpere crura frigescere, ortæque inflammatione alui excrementa & vrinae resisterunt. Puero

in captura piscium spina perfrixit, qua lumbi defuncti, condoluit vesica, alius sine voluntate ster-  
cus deiecit. Alter in eadem iniuria inuitus omnia  
commingebat. Cuidam puero in osse facto ex arti-  
culata & intrò pulsa vertebra est. In quo neglectū  
malum occalluit, atque inde factū, vt nō nisi agrè  
& in stillicidiū vrina exprimeretur. Alteri obliquè  
torta articulatione, vrina in totū suppressa est. At-  
que hæc non iniuria, si quis intelligat è finibus lū-  
bōrum nervos in crura plurimos, quosdā in vesicā,  
podicē & genitalia dispergi, maximos posteriore  
parte recta in poplitem decurrere, minorum alios  
quidem, qua pubis os foratum est, in priora crura  
disseminari, alios verò obliquè ad inguina diuer-  
si, vnaque cum magna vena & arteria, atq; extra has  
in anteriores partes femoris deferri. Ab osse sacro  
alia quoque neruorū soboles superiorib; intexitur,  
vnde vesicæ & aliis partibus perplexæ fibræ inse-  
rātur. Atq; hæc obiter. Neq; enim huius instituti  
est anatomiam describere, sed parum explicata re-  
media videri possint, nisi etiā designetur locus, cui  
applicentur. Frustra enim torpentem pedem exci-  
tes, & anum vesicamq; refouēas, quā lumbis pri-  
ma mali labes orta est. Atque hoc in lumbis semel  
explicatū, in aliis spinæ partibus & inde factis iniu-  
riis seruare cōueniet. Et quæ de torpore, de paraly-  
si quoque & tremore dicta pntētur. Cōtra quæ om-  
nia in dolorib; Acopa scripta inuenias. Ili, aniceto,  
aliisque generis eiusdem vti liceat. Nūc ad reliqua  
transeundum. Igitur rigēt nerui, atque contorquen-  
tur, vtrunque quia conuulsi, gangliis occupati, &  
eo vitio impediti, quod inflexis neruis *ἀνίσταται*

Nervi crurū.

Rigor & con-  
tortio.

## INSTIT. CHIRVRGIC.

quodque tensis atque rigentibus ὀρθόκλυον appellant. In ancyle contendere membrum non potest, & quasi reuulsum manūque manet. γαλιᾶκον Hip-  
pocrati qui inde cubito est breuiore, ακνος Gale-  
no appellatur. In altero vitio exertum est, rigidū,  
nec iam inflectitur, quia videlicet veluti alternāte  
imperio, motū efficiunt, cedūtque nerui, tendines,  
musculi quicūque à natura ad membrorum flexus  
cōtentionesque instituti sunt. Atque hæc quidē in  
totum corpus incidūt, in neruos, tēdines, musculos  
& articulata coniugia, per quæ collū capiti copula-  
tur, sed præcipuē in digitos, cubiti iuncturas & po-  
pilitis. Familiaria arthriticis ē materia crassa, quæ in  
articulis concreuit. Eadem efficit cicatrix magna,  
quæ in callū obduruit. Iisdē immoderato siccitas, &  
flatus aliquādo causa est. Atq; hic faciliē discutitur.  
Siccitas hydrelæo, in quo semen lini, althææ, fœnu  
græci & horū folium & radix inferbuerint, balneis  
aquæ dulcis, in lito dulci oleo & similib. réperatur.  
Rescinditur cicatrix, vt cōtractæ partes relaxētur,  
vitatis neruis & tendinibus. At scirrhus frequētissi-  
ma causa est. Is ergo statim initio laxante materia,  
quæ præterea remolliat, tentari debet, hydrelæo in  
quo tum illa, tū cucumeris syluatici radix, & lauri  
folia præcoxerint, irrigādæ partes, fouendæque si-  
cyonio, irino, aliisq; id genus, ex quo leuiorib. aco-  
pis vtendum erit, quæ molliter affricentur, atque  
hinc superalligantur lanæ modò succidæ, modò o-  
leo delibutæ. Blandē cōmouetur articulus, vt pau-  
latim assuescat naturæ. itaque initio diachylon &  
leniora malactica oleo lirino, irino, anethino, sicyo-  
nio, & aliis id genus dilues, atque hinc articulum  
molliter

*In quibus  
partibus an-  
cyle &c.*

*Causa.  
Curatio.*

molliter affricabis. Postea verò Amythaonis phar-  
 maco, Cathægetæ Asclepiadis, Aniceto, Ifide, em-  
 plastro de meliloto, immisto quidē oleo, sed paulò  
 crassiore temperamento, vtendum erit. Atque om-  
 nino ea cōsectanda curādi ratio, quæ in malacticis  
 pluribus explicata est. Conuulsio, inquit Hippocra-  
 tes, ex inanitione fit & repletionē, at illa ferē in de-  
 speratis ponitur. Hydrelæo tamen, balneo è media  
 materia, & iis quæ tepido humore laxēt, vti licebit.  
 In repletionē qualitas quoque materiæ includēda,  
 quæ vel acrimonia, vt sanies in neruis, vel frigore  
 mordeat, de quibus ex Hippocrate quædā iam an-  
 te annotata sunt. Adhibetur medicus, irrigātur o-  
 lea quæ leniāt, laxent, discutiāt, qualia multa in do-  
 loribus resoluētibus, attrahētibus scripta sunt af-  
 fricantur acopa, illigātur lanæ, impingūtur empla-  
 stra eiusdem naturæ, quæque omninò contra cau-  
 sam mali depugnēt. Malagma Scribonij quod Ca-  
 thægetæ pharmaco simile est, ad omnem rigorem,  
 conuulsionem, tensionem contractionē, dolorem  
 neruorum & caninum spasmus, ad ancylas deni-  
 que & ganglia vtile est. Bdellij, sepi vitulini, ireos  
 an. ʒ. 2. opopanacis galbani, ammoniaci, cachryos,  
 aut baccarum lauri, vel granorū paradisi ana ʒ. 1.  
 piperis grana centum viginti, ceræ ʒ. 7. terebinth.  
 ʒ. 6. Trita arida cribrantur, quæ succum habent,  
 cum resina subiguntur, cera particulatim fracta in-  
 feruentem aquā demittitur, subacta manibus aliis  
 intermiscetur in pila, versantur omnia, sed pilam  
 conuenit subinde perungere oleo cyprino, vel tere-  
 binthino, aliòve generis eiusdem. Liquefcit phar-  
 macum in oleo, vt sit acopō, quum res exigit. Gan-  
 glia

Hippocra.  
 aph. 39. li. 6.

Malagma  
 Scribonij ad  
 multa.

# INSTIT. CHIRURG.

*Ganglia.*

*Cura.*

glia vocamus concretiones quasdam & contortio-  
nes ad cartilaginem vel neruum, ex lenta crassaque  
materia, quale neruorum alimentum est. Alij gan-  
glion definiunt tumorem nerui à vi externa, casu,  
ictu, laboribus, nam rarò sponte prouenit, extremis  
membris ferè nascitur, rariùs in cubito, capite & re-  
liquo corpore. Atque hic tumor inæqualis est, re-  
nititur, & in latera pressus diuertit, nec in orbè cir-  
cumagitur. Quibusdā partibus curantur ferro aliis-  
vt pedibus & manibus, non nisi cum periculo cul-  
tro vulnerantur. Ammoniacum ergo ad ignem di-  
latandum manu, molle atque vnguinofum, aut eo-  
rum medicamentorum aliquod, quæ in malacticis  
descripta sunt, emplastri temperatura. Calidum &  
ita diductum, vt totum ganglion cōprehendat, af-  
figi decet, superdatur plumbi lamina, eaque arctis-  
simè constringenda, alligandaque, vt nullo modo  
ganglion diuertat. Alij solam laminā sine phar-  
maco adalligāt. Atque vbi dierum aliquot interiecta  
mora emollitum glāglium videatur, detracto plū-  
bo & pharmaco statim pollicem dextrum ganglio  
infiges, reliquos digitos in ambitu cōstitues, omni-  
nò premes, & quāta vi poteris gāglium vrgebis, do-  
nec solum dissoluat. Hæc quidē veterum iam exo-  
leta ratio est. Nostri meliùs, pediculum membrana-  
ceum, glandulas, venarum nouam propaginem vn-  
de gāglium coit augeturque, annotant, viam ferro  
aperiunt nudāt omnia, filo vasa intercipiūt, neruos  
delineant, pediculum glādulas, venas vnde nutri-  
tur vitium, ligant, siccant, tabefaciunt, vrunt, præci-  
dunt, atque ea ratione quasi radicē mali extirpāt, vt  
ne postea noua regenerata, suffectaq; materia nouū  
ganglium

ganglium renascatur. Quanquam hæc curandi ratio non sine periculo est, siquidem & gangliū magnū est, & eo loco, vbi insigniū vasorum neruorūque coitio fit. Subsunt quoq; aliquando putrefacta corruptaque vasa insignes venæ aut arteriæ, quæ nudatę sanguinē effundunt, quem nemo supprimat, vnde æger paulō pōst extinguitur. Terebinthina, calx viua, adeps anserinus benè tēperata ganglion dissoluūt. Aliud quod etiā facit ad ancylas. Cerusæ, olei veteris, picæ an. libr. i. ceræ ℥. 2. galbani, ammoniaci ana ℥. i. Cerusa oleo cōquitur ad puritatē, hic ammoniacum immittitur. deinde resina & cera postremò galbanū præmollitū igne. Alij quoq; aliter cōparant. Plura ad ancylas, & quæ conuulsis & gangliis bene faciēt, septimo *Ἰγνυ*, quale est Tetramyron antea notatū ē melle, quod contractis & cōuulsis vtile est, & *δυσώδης* acopon. Ceræ, terebinthinæ, medullæ cerui ana ℥. i galbani, ammoniaci ana denar. 6. olei veteris sesquilibra, & quæ proximo capitē describētur. Atq; hic terminetur oratio, vbi monuerimus ligamēta duriora, eaq; præcipuē, *Ligamenta.* quibus inter se ossa cōiugātur, in minori esse periculo. Neque ab aliis metuendū, quæ musculis inferuntur. Vtrūmq; genus vulneratū valde siccantia medicamēta perferre potest. Tendonū media natata est.

*De dolore. CAP. 3.*

**A**ccidunt multa in opere chirurgiæ, quorum remedia aliquot conspersa locis obiter annotata sunt, contra callos gangrænas, putredines, cancrios. contra vermes, rheumata, & alia. Iam de dolore simul & intemperie atque hæmorrhagia instituenda oratio, à quibus curandi consilia sæpe numero



# INSTIT. CHIRURGIC.

*Doloris cause.* numerè conturbantur. Dolor ergo omninò fit su-  
*Alteratio ca-* bita alteratione & soluta corporis continuitate. Al-  
*lida & frigi-* teratio intemperiem facit elementorù, sed à calo-  
*da grauissi-* re & frigore dolor acerrimus, à siccitate mediocris,  
*mos dolores* ab humiditate propè nullus vel stupidus excitari  
*ajfert.* solet. Atque hæc ferè non tam qualitate quàm co-  
 pia dolorem facit. Est cum intemperies sola partè  
 afficit, quæ si inualuit & radicem fixit, ægerrimè  
 percuratur. Est cum collectus humor etiam excru-  
 ciat, acerrimus quidem, vt feruida bilis, & frigidif-  
 simus, vt qui vitreus à Praxagora appellatus est. Id  
 quod ad curandi rationem maximè pertinet. Atq;  
*Dolor ab in-* omninò qui contumacior dolor est, nec facile  
*temperie.* mansuescit, intemperiem ostendit. In quo summo-  
 pere cauendum erit, ne ( quod ferè fit ignorantia  
 artis) frequentibus phlebotomiis, sæpiùs reuocatis  
 catharticis cucurbitulis ægros excarnifices, in qui-  
 bus solis summa morborum præsidia medicorum  
 vulgus collocare solet. Primum ergo quæstio ha-  
 beatur de prægressis & continentibus dolorù cau-  
 sis, deinde curandi consilia ineantur, comparentur  
 remedia quæ præsentibus vitiis, vsui esse videas.

*Solutio conti-*  
*nui.*

Diffoluunt corpus acria, vt quæ corrodat, secantia,  
 ferrum, lapis & alia, quæ contundunt, vt obtusa  
 quædam corpora, in quæ incurras, aut quæ aliunde  
 mota vi maiore corpus appetât. Adhæc quæ distē-  
 dunt, vis flatuum & humorù copia, postremò quæ  
 vel calore vel frigore vehemèter lèdunt. Iam verò,  
 contraria omnibus querenda remedia, qualia certè  
 antegressa causa & doloris proprietas, pars denique  
 ægra dolensque præcipuè indicabunt. Ac dolori  
 quàm celerrimè occurrendum, neque committē-  
 dum,

dum, vt diutiùs cruciètur egri, quibus in desiderio vel magna celeritas mora est. Neglectus dolor labefactat vires, fluxiones attrahit, vnde exacerbat phlegmonē incenduntur, conuulsiones rapiunt ægros, ac sæpè mortes, aut certè vlcera madescunt, quæ sicca esse seruata naturali ratione, & vacua excrementis necesse est. *Ανώδυνα* vocāt *παρηγορηὰ* & *λυσίγόνια*, quæ dolorem sedent, tenui substātia, primo gradu calida, vel ita temperata, vt familiaritate elementorum naturę partium consentiant. *oleum* *Olea.* dulce, etate medium, chamemelinum anethinum, è semine lini, althææ, scœnugræci, è dulcibus amygdalis, è lūbricis, vulpecula, meli lutra, erinaceis, limacibus, & pullis cygni oleo tabefactis, è floribus zambaci, hyperici, sambuci oleo immerfis, persolatis, ac subinde commutatis. *Oleum* extortum è tritico incude & candēte ferro, ex ouis pressum, è sarmentis vitium, alia quoque plurima, quæ primo libro descripta sunt. Atque hæc omnia tensa, cōstricta, refrigerata iuuant. *Rosaceum* lenit, repugnātq; *Rosaceum.* *Piperia.* causæ, vbi à calore dolor, vel à dolore calor cōmotus est. In anodynīs butyrum est, cœfypus, lana benè succida, suillus adeps, vitulinus, asininus, felinus, vulpinus, mellinus, è cercopitheco, simia, cuniculo ciconia, catello, sciuro, quo ad auriū dolores Archigenes vsus est. Otide, phalacrocorace fortilegarum superstitione, anatinus, anferinus, gallinaceus, olorinus, ex anguil. & dulcis aquæ piscibus, sed præcipuè humanus. Hęc omnia sunt recētia, bene purgata & conuenienter lota, si quid rācoris, situs, saluginis, acrimoniæ, aut alieni vitij cōceperint. *Leni* diachylon minus, solutum rosaceo & chamemelino.

# INSTIT. CHIRURGIC.

*Malactica &  
peptica ano-  
dyna sunt.*

*Consistentia  
anodynorum.  
Mucagines.*

*Lax.*

*Balnea, forus  
infectiones.*

*Cataplasma-  
ta & epithe-  
mata.*

*Fraxinus.*

*In magnis  
doloribus.*

melino. In summa, quæcunque coquunt & mode-  
rante emolliunt, doloribus medentur. Sed confe-  
ctis recens utendum erit solutis rosaceo, vel cõue-  
niente oleo. Liquidiora sunt, si quidẽ cuticularis  
dolor est, nõ ita liquida, si is altius cruciat, id quod  
in anodynorũ usu semel dictũ sit. Eo modo pary-  
gro recente & tetrapharmaco dilutis rosaceo uti li-  
cebit. In hoc genere mucagines sunt è semine lini,  
althææ, fœnugræci, nucleis, cydoniorum, maluæ,  
althææ, loliiorum radicibus, gummi arabico, traga-  
cantha, atque omninò media materia, quæ aliquid  
medullaceum habeat & vnguinosum. Colliguntur  
aqua maluacea, liliacea, chamæmelina. Esto quadru-  
pla aqua. Semina ad dirctiter duplã mucaginem ef-  
ficiunt infecta aquæ calidæ. Paucum gummi mul-  
tam mucaginem reddit, quo modo etiam radices,  
quæ quasi medulla pingui præditæ sunt, iunguntur  
oleo, quod sit sesquiplum, & ceromatis. Lac mulie-  
bre & vaccinum ad dolores facit. In lacte chamæ-  
melum althææ, malua, melilotum anodyna semina,  
interanea, pedes, capita hædorum & veruecũ per-  
coquuntur ad infectiones, forus & balnea. E mate-  
ria pista. & butyro, vel paregorico oleo iuncta fiunt  
cataplasmata. E farinis hordei, tritici, mica panis si-  
milaginei, incoctis sapa, vinis dulcibus & lacte fin-  
guntur epithemata, iunctis, si lubet, vitellis oui, af-  
fuso rosaceo, resperlo croci puluisculo, lenient hæc  
omnia & concoquent. Tenella fraxini folia aqua  
cocta pistaque, malignis, cancris & dolentibus vl-  
ceribus remedio sunt, decoctum in eundem usum  
ad forus adhibetur, in magnis doloribus & vehe-  
menter intentis locis assidue fouendum tepida, hy-  
drelæo,

drelæo, interaneorum hædi & veruecis decoctio, aliisque generis eiusdem, deinde impingendum cataplasma lene & molle. Grauitas enim, durities, asperitas omninò declinanda sunt, iam verò in hoc genere pharmacorum vitiū est, quod quæ leniunt, ferè relaxant, fundunt, liquant, vnde in plethora & cacochymia, materia calore fusa locus infirmus dolet, & opprimitur, grauius dolet, amplius distenditur, sæpè etiam viribus suis concidit, atque enervatur. Ex quo rosarū folia, absynthij summitates, aliaque generis eiusdè cōmiscenda putant, vbi ad fœtus, balnea, infusiones, epithemata pharmacum preparatur. Sed hic astringentibus abutendū non est. Etenim nimia astrictio dolorem auget. Modus est, vt inde fluxio molliter reprimatur, contineantur vires, & iustum dolori solatiū adferatur, in balneis dolentes articulos præligari iubent, obstipātque repellente auxilio, priusquam in solidū descendatur. Atque omninò vacuādum prius corpus est, si quidem postulat casus, ex quo ita mitigandus dolor est, vt ne quid inde vires, aut quam minimum detrimenti patiantur. Sed tum maximè cura viriū suscipi debet, vbi aliquid vrget, quod naturæ viribus excludatur, qualis est fœtus in dolore partus, qui vt edatur, firmo abdomine, robustis lateribus, vtero valente, cōtēntis neruis omnibus matris, suis denique viribus opus habet itaque in laborioso puerperio dum laxamus vias, & dolores consolamur, summa ratio virium semper habēda est, eadem cura sit in calculis & doloribus thoracis, vbi spūm crassius, & suppuratio repurganda est. Atque hæc de iis, quæ reuera anodyna sunt, dicta fuerint, quorum

Noxa lenientium.

Astrictio.

Viriū ratio.

Fœtus.

# INSTIT. CHIRVRGIC.

*Dolorem le-  
nunt.*

rum multa ad ea quæ postea dicentur, referri pos-  
sunt, itaque genus aliud effingunt, quod sublata  
causa dolorem vincat quale est oleum laurinum in  
refrigeratis, violaceū calefactis, siccatis hydreleōn,  
sinapismus, vbi pars aliqua humiditate elanguit.  
Adhæc quæ contra copiam & vitium materiæ ad-  
hibentur, ex quo medentur doloribus, phleboto-  
mia, cathartica, clysteres, commansa & naribus in-  
serta, *διὰ πύλας ἀρῆματα* & *ἐπὶ πύλας* Græci vocant, apo-  
phlegmatismi, *πλάσμινα*, hoc est sternutatoria,  
quæ lachrymas, menies, mariscas emoueant, fudo-  
res eliciant, aliaque generis eiusdem, in doloribus,  
inquit Hippocrates, remedia sunt, phlebotomia,  
purgatio, vitiō, sectio, sternutatio, calfacio, refrige-  
ratio. At caloris in sedandis doloribus frequentior,  
frigoris autem rarior vsus est. Calor enim naturæ

*Hippocras.  
6. Epid.*

*Calor & fri-  
gus quanta  
teneantur cō-  
stans.*

familiarissimus quique vim frigoris possit retunde-  
re, & graues æstus partium attemperet, inimicum  
vitæ frigus est, eoque solū vtimur, vbi intēperies  
calida sine materia est, vt in erysipelate quodam,  
æstuante capite, aut alia parte corporis ab ardore so-  
lis, & ambustis. Ac tertiū genus, si lubet, statuatur  
eorum, quæ stupefacto sensu dolorem fallunt, quia  
quod doleat, sentire necesse est, & extincto sensu  
dolor necessariō conquiescit. *Ναρκοτικά*, *ὕπνω-  
τικά* & *καρποτικά* talia appellant. Ac de omnibus  
ordine differamus. Calore dolorē sedant, tum quæ  
reuera anodyna sunt, tum oleum laurinum, iunipe-  
rinum. Baccæ macerantur vino, deinde oleum ex-  
tunditur mola, quod coxariis & frigidis articulorū  
doloribus confert. Adhæc galbaninū, sulphurinū,  
styracynum, piperinū, cīnamomo, cardamomo,  
nuce

*Calida ano-  
dyna.*

nucē myreplica & caryophyllis expressum. Nardinum, costinum, enidelæon, sinapinum, è sabina, ruta, maiorana, rosmarino, salvia, cētaurio, enula, iri, gentiana, aristolochia, bryonia, acoro & alia materia, quæ iam antè capite de resoluentibus & attrahentibus descripta est. Oleum terebinthinum è terebinthinæ  $\text{℥}$ . i. laterum antiquorum, vel, vt Albu-  
 casis, recentium, (quò plus olei imbibant)  $\text{℥}$ . i. mastiches, styracis ana  $\text{℥}$ . i. Lateres igniti extinguuntur oleo, & infriati cæteris commiscuntur. Capiuntur omnia capsula vitrea, ita resoluuntur igni. Triplex liquor deinceps effluit, quorū tertius optimus est. Aliud. Flores rosmarini amphora vitrea includuntur, quæ incerato duplici linteo obstipanda est, elicitur oleum calida arena. Oleum philosophorum, petrelæon de lateribus, Sabinium, & alia permulta, quorum descriptio ex Arabum libris petēda est. Eiusdem generis est oleum fæcarium, quod de tartaro appellant. Efficacissimum balsaminum, quod variè conficiunt. Thuris cādidiissimi, mastiches an-  
 vnciæ duæ, ligni aloës  $\text{℥}$ . i. caryophyllorum, galan-  
 gæ, cinamoni, zedoariæ, nucis myreplicæ, cubebæ-  
 rum ana  $\text{℥}$ . P. myrrhæ, aloës, ladani sarcocollæ, castorei ana semuncia, baccarū lauri sesquūcia, ireos, aristolochiæ rotundæ, dictamni, symphyti maioris ana sesquuncia, gummi elemnij  $\text{℥}$ . 6. terebinthinæ ad pondus omnium, cōcorporata omnia resoluuntur igne in alembico chymicorum arte. Primum extillat aqua, deinde oleū, postremò pinguius mel-  
 ligo. Contra omnia vitia & causas neruorum vale re dicitur. Sunt qui addant aliquid olei rosacei & myrtini, vermes terræ lotos è vino albo, & aquam

*Oleum terebinthinum,*

*Oleum o floribus rosmarini.*

*Balsaminum.*

## INSTIT. CHIRVRG.

*Ad dolores  
coli, vteri,  
ventris.*

illam, quæ folliculis vltimi includitur. Cōtra dolores  
& flatus vteri, ventris, coli singulariter facit. Olei  
anethini ℥. 1. seminis agni casti, seminis rutæ an. 3.  
3. cinamoni 3. 6. conquassata hæc oleo immergun-  
tur, & diebus quadraginta insolantur sub caniculæ  
ardoribus, alioqui loco tepido ad focum diutius  
continentur, dum vim materiæ oleum abundè cō-  
biberit, è decima parte castorei vel euphorbij & o-  
leo remediū comparatur, singularem perfrigeratis.  
Atque euphorbij magnus omninò vsus est aliosis  
partibus, quæque doleant, & vehementius perfri-  
xerint. Cuidam à genu acerbissimus dolor hyber-  
no frigore cōmotus est, cui Galenus ceratū quod  
euphorbium capit, vngēdo loco à balneo instituit,  
quod cū successisset, dolore protinus cessante, idē  
remedium prospero semper euentu in aliis perfri-  
geratis, atque hinc dolētibus particulis vsurpauit.  
Adhibetur remediū, & à balneo, & ante balneum.  
Sed iam ferè exoleuit lauandi consuetudo, eaque  
res multis curiosior visa est. Loco eius fouēda pars  
est decocto meliloti, rutæ, chamemeli, quæ in vino  
præferbuerint. In cephalalgis à frigore & hemi-  
craniis, laudatum veteribus auxiliū, quod paratur  
cera, oleo & euphorbio. Ac misturæ ratio superio-  
re oratione abundè notata est. Duplo veteri eu-  
phorbio loco recentis vtendum est, postquam se-  
dulò animaduertaris ætatem euphorbij, & legiti-  
mum ab adulterato satis distinxeris. Alij naturali  
proprietate hemicranicos iuuari euphorbio prodi-  
derunt, si ex aceto tritum aduersis fronti & tempo-  
ri illinatur, in eundem vsum drachma recentis eu-  
phorbij in 3. 3. olei dissoluitur, atque instillatur au-

ri.

ri. Sunt qui mistis vino tenui, giluo, odoro, & chamelino oleo omnium partium dolores persanent, radix cucumeris agrestis in taleolas cæditur, & cum cauliculis absynthij hydrelæo coquitur, ex perimento veterum singulariter iuuat hemicranias, decocto fouetur partēs, materia ad cataplasma subigitur. Calidum, vt reliqua, vsurpatur, adhibita cura vt ne refrigescat. E sex vitellis assis, myrrhæ semisse ellebori nigri drachm. granis 4. oleum exprimitur ad focum in sartagine, singulari remedio vlceribus puerorum, & omninò dolētibus callis, putredini, vermiculationi, scabiei. Callis dolētibus styracis vnciæ duæ, vel eo plus in sesquilibra olei diluuntur, ex asserculis iuniperi, lauri, abietis, ramentis cinamomi, calami aromatici, ferragine ligni sancti, oleo immersis exprimitur oleum ea arte quæ primo libro designata est, vel qua è iunipero Mesue, è cinamomo Nicolaus elicit. Diuturnis doloribus, & qui intus crucient, efficacissima acopa à veteribus prodita sunt. Quorum alia leniora, quæ externis doloribus adhibentur, quale oleum est, alia mediocria, quibus etiam compages crassior est. Atque hæc ex oleo, laxante materia & moderate calida temperantur, adipe, galbano, terebinthina, Colophonia, inueteratis atque internis doloribus accommodata. Tertium genus iam acrius, idemque corpulentum magis, quod contumacioribus vitiis & in alto corpore latentibus imperatur. Acopa duplo, triplo, quadruplo, pari interdum ad reliqua, quæ solida sunt, oleo permiscuntur. Myracopa sola odoris suauitate ab acopis distinguuntur. Ac iam subiiciamus formulas, ad quarum instar infini

*Mistura vini  
& chamelini olei.*

*E radice cucumeris cataplasma.*

*Oleum ex ouis.  
Ad dolentes callos.*

*Acopa.*

*Myracopa.*



## INSTITUTIO CHIRURGIC.

*Acopon  
Aselepiadiu.*

ta propè acopa comparentur. Maioranz, rosmari-  
ni, fœnugræci ana lib. dimidium, surculorum lauri  
lib. 2. flores iuncti odorati vnc. 1. vini veteris, olei  
dulcis ana sesquilibr. stirpes contusæ triduum ma-  
cerantur vino. Sed adhibenda cura est, vt ne hoc  
vapescat, tertio die oleum superiniicitur, coquuntur  
omnia in diplomate moderata pruna. Atque vbi  
vinum expirauit, exprimuntur omnia, vt simul o-  
leum in vas nouum diffuat. Ex quo capitur olei  
libr. 1. ceræ vnc. 2. vel eo plus, vt fiat cerato malag-  
ma. In quibusdam codicibus adduntur radicis cu-  
cumeris agrestis, nardi Celticæ ana lib. 2. quæ cum

*Ad ischidia-  
cos, opisthoto-  
nicos, & om-  
nes nervorum  
dolores.*

aliis vino maceranda & oleo coquenda sunt. Aliud  
ischiadicos, opisthotonicis, & omnibus doloribus  
neruorum vtilissimum. Cereq; selibra, terebinthinæ,  
libr. 1. guttæ ammoniacæ in aceto dissolutæ vnc. 1.  
opopanacis vnciæ duæ, galbani, medullarum cerui  
& tauri, cœsopi ana vnciæ duæ, olei irini vnc. 9.  
mellis. vnc. 3. Cera oleo colliquatur, terebinthina

*Ad paralyti-  
cos.*

additur, deinde medulla & cœsypus, reliqua igne  
remollita & cum aliis fusa permiscuntur. Quod se-  
quitur paralyticos sanat, & nervorum doloribus  
medetur. Rutæ viridis vnciæ 3. pulegij sicci, cype-  
ri ana vnciæ 3. salis, nitri vnciæ duæ, fœnugræci,  
mercurialis, succi marrubij, rosmarini, aristolochiæ  
ana vnc. 3. amygdalarum amararum desquamata-  
rum lib. 3. iris illiricæ vel florentinæ, terebinthinæ,  
baccarum lauri, radicis cucumeris agrestis, guttæ  
ammoniacæ ana selibra, ceræ lib. 1. olei lib. 9. vini  
modus controuersus, tamen iusta mensura fuerit  
libr. 12. In quibusdam exemplaribus adduntur sa-  
binæ selibra, ellebori albi sesquilibra, myrti viridis

vnc.

vnc.9. foliorum lauri siccorum vnc.9. bdellij li. 1.  
 quæ si adicietur, efficacius fiet acopon, sed ita vini  
 & olei demensum augendum erit. Interuntur quæ  
 contundi possunt paulatim affusa aqua, ex quo ite-  
 rum tundenda sunt, contusis vinum oleumq; in-  
 sparguntur, vt integrâ noctem madeant, postridie  
 incoquatur. Atque vbi vinum exhalauerit, omnia  
 concepta sacco extringatur, vt eliquetur oleum, cui  
 excolato cera, resina, bdellium, ammoniacum dein-  
 ceps confundatur. E crocino, nardino, enulato, co-  
 stino, quæ à Mesue describuntur, singas acopa, con-  
 dienda moscho, ambare, & aliis aromatibus, vt sint  
 myracopa, cera additur, liquida terebinthina, sty-  
 rax, galbanum, opopanax. Similiter & ex laudatis  
 oleis, quæq; suauiter oleant. Terrestrum testudinē  
 acuminata canna veteres transfigebant, qua parte  
 ceruix clauiculæ commissâ est, & inde ducto sangui-  
 ne acopa perfundebant, eoque meliora putabatur,  
 quo plus sanguinis combiberent. Stanneis vasis, vi-  
 treis, plumbeis & buxeis reponenda sunt. Sūt qui  
 mirabilem vim tribuant renascentibus corniculis  
 ceruorum, vbi primū extuberāt, & quasi pluima-  
 ta lanugine integuntur. Coquunt vino, dum molli-  
 tie diffuant. Singulariter excitat torpentes neruos  
 atq; paralyticos. Saluix, chamæpyteos, maioranæ,  
 florum meliloti & chamæmeli ana vnciæ duæ, olei  
 nardini lib.3. vini gilui, tenuis, odori, subausteri se-  
 squilibra, omnia illa vino resperguntur, maceran-  
 tur nocte, postridie oleum superfunditur, coquū-  
 tur in diplomate, consumpto vino diploma subdu-  
 citur, materia rariore sacco excipitur, vt purum o-  
 leum diplomate relinquatur, in quod materia ve-  
 hementer

*Acopa e quibus  
fiat.*

*Cornua ceru-  
orum.*

## INSTIT. CHIRVRGIC.

hementer exprimēda est, Postremò oleo misceantur corniculi cerui vt priùs tabefacti ℥. 3. mastiches ℥. 6. croci drach. i. Al. Olei coltini, olei nardini ana ℥. 2. terebinthinæ ℥. 1. cere sēsquuncia, moschi grana sex, Al. Extremitatum ebuli, furculorum lauri & rosmarini, maioranæ, calendulæ, saluiæ, chamæpyteos ana vnc. 2. florum chamæmeli, rosmarini & lauandulæ ana ℥. 1. baccarum lauri & iuniperi ana ℥. dimidium, radices enulæ, ireos, acori, aristolochiæ ana drach. 6. pyrethri drach. 2. seminis lini, althææ fœnugræci, sinapi, cardamomi, nasturtij an. drach. 1. conquassentur omnia, & noctem integram madaeant in vino, postridie coquantur in duplici vase. Atque vbi totum propè vinum euanuerit, omnia magno conatu exprimantur, expresso succo immisce olei lumbricorum, olei terebinthinæ ana vnc. 4. coquantur ad crassitudinem, in alio vase seorsum liquentur igne molli, olei castini & nardini ana selibra, styracis galbani, resinæ, terebinthinæ ana vnc. 1. opopanax, Benieoin vocati ana semuncia, mastiches, sarcocollæ, thuris ana drachm. 2. liquata aliis vniantur. & rursus coquantur puris carbonibus sedulò versentur spatha. Subducta foco rursus circumagatur, vt paulatim refrigerant, quod cum fit, aqua miscellanea, quæ odorem moschi rapuerit, respargantur, aque ita reponantur aliosis. inueteratis neruorum causis & profundis doloribus. Ad venena frigida, & inde dolentia præcordia nihil præstantius vino tenui, giluo, acri & odoro. seruefacto vtitur Hippocrates & condito. Alij aromatite, veteres etiam allio & sale, Alexipharmacis, theriaca, antidoto Mithridatis.

Nec

*Contra venena frigida.*

Nec omittendum nostra memoria vſitatum remedium è ramētis & delimata ſcobe Gaiaci, vel ligni ſancti. Eligatur graue, denſum, vnguinoſum, quod <sup>Gaiacum.</sup> ad lucernam pingue quid reſudet, nihil expiret gra <sup>Probario.</sup> ue, nō ſit obductum ſitu, arroſum carie, aut euani- <sup>gaiaci.</sup> dum, quæ vitia ſubterraneis locis non p̄ſſatis, vbi diutius latet, & à cortice celerius, ferè cōtrahit. Ac dum eliminatur ſcobina, contumax eſſe oportet, & odoro halitu quodam euibrare nares, ſternutamentumque cōmouere, guſtu acti & aromatico, quod enim dulce vel acidum eſt, minùs probatur, recēti ferragine vtendum eſt, expirat enim, & vim amittit vetultate. Ceſa ſit materia (ſi quidem reſeiri poteſt ad æſtium ſolſtitium, ætate media, quia tenella arbor crudo humore adeoque plena, vetuſta verò exucca & arida eſt. Mediis annis plus habet oleamenti, quod in præſentia deſiderandum eſt. Maceratur die vno breuiùs atq; diutiùs, vt vel acriùs vel clementius pharmacum deſideratur. Meracum coquitur ad dimidias plus minùſve, & aliis intermiſtum, vt ſunt conſilia medicorum, igne puro, fideli vafe bene operculato, vel quod inflexo tantū corniculo foras hiāte leniter exhalet. Ac cute quidem magis reſiccat, ſumma viſtamen in carne, & inteſti <sup>Vi Gaiaci.</sup> na pulpa pingui, vnguinoſa, ſuauiſſime olēte, incidit, terget, tenuat, calefaciat, ſudorem mouet, qua quidem amarum & acrimonia præditum eſt, terreno elemento corroborat, vnguinoſa parte & aërea laxat, mollit, anodynum eſt. Ex quo frigidis articuloſorum, & neruorum doloribus auxilio eſt, medetur topiſis, reliquias quoque luis veneræ partim attemperat, partim ſudoribus extrahit, eaſque frequen-

## INSTIT. CHIRVRGIC.

quanti experimēto paucis diebus obliterat, de quo  
 iam à multis iusti cōmētarij editi sunt. At suo quis-  
 que vtatur modo, eligat, diuidat, maceret, coquat,  
 temperet, exhibeat. Sit aqua sextupla, octupla, de-  
 cupla, duodecupla. Nā in his omnibus controuerſa  
 res est, quā faciliē dirimet, quicunque nouit omnia  
 ferē remedia integris viribus multifariā posse de-  
 formari, eaquē oportere vitiis & corporibus, etati,  
 cœlo & aliis variē accōmodari, igitur sua quisque  
 probet, nec damnet aliena. Meminisse tamē conue-  
 nit, vt attenuantiū omnium, sic huius ligni im-  
 moderatum vsum admodum periculosum gracilibus,  
 deinde quoq; iis quibus mediocre corpus est. Hiinc  
 enim calor acrior effectus tabē inducit. Eadē ferē  
 ratio iuncati ligni, Varini aut Synarini quod recēs  
 cognitū est. Decisis frustulis, alij etiā puluere vtun-  
 tur in duodecupla, vigeculpa & copioſiore aqua  
 maceratis, & dum pars tertia vel quarta expirauerit  
 in diplomatis vapore, vel clementi igne coctis, cui  
 in vſu quadrantē vini albi, tenuis & odori infundi  
 iubent. Atque hæc in præſentia de medicamentis,  
 quę calore ſuo dolorem leniāt, & frigidam intem-  
 periem corrigant. Nunc ad ea tranſeundū quę re-  
 frigerent, & anodina ſunt. Duplex horū genus eſt,  
 alia enim tantū refrigerant, alia etiam itupesciūt.  
 In primo genere ſunt, aqua etiā tepida, oleum con-  
 ditum roſis, violis, nymphæa papauere, mandrago-  
 ra, cucurbita, cucumere, alterco, lactuca, portula-  
 ca, lenticula paluſtri, pſyllio, polygono caphura,  
 floribus herbæ, quę primula veris appellatur, &  
 millefolio, & ea omninō materia, quę reprimat, nec  
 ita astringit. Ex oleis & cera alba cerata ſiunt, cera  
 mollitur

*Gaiaci vſus  
 gracilibus  
 periculofus.  
 Iuncatum  
 lignum.*

*Quę refri-  
 gerando ſui.  
 anodyna.  
 Olea.*

*Curata.*

mollitur igne,manibus versatur, & immersa aqua modò rosacea,modò violacea circumducitur,è descripta materia aquæ resoluuntur igne, quæ vocât

*σαλάγματα* : colliguntur mucragines, exprimitur succus,omnia ceratis permiscentur recenti fuc

*Aqua mucra-  
gines fucci.*

co vtédū est,quia celeriter acorē trahit, atque cor rūpitur.Muccago quoque paucos dies sustinet, in his lintea inculcātur, applicāturque dolenti loco.

Subinde cōmutantur,dum ardor simūlque dolor conquiescat.Sitque hæc cerati formula. Ceræ albę

℥.i.olei violacei ℥.3.misceto in vase duplici, sub-

*Cerati for-  
mula.*

ductis vapore ignis mucraginis seminis psyllij ses-

quunciam coniungito,& affusæ rosacæ semuncia respergito.Sunt qui cerusæ è violacea lotæ vnciā

vnā plus minúsve adiciant, idem præstant vn-

*Vnguenta.*

guentum rosatum,violatum,papauerinum & alia, quæ ad horum instar conficias.Nutritū Rhazæ,po-

pulneum tum vnguentum tum oleum. Populnei oculi vere collecti pari rosaceo infunduntur, vini

paulò plus quàm olei adiicitur, macerantur omnia diebus septem,& quotidie commouentur, octaua

coquuntur die mollibus prunis,donec vinū absumatur.Licebit quoque caphuræ momentum im-

miscere,in feruidis doloribus auriū, palpebrarum, mammatum,pedum,manuum, tendinū & neruo-

*Parabile Gal.  
romedium ad  
mulca.*

rum,vtillissimū,& inuentu facile Galeni auxilium. Ouum crudum optimo rosaceo permistum. Ori-

basius cocto vritur & è vino pisto.Alij coctura durum & constans emplastri modo calidū apponunt.

*Contra can-  
tharidas &  
venena.*

Astuosis interaneis à cantharide & venenis lacte vtendū præcipit Hippocrates, reuocandū in memoriam quod ante dictum est,in ardore graui, vt

## INSTIT. CHIRVRG.

*Paregoricon  
Asclepiadis  
vſus eſt mul-  
tiplicis.*

feruente eryſipelate, parcendū eſſe oleis, & iis om-  
nino quæ celeriter flammam concipiant, hoc enim  
eſt veteri ſentētia incēdiū oleo reſtringuere. Opti-  
mum eſt Galeno & antiquis celebratū, quod Aſcle-  
piadi tribuunt, laudauit Octauius. Nutrito Rha-  
zæ, quod ceruſa capit, finitimū eſt, facit ad ani-  
tia dolentia, achoras, herpetas, acrem ſerpiginem,  
eryſipelata, exaſperata pharmaciſ delinit, extinguit  
cancros, pudendis & genitalibus cancro, maligno  
vlcere & dolore læſis, ſolatio eſt. Paratur hoc mo-  
do. Oleū dulce, roſaceum, myrtinum, demenſo no-  
uem vnciarum piſtillo & mortario plūbeo tandiu  
verſatur, dum ſit ſtigmentofum ac liuidum. Hic li-  
thargyri & ceruſæ vtriuſq; tritæ pōdo cōiungitur,  
& vſui in plumbeo vaſe reponitur. Dolētib; cere-  
bri mēbranis in vulnerib; capitiſ, optimo roſaceo,  
vel ſanguine colūbino, vtriſq; tepētibus Galenus  
vſus eſt. Semina papaueriſ, alterci, pſyllij, cydonio-  
rū, cucumeriſ & ſimilia cōtunduntur affuſa roſarū  
aqua, lactuca, violarū, aliorumq; id genus donec  
fiat quaſi pulicula, aquarū loco ſuccuſ ex alterci,  
lactuca & papauerum foliis affundi poteſt, folia  
quoque ſub cinerib; cocta, vel ad ignē emollita  
& calida adhibita, dolore ſedant. Succuſ foliorum  
& capitum papaueriſ, alterci, cicutę, violarū, lactu-  
cæ, pomorum mandragoræ, oleo dulci vel optimo  
roſaceo infunduntur diebus aliquot inſolantur, &  
quotidie agitantur, deinde coquuntur blando igne  
donec ſolum oleum reliquum ſit. Ac ſint olei li. 5.  
ſuccorum 2. coctiſ probē permisceatur opij, ſtyga-  
ciſ ana ℥. i. calidiſ dolorib; phreneticis, cōciliando  
ſomno, frōti, tēporib; & narib; illinitur. Pſylliū  
feruida

feruida immerfum inflammato oculo applicatur.

Ceratum è pſyllio aliis partibus dolore preſſis atq;

calentibus idoneum eſt. Cydonia & alia quædam

genera malorū, vt perſica, hoc modo concoquenda

sunt. In ollam nouam aqua diffunditur, ſubiicitur

focus, malum è figlini anſa vel aliter ſuſpēditur, vt

ne contingat aquā, ſed ſublatis vaporibus infume-

tur, & eo anhelitu emolleſcat, eximitur cutis, mol-

lita caro & medullaceum corpus tēperanter calēs

dolenti loco adhibetur. Eadē arte quę refrigerent

melius in diplomate & vaporibus cōparantur. Iam

familiare eſt podagricis epithema Aſclepiadis. Me-

dullæ panis ſimilaginei ꝑ. i. incoquatur lacte, dein

de cum tribus vitellis oui, ſeſquūtia roſacei ſubiga-

tur, & drachma croci intingatur. Quòd ſi aſterior

dolor eſt, immiſceatur opij ſoluti ſapa ſemūcia, ſed

ad narcotica, nō temerè decurrēdū, de quibus hinc

ſermone ducto diſſeramus. In narcoticis potentif-

ſimum eſt opium, deinde cicuta, altercum, mandra

gora, torpedo piſcis. Opium ſuccifo ſcapo & calice

papaueris, quaſi è plaga, fluit, ſed aliter adulterant.

Synceritas probatur odore graui, gultu amaro, leni

corpore, denſo graui, candido, neque aſpero, neq;

grumofa, quòdque ſtatim aqua diluitur, & nebulā

facit, in ſole ſtatim reſudat & ſe diluit, difficilius

accēditur, & in lucernis pura nec atra elucet flāma

crebrò extinguitur, & extinctum odorem ſeruat.

Uſus eius vacuato corpore, deſperatis leuiorib. au-

xiliis in ardore graui, intolerabili dolore, acriore

ſenſu, firmis viribus, vel nō ita fractis. Deinde ſi q-

dem tenuior & acrior humor eſt aut ſpiritus, nam

in craſſis lentisq; humoribus periculofa narcotica,

minùs

*Ceratum e*

*pſyllio.*

*Modus coquē-*

*di cydonia &*

*alia id genus.*

*Epithema*

*Aſclepiad. ad*

*podagram.*

*De narcoticis.*

*Opium.*

*Probatio*

*opij.*

*Uſus opij.*



## INSTIT. CHIRURGIC.

minùs vbi crassus flatuosùsque spiritus dolorem acerbiorẽ excitat. Interdicuntur pueris, senibus, grauidis mulieribus, & quibus ætate vel morbo calor languidior est. Postremò vbi iam valetudo impatiibilis odium ægro desperationem medico vitæ attulit. Eòq; maximè, vt inde obstupescat sensus, ac solatium ægro, & remedium morbo procuremus.

*Noxa ab opio.* Quæ vt præstet, nouum tamen vitium corpori contrahit, quod postea calidis medicamentis obliterandum est. Nam vel potentiùs, vel sæpiùs admotum caliginem oculis & rugas facit, surdastros reddit, deuoratum mortiferum est. Hinc aliæ partes ad motum sensumque torpent, & viribus defectæ excrementis corporis opprimuntur, vt nõ omninò absurdè à Diagora, Erasistrato & aliis aliquot veteribus medicis in totum damnatum sit. Sed postea vsus eius nõ improbatus, & adhibita ratio vt ne noceret, atque aliis pharmacis ei⁹ violètia retusa esset. Quidam cremabant olla, dum ruffum & molle euaderet, sed vstrina vim eius exolescere scribit Galenus. Alij cauo cydonio, & qua pateret, pasta præcluso incoquant. Hæc obiter ne in re lubrica & plena pericu-

*Quibus dilui tur opium, & vtendi modus.* li chirurgus cadat, nève quidpiam, nisi maturè & optimis medicis authoribus, moliatur. Diluitur sapa è musto, vino dulci, muliebri lacte, liquore oui, permiscetur rosaceo, amygdalino, oleo è castoreo, dũ sit mellis crassitudo, ita plures menses macerari melius est sed multò magis cum dandũ est in corpus. Medicamentis quæ opium caperent, semestribus &

*Quibus permiscetur.* annotinis veteres utebantur, ad sextum annum, & aliquando decimũ, asseruabant. Specilli nucleus puro linteolo, lana molli, linoxylo deniq; circumuoluitur;

uitur, imbutur pharmaco, tum quàm molliſſimè fieri poteſt, dolori illinitur. Clemētius eſt miſto caſtoreo, pipere, cardamomo, myrrha, cinamomo, ſinapi, croco, pyrethro, & aliis quę multum caleſciant, coquant, leniant, incidant, diſcutiant, quantū videlicet caſus in preſēs exigit. Atq; vbi crudelior dolor eſt, equalis omniū modus eſt & opij, alioqui dupla, quadrupla, ſextupla, decupla quoq; reliqua opio inuenias. Quę omnia, vt ſequit dolor, & ſunt corpora, ſumma ratione diſtinguere oportet. Quod vocatur Meconium, languidiuſ eſt opio. Succuſ eſt contortis prelo, vel cōtuſiſ in mortario foliis & capitibus papaueris, cui ſi ſemen tritū immiſceas, coquas ad ſpiſſitudinem, & in ſole ſicces, opium habebis. Iſdem aqua coctiſ interdum extinguitur quod imbecillimuſ eſt. Siccatur vmbra, & vt opiū uſurpatur. Alij pollinē ex aridiſ calicibus papaueris ad ſtuporem miſcetur. Cortex radicis mādragorę magis narcoticuſ eſt ſua radice. Cicutā ſimiliter & alterco vtendum eſt. Torpedo piſciſ inde nomen habet, & Gręcè *ράγν*, quę etiam procul, & è longinquo, vel ſi haſta, virga, remo harpagine, fune attingatur, inſpirata vi, odore vel aura leui ſui corporiſ, quamuiſ præualidoſ lacertoſ torpore retinet, & celeres ad curſum pedes alligat. Piſceſ alioſ ſepultoſ limo primū cōſopit, deinde ad eſcā rapit. Exemplum verò ſponte oblatū, vt alia plurima ad ſalutē hominiſ & remedia medici tranſtulerunt. Viuam torpedinem oleo extingunt, vt ſit narcoticon. Et hoc quoq; mirum quod inuenio. Si capiatur, cū luna in libra fuerit, triduq; aſſeruetur ſub dio, faciles partuſ facere poſtea quotieſ inferatur adiuuare,

*Moduſ miſture.*

*Meconium.*

*Cortex radicis mandragorę.  
Torpedo.*

*Remedia e torpedine.*

*Oleum e torpedine.*

*Ad faciendū partum.*

## INSTIT. CHIRVRGIC.

re, non alia vi fortasse, quàm quòd velut induciis dolorum datis, natura ad excludendum foetū confirmatur, felle quod suo pisce calidius esse oportebat, genitales partes illitæ ad venerem torpent. Vinea torpedo subiecta plantis arthriticos in præsentia & in reliquâ vitam dolore liberat. Inueteratas pœnas capitis consopit. Nigra præfertur, tâdiu insistat donec permeante aura dolor obdormiscat. Noui podagricos, qui sæuiente malo dolentē pedem frigidissima perfundant. Alij hybernas reponūt niues eidem remedio. Sed vbi frigore dolor obtorpuit, petrelæ fouent, & paroxyſmis liberantur. Arcanū hoc est Albucasis. Bina capita aut plura aliorum cum  $\mathfrak{z}$ . i. opij trita permiscentur, & vocato alébico quod vitreum sit, capta resoluuntur igni, destillat aqua singularis, quæ per se datur demenso cochleari, aut cum vino internis doloribus. Aliter quoque excolatur sacco subquadruplo iosacchare addito & exiguo cinamomo. Alij opio quadruplâ theriacam permiscent, & dant alembico. Cruciatis dentibus aquæ id genus instillantur, infunduntur auribus captæ auriscalpio, hinc topica auxilia imbuuntur, infuccantur lintea, quæ oculis & aliis partibus applicant. Alia aqua. Theriacæ  $\mathfrak{z}$ . 2. conditæ enulæ & i-reos ana  $\mathfrak{z}$ . i. succi baccarum lauri & iuniperi, succi betonice, centaurij minoris, verbasci, marrubij ana.  $\mathfrak{z}$ . 3. florum nymphææ & violarum, corticis radicis mādregoræ ana  $\mathfrak{z}$ . i. seminis alterci albi  $\mathfrak{z}$ . i. opij  $\mathfrak{z}$ . duæ, excepta alembico artificio resoluuntur, sed melius in diplomatis. Veneno læsis quæ vrant corpus, internis doloribus qui cum febre cruciant, vt prior exhibetur. Diarhodō Nili ad fluxiones acres

*Remediū po-  
dagricorum.*

*Arcanum  
Albucasis.*

*Alia aqua  
contra male-  
ficia.*

*Diarrhodon  
Nili.*

& cruciatus intolerabiles oculorum, rosarum re-  
 sectis vnguibus 3. 4. croci 3. 2. gūmi arabici 3. 1. spi-  
 cæ, opij ana scrupuli dimidiū, vniuntur aqua. Qui-  
 dam è Græcis aucta spica & opio conficiunt, quod  
 in vocato Sief. rosato posteritas secuta est. Ac cō  
 stare arbitrør, vt asperior dolor est, ita conuenire  
 opiū augeri. Initiis inflammationū conuenit hoc  
 collyriū albū. Gummi arabici, tragacanthæ ana se-  
 muncia, cerusæ lotæ 3. 6. opij soluti sapa vel vino  
 dulci 3. 1. iungūtur liquore oui. Incrementis vtile  
 quod sequitur, Sarcocollæ (vt dicunt) nutritæ 3. di-  
 midiū, amyli, tragacanthæ ana semuncia, cerusæ lo-  
 tæ 3. 6. thuris sesquidrachm. opij 3. 1. conficiuntur  
 aqua, rectè quidem initio, quæ reprimant, incre-  
 mentis etiam quæ leniant, author cōmiscuit in vi-  
 gore lenientium modus vnguēdus est. Sarcocolla  
 verò nutriēda, vel si lubet, macerāda hoc modo, vt  
 sit suauissima, siccet, incarnet & cicatrice claudat.  
 Trita igitur dies aliquot maceretur rosacea, cōsum-  
 pra aqua, rubi canini succus affunditur, quem vbi  
 cōbibit, subiicitur lac mulieris vel asinæ, postremò  
 resiccatur illa, puluis vsui est. Mirabile collyrium  
 Alexādrini in ophthalmia graui & dolore. Cadmię  
 vstæ & elotæ 3. 10. cerusæ lotæ 3. 1. scorie ferri v-  
 stæ, lotæ, gummi arabici, tragacanthæ ana semun-  
 cia, opij 3. 4. compinguntur è pluuia dilute prius  
 opio è sapa, quod reliquis collyriis cōmune sit. Sūt  
 qui thure addito & momento croci conficiant, vn-  
 de leniendis dolorib. magis cōueniat. Cadmia ve-  
 rū & scoria hac arte coparandæ sunt. Ex his frag-  
 menta parua crudis fictilibus cremātur, donec per-  
 coquantur vasa, hic metalla extinguuntur lacte, se-  
 mel

*Sief rosatum.*

*Collyrium al-  
 bum initio.  
 Aliud incre-  
 mento.*

*Sarcocolla  
 nutrita.*

*Collirium  
 Alexandri.*

*Cadmia &  
 scorie præ-  
 paratio ad  
 multa.*

# INSTIT. CHIRVRGIC.

*Asclepiadis  
cadmia.*

*Decoctione me-  
lilori oculare.*

*Vide modus.*

*Ad aurium  
dolores.*

mel atque iterum crematur, vstaque extinguuntur transferuntur in mortarium, vbi ex aqua fontis diu versantur, & omnino perpurgantur, arida in pilam repetuntur, volutantur manibus affusa pluuia, postremò sicca teruntur in puluerem, plane diuino auxilio, vbi lippitudo grauis & fluxio acris est, vbi siccanda suppuratio, lachrymatio, & alia. Suaue epuloticò est, & implet carne. In pruritu, vitione & ardore mirificè iuuat captum liquore oui. Asclepiades cadmiã fractam excipiebat melle, fictile cremabat, quod multis rimis vel breui foramine pateret in vertice, donec è nigro fumus albidior exhalaret. Atque hæc mistura detergendo & incarnando magis idonea est, in vsu collyria liquidissimè diluuntur liquore oui, muliebri lacte vel asinæ, decocto meliloti ex huius ℥. i. & aquæ ℥. 9. vel decē coctis ad tertias. Palpebra molliter attollitur, medicamentum tepidū è corniculo instillatur, vel eodē reuerse palpebræ sublinuntur, linteolum molle inculcatū lacte & oui albumine superdatur, laxiore fascia, molli leni, simplici, & iisdem liquoribus insuccata omnia cōtinentur. Ad aurium dolores opium sapa diluitur, pari castoreo seorsum trito coniungitur, vel certè duplo, in vsu, lacte, sapa, rosaceo vel amygdalino dissoluuntur infunditur autem vt reliqua, auriculariis clysterib. vel auriscalpiis, ὠτερχύτας vocant, ὠτορρυχίδας. Aliud. Opij soluti sapa, castorei triti ana ℥. i. myrrhæ scrupuli 2. croci 3. vnus, diluuntur vt prius. Alioqui coniunguntur lacte, sapa, oui cādido, vt sit mellis crassitudo. Linamentū molle vel auriscalpium auersa parte obolutum lana, mistura intingitur, & quam blādisimè inseritur

inferitur auri. In cruciatu dentium aquæ instillatur, catapotia induntur cauis. Opij, myrrhæ, styracis ana 3. 2. piperis albi tusi & cribrati, galbani ana. 3. 1. è vino Cretico vel simili catapotia formatur, eodem modo multa cōfinges è pipere, cardamomo, pyrethro & aliis triplis vel quadruplis opio. Stirax cera, mastiche galbanū, terebinthina opio ita permiscuntur, vt ex aliis prius coalescat catapotium, quod sexta parte opij diluti sapa imbuatur, edulca sint & odora, bene etiā sapiāt, quæcūq; mista opio insinuatur dēti, vel corpori inferuntur per os. *Ad podagricos.* Styracis liquidi 3. 2. opij 3. 1. Al. Cerati rosacei sesquuncia, opij semuncia, croci drachm. 1. Al. quod statim dolore liberat. Succī absynthij, croci, opij an. 3. 1. ceræ semuncia, vnguenti irini 3. 6. vini Cretici vel similis quantū sufficit cera & vnguentum vna colliquantur in diplomate, intinguntur croco, opium dilutum sapa coniungitur, omnia succo absynthij & vino perluuntur, irini loco aliquo ex descriptis myracopis vtendum erit. Al. Seminis cicutæ desquammatæ drag. 6. croci, opij ana 3. 1. passi Cretici vel vocati maluatici quod sit satis trita reliqua excipiuntur cerato rosaceo, & passo imbibuntur Al. Dialthææ 3. 1. styracis 3. 2. opij 3. 2. croci scrupulus 1. Ita diluto terrapharmaco, parygro & aliis paregoricis, opio subtriplo, subquadruplo, subdecuplo etiā plus minúsve vngueta finges. Conueniunt internis doloribus Asteriacæ *Internis doloribus.* diacodyon. Philonis antidotus, requies Trochisci ex electro, trochisci Stellæ, pilulæ de cynoglossō, Panacea, Harmonia, & alia de quibus ad medicos omninò referendum est. Ac breuiter non nisi sum-

## INSTIT. CHIRVRG.

ma ratione narcotica imperanda sunt, vbi intolerabilis dolor est, vbi conficiuntur vires, grauiam animi deliquia incidunt, & à reliquis auxiliis desperatio est. Ac quanquā suus cuique dolor atrocissimus est, sed ei præcipuè, qui natura molli & pusillo animo natus sit, nō protinus tamen subscribendum ægro. Sed ea prius animaduertenda sunt, quā, ad narcotica temerè decurramus. Atque hæc de refrigerantibus & narcoticis. Siccitas aqua tepida, hydrelæo, dulci oleo, tepore balneorū tēperatur. Humiditas phlebotomo, cathartico, sinapismis, dropacibus & cauteriis vacuanda est. Atque in hoc etiam genere ponendum esse argentum viuum, quo iam veluti extremo præsidio in lue venerea vti solenne est, satis indicat diffluens illa saluatio & alui profluvia. Hydrargyron vocant, quia liquidum, quatuor olim generibus distinctū, naturali quidē duplici, altero, vt ait ille, vomica liquoris æterni, quodque è venis metallicis spōte diffluit, altero quod exudans in argentariis fodinis cameris hæret, & guttatim coit. Fuit & factitium duplex, alterū è minio, alterum è marmoris ramentis, iam verò è plumbo quoque eliquatur, eligatur purū, splendidū, albicans, bene depuratum plumbo, quod iterum repurgandum, excolandum, macerandū, & vt loquuntur, sedulò extinguendum est. Ac dū extinguitur, & aliis intermiscetur, diu versari, tundiq; necesse est, extinguitur salua sani hominis, qui neque ore, neque naribus olidū quid spiret, qui nū oleathircū, qui denique omnino inculcata valetudine perfruatur. Ad hæc terebinthina & inde oleo, vel amygdalino, amaris, detergentibus, tenuantibus pharmacis, quæ consolentur

*Hydrargy-  
ron, & eius  
differentia.*

consolentur nervos maleficis iniuriis corporis, & medicamentis aduersentur. Postremò sedulò miscetur acriter volutando circumagendòque, donec effusum omninòque resolutū in axungiis, vnguentis oleis, & mistura quę lubeat, atque ita periisse videatur, nusquàmque integritas eius appareat. Modus autē ad pinguiā vt ad circiter quadripla sint, sextupla, noncupla, euariante ratione, vt est vitiū & corporis natura. Sed misturę vsusque ratio ex aliorum cōmentariis, qui de lue venerea scripserūt, repetenda est. Cōtra interna vitia quę relinquat hydrargyron, lac caprinū multum subinde potum, & subinde renomitum auxilio est. Vinum quoque, in quo absynthium, hyssopus, oryganū, api, & ormini semen, cacumina centaurij minoris, gētianę radix, & alia id genus inferbuerint. Mirabile hoc contra ea vitia hydrargyri. Scobs ex auro subtilissimè delimatur, & in superiore vino propinatur. Balneis quoq; vtendū est, & aqua illa theriacali. Illinendū corpus oleo, quod ē sulphure cōparatur. Alia quoque iniuria corpori accedit frictionibus illis, vsuq; hydrargyri. Nam dum fricantur egri, atque inedia, etuariis, sudoribus, salina, profluuiis, graui animi cura, fastidio, vigiliis & doloribus tenuantur, sanies quēdam necessariò eliquescit, quę nisi vel sudoribus, vel aliter vacuetur, suppressa parte aliqua desidet, hicque mora lentescit mucco similis, tandemque in tophū coit, quod cum sit, acerbissimi dolores interdum commouentur. Eadem rursus aliquādo in perioftion sese dispergit, intus cruciat, ossa atterit, cariem, nigredinem, syderationem denique cōminatur. Constat autem experimento impa-

*Centra vitiis  
hydrargyri.*

*Tophi generatio.*



## INSTIT. CHIRVRGIC.

tibiles cruciatus, qui inde generantur, frustra adhibitis aliis auxiliis impresso cauterio sæpenumerò percurari. At summa vi imprimendum ferrum est, quod omninò igne excandeat: quia videlicet in re-  
belli vitio cum semel ad crudele auxilium decur-  
rendum est, agere clemēter, & quasi blandiri malo, *fœuire* est. Sæpè fit etiam cum neque tophus, neq;  
*Sanies infi-* aliud quicquam foras emineat, vt virulenta illa *des periosio.* *sanies* intus delitescat, quæ membranis ossiū & ner-  
uis insidet, eaq; discruciat, vbi cultello facienda via  
est, vacuanda materia, & si quid vitij os contraxit,  
candente ferro mali vestigium omninò obliteran-  
dum est. Atque hæc sunt communia iis, qui cina-  
brio vocato, aliisq; generis eiusdem infirmantur.

### De Hæmorrhagia. CAP. 4.

**N**on è recenti solùm, sed & inueterato vlcere  
sanguis effluit, apertis, ruptis, exesis vasis. Ex  
arteriis hæmorrhagia periculosior est, deinde è ma-  
ioribus venis, quas inde *αἱμορρῆς* vocauit Hippocr.  
*Remedia in* Apertis adstringentia, ruptis glutinantia, exesis far-  
*genere.* cotica & boni succi alimenta remedio sunt. Atq;  
vniuersa hæc materia aliis locis explicata est: ve-  
rùm & hoc loco, quæ veteribus medicis ac poste-  
*ad aperta.* ris ad hæmorrhagias probata sunt, aliqua ex parte  
referentur. Aperta sunt tū quæ clausulis dehiscant,  
tum quæ poris atque spiraculis rarefacta sint, eaq;  
*Calla.* iuuant plantago, balauitia, hypocistis, rhus, ompha-  
cium galla, & hæc magis, si deflagrans igne, auste-  
ro vino vel aceto extincta sit & intrita, acacia, ma-  
licorium, & capitula punicorum, symphyti radix,  
porrum contusum, polygonum, peruinca, terra  
figillata, argilacea, figulina, bolus armena, tha-  
barbar

barbari magma, rubigo ferri, lapis hæmatites passæ  
vux nucleus, flos gallij, mentha oxycrato tinctoria, la-  
nugo quæ contoneis, quæq; quibusdā salicibus in-  
fider, & quæ ex his paniculæ dependent: fragorum  
herba, cynosbatus, aqua frigida, vinū adstringens,  
acetū, oxycratū & alia quæ in epuloticis, glutinan-  
tibus & repellentibus prius descripta sunt. Eadem  
quoq; ruptis, & hæc peculiariter conueniunt, thus,  
manna, aloë, mastiche, tragacatha, gummi, amylon,  
gluten, larigna terebinthina, pix sicca, Colophonias  
gypsum, farina pistrinalis, cochlea cum domo trita.

Horum alia in puluerem trita insperguntur, alia im- *Vtendi ratio.*

pinguntur. Ac ferè meliora sunt quæ emplastica:  
ex quo in oui cādido, resina liquida, tragacathæ suc- *Linamentorū  
differentia.*

co, conueniente mucagine rectè imponuntur. In  
eadem quoque materia linamenta madent, lina-  
menta verò, vt res exigit, figura cō mutantur, ac fe-  
rè omni genere linamentorū vsos veteres in hæ-  
morrhagiis inuenias. Aliud ergò linamentū in lon-  
gitudinem implicatur, *μακρὸν μοτὸν* alij *λημνίσκος*

vocat, quo in profundis vlcerū vasis vtī necesse est.  
Eadem crassiora fingi possunt: & tenuiora: quæ si  
penem referant, illi *πριαπισκωτὰς μοτὰς*, nos for-  
tasse penicillos appellabimus: quibus in vteri hæ- *Penicill.*

morrhagiis & angustioris sinus vlceribus opus est.  
His exilia quidē, sed oblonga linamenta in propin-  
quo sunt, quos vermiculos vocat: hi vasīs hiātibus *Vermicul.*

inferantur. Est & *σφηνίσκος* cuneolus contortū li-  
namentum & implexum angustiore cono, & basi  
ampliore: hoc naribus inditur, & iis vlceribus, quæ  
ore quidem latiore patent, sed in sinū paulatim cō-  
trahuntur. Qui verò *μῶλος ἐλμαχνηωτὸς* appella-

## INSTIT. CHIRURGIC.

*Spongia.*

tur, non à figura sed materia nomen habet, fungi genere vel spongię, vnde & vulnerarij penicilli & funiculi lucernarij fingebātur. Nūc è mollioribus spongiis fungorum pediculis. iunci genere quem scirpū vocant, quódque pro ellychniis lucernariis vtuntur. medulla sambuci, aliisq̃ue id genus loco ellychnij vti licebit. Quę dū intruduntur cauis, si quidē replicantur, specillo impelli possunt. eo modo Heraclides spongia modo sicca, modo in acetū acremersa vti præcipit in nariū hæmorrhagiis, sed extrema parte alliganda filo, vt tēpore reuelli possit: quę si tenaciū in hæsit. madefacienda aqua, vt faciliū redeat: rursus linamentum aliud *σπεινερ* contortū. è materia ita cōtorra & implexa, quales ferē turundę vulnerarię cōfinguntur. Aliud genus est *ξύθυ* derafa quædam lanugo linteorum, *τιλτά* vocant & *ξύματα* quasi volsuras & rasuras quædam. quę concerptis ac depexis linteis colligūtur. Atque hæc variē formari possunt, ac sæpe in floc-  
cos *κροιδας* vocant, & tomēta conferuntur. vnde implent vulnera sordes extergent. siccāt, offarciūt vasa & vicina loca ex quibus hæmorrhagia cōmouetur. Vt ergò figurę sunt partium & vulnerū, ita linamenta variē commutentur. Iam verò è pilis leporis penicilli, vermiculi, flocci cuneoli conuenienter fiunt: & rursus è lanugine illa salicis atque cotoneorum. Asclepiades lanugine utebatur, quę Platani foliis inhæret: quidam panniculis salignis: alij molliter euellunt quod velut muscus candidus populi foliis adnascitur. Hęc autem liquoribus & medicamentis quę retineant, insuccantur.

*Ex pilis leporis.*

Vermicu-

Vermiculus hianti vasi inferitur, floccus eadē materia saturatus superdatur, & alia similiter, vt postulat casus. Tum ligantur omnia iniectis vasi tribus aut quatuor fasciarum orbibus, vel etiam pluribus *Deligatio.* ad eā partem, vnde profluit sanguis, ex quo fascia ad radicem vasis paulatim adduci debet, vt fursum versus magis magisque adstringatur, & illabentem sanguinē retineat. Tertia die resoluēda lintea sunt, neque commutanda linamenta, si quidem firmiter inhærent, tantūque irriganda pharmaco, & vt prius religanda sunt. Quæ si vacillant, digitus vasi imprimendus, reuellenda turunda, noua omnia de integro repetenda sunt, idque tandiu reuocandum donec renata carne ac bene stipato vase extra periculum omnia videantur. Aliquando fit vbi in superficie vasa exponūtur, vt digitus impressus sanguinem sistat coacto grumo. Atq; is medicamento iungi potest, quod & lentum sit & glutinet. Quod si vas longiùs recessit, specilli extremo lana, linamētū, aut aliquid tale obuoluetur, quod cōueniente pharmaco madeat, atque ita inducetur. At si patitur locus, nudatur vena, hamo prehenditur, leniter intorquetur, intercipitur laqueo, aliquādo etiā volfella capta duob. locis deligatur, atque media interciditur, vt extrema in se coeant, & nihilominus ora præcludantur, id verò in maioribus vasis non caret periculo. Vt nec id quidem res patitur, candenti ferro inuri possunt. Funiculi verò quibus *Cauterium.* religātur, sunt o mollis lycio vel serico, sed qui firmiter præstingant, teneant, nec faciliè dissoluantur aut putreant, itaque chordis aliquando vtendum erit, sed tenuioribus, quales testudinib. muscis in-

# INSTIT. CHIRURGIC.

*Vbi magis  
metuitur hæ-  
morrhagia.*

tenduntur, fetas alij vsurpant. In magnis vulneribus, & ea fede, quæ venas insignes habet, profusio magis metuenda est, id ferè intelligi potest ex impetu ruentis sanguinis. Hic ergo maiore cauendû cura, siccis linamētis vulnus implendum est, supraque imponenda spongia ex aqua frigida expressa, aut potius lintea complicata, quæ vocant *διπλώματα*, & ea manu comprimenda. Quod si ne hoc modo sanguis acquiescit, & multo sanguine lintea inquinantur, ea sæpius commutabis, & si sicca parum valent, aceto madefacienda sunt. Id ve-

*Acetum.*

*Alia ratio in  
metu hæmor-  
rhagie.*

hemens ad sanguinem supprimendum est, Ideoq; quidam id vulneri infundunt. Probanda quoque hæc ratio, cauum concerpto linamento impletur, platysma superdatur & diplomata. Hæc verò pul- tica potius inculcantur, quæ retineat, qualis ex ovo farina gyri vel triticea, & bolo armena parari solet. Atq; omnia fasciis alligantur, quæ madeât oxycrato. In somno & interuallis, in excubiis esse oportet, qui subinde recognoscat, num quid sanguinis per lintea exudet. Sic enim noua cōsilia capienda sunt, aut solutis linteis noua imponēda. Sed alius rursus metus subest, ne vi maiore & ante tempus retenta materia magnam inflammationem positea moueat. Ideoque scriptum ab Hippocrate, vtile esse crebrò sanguinem fluere ex omni vulnere, nisi sit in ventre, recognoscendum tamen est, num qua ante vulnus profusio præcesserit. Sic enim profluens sanguis celerius retinendus est. At si ante tēpus suppressa materia est, & inde metuitur inflammatio, q̄ putes superesse, vel phlebotomo, vel aduersa parte fixa cucurbitula detrahes, vnde abeat

*Non temere  
supprimendus  
sanguis.*

metus

metus, & sanguinis cursus reuocetur. Adhibenda quoque partium ratio est, nam quæ natura frigida, exangues, neruaceæ, quale cerebrum, qualis uterus est, multò effuso sanguine grauius læduntur. Adhæc quæ plurimo spiritu indigent, vt oculus, eo deterius suo munere perfunguntur. Præterea quibus plurimus calor opus est, vt ventri, quo concoquat, thoraci, quo vitam foueat, larga profusione peius laborant. Itaque tempestiuè claudatur sanguis, iuxta ratione leuato corpore, vt phlegmonem prohibeas, reficces vulnus, vnde possit celerius coalescere. Atque omni adhibita cura desperatis aliis auxiliis ad ignem & cauteria decurrèdum, multò magis si quid putre, rodens, serpens, aut vermiculosum, si eiusmodi locus est, qui faciliè cõputrescat, qualis est sedes, os, genitalia, quiq̃ue vim ignis sine periculo sustineat, vt qui in carne & sine neruis est. Sed ad hæc non prius decurritur inflammationis metu, quam satis multa materia profluxerit, quam bene purgatum corpus & vacuū excrementis extiterit, escharotica hoc loco vehementius adstringere oportet, vt firmā neque deciduā crustam efficiant, alioqui remedia profluuii vincuntur, & excussa crusta maior vis sanguinis erumpit. In remediis laudantur phlebotomia, cucurbitula, sanguifuga, vincula aduersa parte, & ὀδύνην reuellendo adhibita. Cucurbitulæ ratio ex libello nostro repetenda: de phlebotomia & sanguifugis alio quod paramus, opere differemus. Purgatio sæpè necessaria, sed tardius opitulatur, nisi interuallis & quasi datis induciis hæmorrhagia moueatur. Id ferè fit quū stasis periodis humor acris ad partem vnde profusio est

*Ratio partium  
in supprimendo  
sanguine.*

*Ignis & cauteria.*

*Escharotica.*

*Phlebotomia,  
&c.*

*Purgatio.*

## INSTIT. CHIRURG.

*Ratio reme-  
diorum extra  
sione partiū.*

verti consuevit, Atque his ferè remediis adstringē-  
tibus, emplasticis, deligationib. funiculis, vinculis,  
auerfionibus, præcisionibus, igne & cauteriis hæ-  
morrhagiæ retinēdæ sunt, in remediis videndum  
prius, qualia esse oporteat, quæ singulis partib. me-  
deantur, in hæmoptoicis, qui sanguinem è thora-  
ce reiciunt, atque omnino vbi longa & anfractuosa  
via est, quæ medicamentum inuehat, qualis est  
ad renes & pulmones, adstringētes quidē & viscida  
materia necessaria est. Verum ne quod adstringit,  
restitet in via, & quod viscidum est, lentore suo hæ-  
reat cursu, aliquid medicamētorum quæ tenuitate  
partium prædita sint, necessariò miscendū erit. Vbi  
vero recta via est, aut non adeò inflexa, vt ad gu-  
lam, ventriculum, intestinum rectum, vterū & ve-  
sicam, eo genere medicamentorū quæ tenuia sint,  
nihil est opus, in exteriori corpore satius fuerit, vl-  
cus emplasticis obstipari in conceptis linamentis  
aut turundis, deinde vias intercipere repellentibus  
auxiliis, qua scilicet sanguis decurrit. Frigidū enim  
& adstringens, quale repellentium genus est, vlce-  
ribus mordax. Et in iis frigido vtēdum, vnde fluit  
sanguis aut fluxurus est, non vt partibus quidē ad-  
hibeatur, quæ sanguinem reddunt, sed superioribus  
locis vbi venæ sunt communes, qua ad vlcus mate-  
riæ cursus est. Aliæ quoque partes, vt thorax, & quæ  
diaphragmati vicinæ sunt, quæ exangues, natura  
frigida & neruaceæ, frigido læduntur magis. Ita  
que iam auersa materia, neque id quidem locis om-  
nibus, frigida conuenient. Columbæ sanguis &  
eo magis pharmacum è thure, aloë, oui candido, &  
pilis leporis hæmorrhagias è membranis cerebri  
reprimunt

*Quomodo fri-  
gidis vtendū.*

*Locus Hippo-  
cratis 5. aph.*

*Ad hæmor-  
rhagias me-  
dicamē-  
tum è thure,*

reprimunt. Thuris partes duæ aloës pars vna, vel <sup>aloe, uno &</sup>  
 eo plus in duriore natura: trita excipiuntur liquore <sup>pilis leporis.</sup>  
 oui: è mollissimis pilis leporis vermiculi finguntur,  
 illinuntur pharmaco, & apertis vasis inferuntur.  
 Ex iisdem pilis formatur floccus, qui eodem medi-  
 camento imbuitur, & ita superdatur, vt incumbat <sup>Historia.</sup>  
 vermiculo. In eunucho summam manum vlcus  
 malignum occupabat, secuta profusio: adhibitum  
 hoc remedium, nec eo quidem acquieuit sanguis.  
 Postea verò in totum restitit linamentis ex dilutis-  
 simo oxycrato pressis subinde irrigatis, ne exares-  
 cerent: id in corporibus sensus acrioris fieri con-  
 uenit. Cuidam è vulneratis cerebri membranis lar-  
 gius profluentem sanguinè acetum cohibuit, cum  
 iam varia genera remediorum frustra tentata es-  
 sent. Loco thuris vsurpatur manna, vt quæ adstrin-  
 gat magis, sed thus <sup>ἐμπλαστικώτερον</sup> pharmacum  
 reddit. Loco pilorum leporis linoxylo, quod lin- <sup>Thus, Manna.</sup>  
 gua Syriaca vocatur Cotton, & memorata lanu-  
 gine cydoniorum bene depexa atque carminata,  
 postremo commodè intorta vti licebit. Spongia- <sup>Spongia.</sup>  
 rum hac parte multus vsus est: nam & inde cuneo-  
 los modò siccos, modò aceto tinctos, tum naribus  
 tum vlceribus, quæ sanguinem fundunt, effingi-  
 mus. Spongas forti aceto immergimus, & magna  
 vossella captas in candente lapide volutamus, vt  
 inde fumus sanguinem supprimat. Sic vsus Hera-  
 clides. Eisdem alij, sed molles, ex oxycrato pres-  
 sas imponunt. Verum in eo quod sequitur om-  
 nium veterum medicorum consensus est. Spongia  
 noua alioqui vetus, sed marina, vel lixiuio quer-  
 no repurgata, acerrimo aceto inebriatur: quo  
 inquinatur



## INSTIT. CHIRURGIC.

inquinatur liquata pice, deinde trito bitumine, gal-  
la, vel re simili conspergitur, atq; ita crematur testa  
figulari clausa, dū cinerescat. Alij aceti loco tauri-  
no sanguine imbuunt: ex odore vino propināt sin-  
gulari ope dysenteriiis, menstruis & internis hæ-  
morrhagiis. Datur pulvis in ovo forbili hæmoptoi-  
cis, & iis qui sanguinem vomunt: aridus inspergi-  
tur expositis locis, vnde prorumpit sanguis, & em-  
plastice auxiliis cōmiscetur. Eandē vim attribuūt  
crematis lanis sordidis: vtrūque cinerem in clyste-  
ribus dysentericorum iniiciunt. Olla recenti, quæ  
lato dehiscat ore, copiosa lana includitur, opercu-  
lum superdatur vasi, quod vel glutino vel figulina  
terra, alioqui gypso subactis aqua fideliter cōpin-  
gitur: in clibanis & fornacibus largo igni combu-  
ritur, dum olla percocta sit: sic enim Damocrates.  
Ea prius immergi aceto potest, aut contaminari li-  
quefacta pice, atque omninō ita cōparari vt spon-  
gia, deinde cremari. Hippocrates absumendis car-  
nibus putridis & excrescentibus inspergit. Alij eo-  
dem auxilio impetigines exterunt. Emplastra sunt  
gypsum crudum, gyris farinæ, si oui candido exci-  
pias. Cochleæ cum suis volutis & saliva cremantur  
novis fictilibus, cinis sectæ arteriæ inspergitur, &  
sanguinem sistit. Muccus saliuosus qui compūctis  
cochleis & limacibus redditur, emplasticeus est, in  
quo cineres & pulvisculos qui sanguinē claudant,  
conuenienter adhibebis. Vitellus oui exassatur, vt  
in pulverem possit resolui, & hæmorrhagiis me-  
ningum cerebri inspergitur. Barbarum quod miri-  
ficè sanguinem compescit, vulnera magna, præci-  
pue capitis, præ ceteris glutinat, fistulis: lacunis, fra-  
ctis

*Lana sordida  
adstringens,  
etc.*

*Cochleæ. In  
hæmorrhag.  
arteriarum.*

*Vitellus oui.*

*Barbarum.*

ctis ossibus medetur. Bene facit hepaticis & lienosis: citra inflammationem glutinat, neruis, cartilaginibus & ossibus præcis remedio est. Cuniculos vlcerum & purgatos sinus coniungit: valet ad canum hominumque morsus. Præstantissimum verò ad sanguinem suppressum, præsertim in iis qui sanguinem reiciunt. Nam in aluta pectori, dorso & lateribus affigitur, ac veluti miraculo cõpescit. Cere, picis, resinæ pini, bituminis an. ℥. i. manna ℥. 6. cerusæ ℥. 4. calchanthi ℥. 4. opopanacis vnciæ duæ, olei semuncia, vel, vt aliis melius selibra, aceti sextarius. Cerâ, bitumen, oleum, & maiorem aceti partem in olla colliquato, deinde picem & resinam adiecto, quas in minima frusta prius cõcidito: vbi semicoctum fuerit medicamentum, ollam subducito, vt cunque refrigeratis attramentum sutorium purgatum, & ex aceti sextario leuigatum, siccatumque paulatim inspergito, commoueto ne quid efferuescat. Cum non inquinat pharmacum, ollam deponito, opopanacem in reliqua aceti parte (nam maior pars statim initio cum aliis in ollam data est) maceratum immittito: vbi dissolutus fuerit, cerusam & mannam tritas inspergito, & paulatim tepefacies, curato vt coeant, & ne opopanax, nec manna aduratur. Hic in mortarium transfusa omnia circumagitato, misceto, ac tandem reponito. In usu medicamentum estate quidem tertia die solui potest, si quidem res ipsa atque necessitas postulet: at ferè non nisi quinto detrahatur, vt hyeme septimo: vitriolum crudum chalcitidis loco miscere licet, & si bitumen defit, pix liquida supponitur, aut mumia Mumia appellata, quam alij humiâ vocant, cui in claudendo sanguine

## INSTIT. CHIRVRGIC.

*Pilula quæ sanguinem claudant.* sanguine mira vis ab Arabibus medicis tributa est. Cōcorporatur oui albumine succo polygoni, plā-  
 taginis & similibus. Finguntur inde catapotia hoc modo. Muccaginis, gummi arabici & tragacanthæ collectæ in aqua rhois aut cornorū ana ʒ. 2. mum-  
 miæ, mastiches ana ʒ. 1. sacchari rosacei quantum sufficit: tenentur sub lingua hēmoptoicis, vomen-  
 tibus sanguinem in sorbili ouo diluuntur. In cruē-  
 tis dysenteriiis cū decocto oryzæ tostæ aut auenæ, succo plantaginis, rosarum, virgæ pastoris, hordei cremore, in quo tragacantha maduerit, aliisq; eius-  
 modi clystere iniiciuntur. Commiscentur empla-  
 stris, cataplasmatibus & aliis quæ sanguinē cohibent. Dissoluuntur liquore oui, & inde cuneoli apertis vasis & naribus imponuntur, aut floccus inde ma-  
 didus profusioni obstitatur. Alia catapotia eiusdē  
*Alia pilula.* vsus. Lapidis hæmatitis, boli armenæ coralli rubri, mumia, & in pulmonariis, pulmonis vulpis rescic-  
 cati ana ʒ. 1. seminis vrticæ & cinamomi (vbi medi-  
 camenti vim altius penetrare conuenit) ana drach. dimidium sacchari rosacei semuncia. Iungan-  
 tur in catapotia ex muccagine tragacanthæ, vel syrupo myrtino. In medicamentis quæ sanguinem sistant,  
 adhiberi possunt trochisci ex electro aut carabe, è terra sigillata, nonnuquam etiam narcotica, quæ  
*In erosione.* soporem faciant, & frigore sanguinem compescant. Hæc, vt alia diluere & vsurpare oportebit. In ero-  
 sione vbi vniuerso corpori consulueris. nec aliter mederi datum est, veniendum ad pastillos Andro-  
*Pastilli.* nis, Pasionis, Polyidæ & similes ex quinto de com-  
 positione pharmacorum *ἡ γένεσις, ἐπιρροητικὸς* à re-  
 tinendo Græci vocant. Sed variè describuntur ab antiquis.

antiquis. Aliter enim ex Heraclide, Critone. Asclepiade, Andromaco, apud Galenum, Paulum, Aëtium & Celsum, scriptum Androniū inuenias, sed hic satis sit Asclepiadis formulā ascriptisse, quam & hæc variè à posterioribus describatur. Vt Galenus. ℥. cytinorum ʒ. 10. aluminis scissilis ʒ. 4. calchanthi ʒ. 12. myrrhæ ʒ. 4. thuris, aristolochiæ, gallæ ana ʒ. 8. in quibusdam adduntur salis ammoniaci ʒ. 4. Pulvis fit ex omnibus, qui excipiat austerō vino. Polyidæ, qui & ab iisdem posterioribus medicis aliter atque aliter cōficitur. Hoc modo ex Asclepiad. Gal. Malicorij ʒ. 6. myrrhæ ʒ. 8. aluminis ʒ. 5. thuris ʒ. 4. calchanthi ʒ. 3. fellis taurini ʒ. 6. vino dulci aut passo excipit, ad hæmorrhagias austerō vino excipi potest. Pasionis. Squamæ ʒ. 12. æris vsti salis ammoniaci, aluminis, æruginis, thuris ana ʒ. 8. reliquis in sole tritis ex vino vel aceto thus additur, pastilli forma in vfu aceto diluuntur. Atque hi pastilli eo lubētius additi sunt, quia in plurimos vsus chirurgi conuertantur, recentibus vulneribus, putredini, cariei ossium, fistulis, auribus purulētis, ozænis, ossibus corruptis, vulneribus neruorum, nomis, phagedænis, callosis anirimis, pterygiis, excrescētī carni, inueteratis vlceribus, dysenteriis, aliisque plurimis vitiis medentur, in quibus validè ficare necesse est. Soluuntur vino dulci, sapa, ænomelite, vino albo, fuluo, aceto, aqua, oxymelite, oxycrato, melicrato, succis myrti, solani, cichorij, polygoni, austerō vino, oui candido & aliis id genus, eligēdū autem quod diluas, vt res in præsentia & corporis natura postulabit. Dulcibus, si tēperāda adstrictio, austeris & acidis, si prohibenda putredo & siccāda fluxio

Polyidæ.

Pasionis.

Vfus pastillorum.

## INSTIT. CHIRURGIC.

fluxio est, iis quæ detergeant, vbi & sordes est, quam detergeas, & sanies, quam exhaurias. In hæmorrhagia autē aceto, oxycrato austero vino, succis quoque memoratis dissolui debent. Ac primū quidem vbi vehemens hæmorrhagia est, validè astringentibus materiæ impetus retundi debet, quibus paulatim pastilli commiscantur, postremò solis pastillis utendū erit. Sunt & quæ sequuntur, celebrata veteribus medicamenta, quæ quia sanguinem supprimerent, *ἁμα* appellarunt. Chalcitidis 3. 16. alij 8. mannæ 3. 12. terebinth. frictæ & aceto extinctæ 3. 12. trita omnia insperguntur locis vnde profluit sanguis, quanquā & succis, & liquoribus, & gummi compingi possunt. Datum Ario à Dioscoride Tharsæo mirificè sanguinem sistit. Chalcitidis 3. 8. mannæ 3. 16. contunduntur, cribrantur, & mista in pyxide ærea reponuntur. Vbi vsus postulat, gypsi crudi triti par modus commiscetur. Heraclede 24. malicorij acidi 3. 3. aluminis 3. 4. chalcitidis 3. 1. teruntur omnia in linamento tortili, naribus induntur & locis aliis vnde emanat sanguis. Aliud. Chalcitidis 3. 6. mannæ 3. 2. terebinth. Colophonix ana 3. 4. Adduntur his ad cruistas calchantum, misy, auripigmentum, sandaracha, calx viua. Debilior cruista è calce viua & auripigmento, nisi astringenti materia cōiungantur. Ferrum candens igni, æs, aurum & argentum cauteria sunt. Sed ab auro & argento mollior eschara relinquitur. Celerius auxiliū à ferro cauterio est. E subere vel spongia orbiculus tenuis feruida pice immergitur, & ita calens hæmorrhagiæ appingitur. Alij malicorio, galla, radicibus astrictoriis prius ignitis cruistas efficiunt, recentiorum

*Escharotica.*

*Cauteria.*

rum escharotica sunt vitrioli Romani semuncia, balaustiorū 3. 3. aluminis 3. 1. fiat pulvis. Aliud. Colophonix 3. 3. boli armenæ sesquicia, mastiches, olibani, sanguinis draconis ana semuncia, symphyti rosarum ana 3. 1. sed hoc ἰσχυροῦς potius quam ἰσχαροῦς dicatur. Utuntur supprimēdo sanguini pulvere rubro, sanguine draconis, & aliis de quibus antea. Plura verò escharotica ex proximo capite repetenda. Vitriolis autē crudis vtendum est, si crusta fiat, vltis & acerbo succo tinctis, si aliter sistendus sanguis est, vltura enim astringendi virtus exoluitur. Adhibitis remediis membrum ita collocari debet, vt altior sit locus, vnde hæmorrhagia, reliqua parte quæ radici venæ propior est, & veluti resupino vase & declini quasi deorsū refluat sanguis. Si vulnus est in extremo femore, qua parte genu est, hoc quidem superius esse oportet, vt femur totum, qua inguem spectat, paulatim cōmittatur. Sit membrum in quiete & ea figura situm, in qua plurimum conquiescat, nec doleat, ac mitella cōfirmare manus & puluino crura melius est, æger quoque aduersa parte decumbat. Instituatur vita vnde sanguis acquiescat, aquæ potus & similia, interdicatoriis vnde efferuescat, qualia vina quædā sunt, fortia & calida alimenta. Ac tum præcipuè hæmorrhagiæ cauendum erit in vlceribus, quum hæc intus exultant, natura, quæ in arteriis est commota foras, vt vitium quo præmitur à se repellat. A forti in vlcerib. pulsu inquit Hippocrates, profluuium sanguinis. Sunt qui in hæmorrhagiis narium quod in commentariis veterum scriptum inuenias, profluente sanguine nomen ægri hominis

*Supersticiosū.*

## INSTIT. CHIRVRGIC.

& alia quædam plena superstitione in fronte scribant. Alij granum salis aduersæ auri inferunt, manumque frigida immergunt, atque ita sisti sanguinem multa experientia profitetur. Nec desunt qui idem promittant admota vrtica, quam Græcam vocant, cum sale ex aceto trita. Nonnulli vtuntur mille folio. Quidam porrum præcisis summis foliis naribus admovent, & inspirato habitu sanguinem cohibent, linamenta porri succo imbibita naribus immittunt.

*De Pyroticis. CAP. 5.*

**S**atis factum arbitror institutæ rei argumēto post adscripta remedia, quæ parantur igne, & eo genere pharmacorum, quæ inde πυρωτικά nominant. Quorum vt memoria superiore oratione sæpenumero facta est, ita & plurimus vsus incidit, ac de iis oratio deinceps connectatur.

*Duplex vsus  
pyroticorum.*

Itaque duplici ferè ratione iuuant, nam vel eo adhibentur, vt vitam parti restituant, vel euincant vitia, quæ nullis aliis auxiliis expugnentur. Ac prius veteri sententia decretum est, quæ non sanant pharmaca, sanat ferrum, quæ nec ferrum, sanat ignis. Atque commune hoc consilium est in omnibus quæ nulla alia ratione possint sanescere, vt vel vastetur igne, vel ferro peramputentur. Ac primum quidē medicamento curæ periculum facimus quod clementissimum est, deinde ferro exalpimus, lacera-  
mus, compungimus, idque paulò durius, postremò acie ressecamus, vel delemus igne. In quo austeram quidem & aspera curatio est, & veteri sermone, **MALA MEDICINA** est, in qua aliquid naturæ perit. Sed crudelem medicum necessitas facit, verum crudelitas

*Sententia  
veteris.*

crudelitas blanda oratione quasi veneno leniri debet, & fabulis occupato ægro stupefacto que sensu exercenda est, eadem quoque seueritate vtimur in quibusdam notis & tuberculis, quæ pudenda corpori excreſcunt, & partibus nudis adnascuntur. Me- <sup>Medicamenta</sup> dicamenta ergo quæ aliquid corpori detrahunt, ea <sup>pyrotica.</sup> vel extergent atque discutiunt, vel latente igne depascunt. Quæ verò languentem vitam partim calore, partim spiritu recreent. bládiora sunt, quàm vt exurant. In quo tamen genere reperias quæ ruborem moueant, quæ bullas excitet, quæ denique (si quidem diutiùs immorentur) tandem exulcerent. Atque hæc omnia, vt res & casus postulat, accommodanda sunt. Sunt igitur pyrotica. <sup>Pyroticorum genera.</sup> *δρῶπαξ*, *σινηπισμός*, *φοινηγμός*, *καδαρετικά*, *σινπτικά*, *ισχαρωτικά*, ignis denique, & inde cauteria. Dropac picationes vertunt, non è verbo quidem, sed *πιπτόντα πίτανά* & *πιπτός* veteres appellarunt, vnde Latina vox cōuerſa est. Alij etiam *δροπανισμός* : è pice & quarta vel quinta parte olei, quibus subduplum, plus minúsve piperis, & pyrethri, euphorbij & similibum misceri possit, vnde meliùs calefacit, vt accepto sulphure, cinere farmetorum, & sale siccando magis conuenit. Sic enim permisceri solent : quia tum dropax, tum sinapismus, adhæc phenigmus eò sunt, vt refrigerata calfaciât, cōfirmētq; partes, quæ partim frigore, partim assidua fluxione elanguescunt. Atq; hic sic candum magis; in frigore qualitas ignis augeri debet. Alia quidem possunt plurima, hic tamen præcipuus eorum vsus est, & hæc in genere *μετασυγκρετικά* veteres appellarūt, quæ videlicet exuccas, aridas & propè ex-



## INSTIT. CHIRURGIC.

tinctas partes pristinae naturae reddant, & ut ita dicam, re corporetur. Alutæ dropax impingitur, vel lin-  
teis complicatis, quæ *πύσματα & διπλώματα* Græ-  
ci vocant. Deglabratur cutis eraso pilo: dropa-  
cismus calens inducitur: idem subinde reuellitur  
priusquam refrigerescat. Reuocatur pharmacū, dum  
inde efflorescat locus, & leniter extumeat. Nimiū  
est, cum immoderato usu pharmaci qui tumor  
prius extitit, idem subsidet, & qui erubuerat locus  
exalbescit. Hoc enim volumus, ut dropacis ope re-  
uocata anima, pars quasi mortua reuiuifcat, calorē  
suum ac spiritum recipiat. & iam proprio alimēto  
perfruatur: postremò etiam corporetur, quæ con-  
fecta macie intabuit. Verum alia tardiùs, alia cele-  
riùs vitam recipit. Quæ breui rubet & ignem cō-  
cipit, ea celeriter instauratur: tardiùs autē, quæ e-  
grè recalescit. Desperatio est, cum neq; frictione,  
neq; perfusione & fotu tepidæ, neq; dropace me-  
lius coloratur. Aliis satis fuerit, si trib. aut quatuor  
diebus adhibeatur dropax, nec id assiduè quidem,  
sed vno die: bis hyeme, semel æstate. Aliis bis tēve  
singulis diebus, nonnunquam rariùs, tertio scilicet  
vel quarto quoque die affigitur, ut videlicet vel fa-  
cilè cedit, vel cōtumax languor est. Ac tepida prius  
fouisse confert, vel smegmate affricasse, quod ali-  
quid taspisæ, emphorbij, piperis, pyrethri, radice  
capparis exceperit. Alij perfricant sabano, hoc est  
asperiore linteo, panno, cilicio, vel simili, qui aspe-  
rioribus setis contextus fuerit. Accommodata quo-  
que folia ficulnea, pumex, os sapiæ, squatinæ co-  
rium, aliæque plurima, quæ asperitate ruborem tra-  
hant. Hæc autem iis quæ egrè reficiantur, & pluscu-  
lū

*Modus, utilis  
dropacis.*

*Signa utilis  
dropacis.*

*Præfatio.*

lūm refrixerint. Actum quidem dropax affigitur: qui si pertinaciū hāret, quo iam tempore detrahatur, tepida foueri debet: quem cū detraxeris, fūfurum decocto, eāque materia, quæ partim leniat, partim exergeat, locū fouebis. Non absimile dropacipicinum oleum, quod *πιαρέλαιον* quidam appellant, è pice liquida mistum & oleo. Contra glabreta & caniciem veteres vsi sunt. Sinapisinus paralyticos, coxarios, podagricos, inueterata rheumata, hemicranias, quæque caloris inopia laborant, adiuuat. Caricæ vno die macerantur aqua, nonnūquam cappares, si grauius malum est; in leuiore casu & sensu acriore panis triticeus, multoque magis, si in solam superficiem agere oportet. Iam verò macerata materia contundi debet. In leni sinapismo, subduplum sinapi, in mediocri, æquale permiscetur. Acrior est, qui duplū recipit. At sinapi subtilissimè læuigandum, & quo tempore vna cū reliqua materia pinxitur, affundenda aqua, in qua caricæ illæ vel alia maduerint. Sunt in veteribus qui acetum prætulerint: alij aquam, quòd experimento didicerint sinapi vim aceto exolescere, cuius rei auctores sunt Galenus & Oribasius. Eodem modo quo dropax vsurpatur. Si quis dolor aut feruor à medicamento extiterit, tepida rosacei foru, illituceri rosacei, cerusa ex aqua rosacea pista, & aliis generis eiusdem extinguitur. Phœnigmus rubore facto etiam vesicas mouet & exulcerat, vt ad eorū genus referri possit, quæ quia illita exulcerant, vocantur *ἀνυκτινά*. Ex nasturtio, sinapi, radice enula, bryoniæ, lepidio, columbino fimo, caprillo stercore, vnde *διακοπραγίως*, aceto pistis. Adhæc

*Sinapisinus  
vsus.*

*Materia sinapismi.*

*Confectio.*

*Virtū aceto,  
an aqua vtendum.*

*Phœnigmus.*

*Materia  
phœnigmi.*

## INSTIT. CHIRVRGIC.

*Lac ficulneū.* scylla trita, tunicis alij & nucleis, cātharide, vrtica  
 pulegio, ranunculis, rapfia, euphorbio, tithymalis,  
 fæce vsta, metallis acribus, lacte ficulneo. Lac ficul  
 neum ante maturitatem pomi excipitur, ficcatur  
 umbra: vulnera aperit, & cum axungia exterit ver-  
 rucas. Quædam concepto igne eadem præstant,  
 qualis est lana sordida benè carminata: admouetur  
 igne dum vehementer incaleat. Assæ carnes, & di-  
 uisa oua similiter assata vtraque calida imponun-  
 tur: reliqua verò, cum vsus est, visco, melle, axūgia  
*Vtendi ratio.* vetere, terebinthina, cerato, acrioribus gummi &  
 resinis, sapone, vt res exigit, & corpora vel mollia,  
 vel dura sunt, excipere oportet. Alia quæ friabilia  
 sunt, affricantur: emplastra verò imponuntur lo-  
 co, qui prius palpatur manibus, exercetur ferulis,  
 aut asserculis euerberatur: affricatur etiam, vt laxa-  
 tis spiraculis medicamēti virtus celerius penetret.  
 Anacardia trita septem diebus macerant aceto, in  
 eodem coquunt: dum tertia pars aceti euanescat:  
 refrigerari sinūt, excipiūt cōcha quod enatat oleo-  
 sum. Id mel anacardinum est. Quidam eadem ra-  
 tione macerant coquūq; ad dimidias, per linteo  
*Mel anacar-  
dinum.* lum excolant, traiecto succo mel adiiciunt, atq; ita  
 coquunt ad crassitiem: anacardia verò cocta in vm-  
 bra ficcant, & ad smegmata reseruant. Alij anacar-  
 dos conquassant, sepeliunt melle, dū hoc vim ana-  
 cardij satis cōceperit. Licebit etiā anacardia & her-  
 modactylos in puluisculum terere & affricare, ex-  
 cipere sapone & alliis. Fermentum aceto tinctum  
 anacardino melle & causticis concorporatur. Pul-  
 uisculus ē sinapi. piperis, enphorbij an. drach. i. in-  
 fricatur, vel exceptus anacardino melle illinitur:  
 & in

& in sapone imponi potest. Sapo in causticis iure  
 numeratur ab eo qui libellum scripsit de materia  
 simpliciū, quem falsò attribuūt Galeno, è sebo bu-  
 bulo, caprino, veruecillo, hircino, & lixivio è calce  
 quod postea describemus, acriter relaxat, sordes  
 corporis extergit, exiccat similiter nitro, mittitur  
 in caustica. Aliis quoque reb. additis modò clemē-  
 tior, modò acrior parari potest, vť magis minúsve  
 siccet, calfaciat, extergeat. Nam quod capitellū vo-  
 cant, vnde saponē conficiunt, tum mollius tum ve-  
 hementius licet effingere, è ficus, ranunculorum,  
 tithymalorū cinere fortius est, mitius autē è vul-  
 gari & vsitata materia. Adduntur sales, pyretri ra-  
 dix & capparis, addūtur acria vnde vis saponis in-  
 tēdatur, è sebo vetustiore efficacior est. Quod si re-  
 cēs vsurpatur, & eluitur, & acria detrahūtur, mode-  
 rator sapo confici potest. Canthari dū pars ferē v-  
 na, & ad circiter quatuor partes axungiae vna cōte-  
 runtur, post septimum diem molli pruna concō-  
 quuntur, colantur, & ad phœnigium reponūtur.  
 Ab hōrum plurimis breui tēpore rubor fit, deinde  
 bullæ excitantur, vlcus etiam, si diutius institerint.  
 Vesicæ configuntur, humor exprimitur, relinqui-  
 tur vlcus per quod vitium omninò repurgetur, hac  
 arte coxari, podagrici, hemicranici, cephalalgici se  
 penumero releuantur, repurgantur viscera, atque  
 omninò corpus sordibus & excrementis liberatur:  
 sexcenta denique vitia vetusta, cōtumaciāque per-  
 curantur. Veiūm maturius detrahendum pharma-  
 cum quā existant bullæ, si tantū vita calorque re-  
 fouetur, quia sic exhauriant, quod ad redintegratio-  
 nem partis attractum sit. Et quæ perfrigeratū cor-

Sapo.

Cantharides.

Vfus phenig-  
morum, qui  
exulcerant.In tabidis  
refrigerati  
partibus.

## INSTIT. CHIRVrgIC.

*Duo genera  
calfaciētium  
à substantiis  
perfrigerare  
partes quo-  
modo reso-  
uenda.*

pus calfaciāt, duorum sunt generum, tenuiora alia, alia verò crassiore natura. Tenuioribus vtendum, vbi celerrimè excalfaciendū corpus, quod recens inalsit. Crassioribus locus est in iis partibus, quib. paulatim calor elāgit, quia videlicet hinc tardiùs quidem calor corpori infertur, exceptus autē longius persistit. Tenuiora celerius permeant, sed inde fugax caliditas, & quæ paulò pòst dissoluitur. Tenuia sunt piper nigrum, albū sinapi, & quæcunque tusa in pollinē faciliè resoluuntur. Crassum est zinziber & huic proximum piper longū, quæ nō ita faciliè infriantur. In perfrictionibus vsitatum Gale-  
*Ceratum.* no ceratum *διὰ τοῦ πορπίου* ex oleo tenui & calido, recenti euphorbio adiecta cera, de quo iam ante libro primo capite de nervis, & dolore abundè disc-  
*Catharetica.* ptatum est. Catharetica sunt æs vstum, erugo, squama æris, alumen crematum, puluis mercurialis, testa & terra furnaria, testarū, concharum, ranarum, panniculorum, rerum causticarū cinis, alia quoq; in epuloticis descripta. *Νευρόμυα* vocat Hippocrates quæ excrescentem, putrem, callosam carnem exedunt. Sunt qui horum loco suctu longo, dentibus, pinna detrahant. Alij vinctis, iniectis tabesciunt. *ἀναθροχισμὸν* veteres appellant. Quidam nouacula excindunt, vel absument igne. Vbi verò profundius malum est catharetica, *Ægyptiacum* & alia, aqua siccate & tergete, eiusdemque potestatis liquoribus dissolui conuenit. Oleū quod è vitriolo exprimitur siccando & exterēdo efficacissimū est, Tabuli plumbei illiti medicamento conueniente, aristolochiæ gentianæque radix spongia, similiter illita immittuntur. Candela cereæ mista materia  
cathæ-

cathæreica confinguntur atque introducuntur. Fi-  
stulæ argenteæ aut plûbeæ locis aliquot quasi fene-  
stris peruiæ conformantur, qua medicamenta inji-  
cias, vt qua parte peruiæ sunt, medicatus liquor dif-  
fluat, & vitium attingat. At hæc nō nisi cum peri-  
culo perferat nudatus nervus aut spiramēta valis  
quæ in partē læsam destināt. Pforicon in melle, Æ-  
gyptiacū, vitriolum, arrhenicum, sandaracha, arrhe-  
nicum in axungia. Atq; hæc subuigecupla ferè sūt  
ad mel & axungiam, nasturtij & veratri albi par-  
modus in pollinem resolutus. Quod sequitur ozæ-  
nas ægylopos, polypos & corrupta ossa summoet,  
fordidis, putridis & serpentibus vlceribus exceptū  
linamento & cum melle imponitur. Lamponis est  
veteris medici, ex ære rubro nec sæpius conflato  
scobem colligimus, eiusque vnciam capimus, salis  
ammoniacy vel vulgaris torrefacti ʒ.2. & tantundē  
ammoniacy, aluminis ʒ.3. aceti accerrimi lib.4. &  
semis. Arida teruntur, aceto perfunduntur in vase  
ex ære rubro. Excoquūtur omnia, & pistillo ex eo-  
dē ære circumagūtur. Alioqui in ardore solis sub  
cunicula continentur, versantur sæpius donec phar-  
macum exarescat, hic in mortario iterum conquat-  
santur, & in puluerem minuūtur. Hæc in melle ad-  
hibentur, insperguntur cauis, & naribus inspiran-  
tur, vel per fistulas insufflantur. Hæc ferè in super-  
ficiem agunt, excrecentē carnem cōplanant, inuti-  
lem adimunt, leniter arrodunt, atterunt, verrucas,  
polypos tabefaciūt, absumūt putria, pudēda deni-  
que faciei tubercula resiccāt ac detrahūt. Ære vīto  
more veterum vtendū erit eoque rubro, quodque  
attritum colorem minij referat vel cinabaris. Cum

*Lamponis ad  
polypos, sex-  
centia vlcera  
remedium.*

*Catheteri-  
con vsus.*

*Aes vīsum.*

## INSTIT. CHIRVRG.

pari modo sulphuris A falis fictili crudo inuritur, donec vas ipsum percoquatur. Spiramēta vasis circunlinenda sunt & obſtipanda creta ſingulari vel argilla, ex quo fornaci omnia committi debēt. Quidam pro ſulphure alumen indunt, alij aceto ſolo ſine aliis reſpergunt. Vſtū conterunt, ac ferē lauāt, ſed minori affectu quā vt cathæreticon habeatur.

*Aeſ vſtum  
ſeplafarium*

*Lana ſordi-  
da.*

*Antimonij  
cremati pul-  
uis cathære-  
ticus.*

*Olea cali-  
ſſima.*

*Puluis acris  
Galenij.*

*Septica.*

Vſtum verò & elotū præſtatiſſimum ad cicatrices remediū eſt. Quod ſeplatiæ oſtendūt durū, nigrū, ſolidum, cruſtaceum, longè recedit ab ære vſto veterum. Conuenienter cremādum eſt, nam & ſupra modum vſtum nigrū euadit. Lanæ ſordidæ obſtipatur olla, quæ & cruda ſit, & ore ampliore ea impleta lanis, ſingulari terra, gypſo, giutine ſedulo obſignanda eſt, vt nihil hiet, nullis expiret rimis, ita fornaci data percoquitur. Succida lana ita cremata flaccidis carnib. reſpergitur, eaſque liquat, ex antimonio cremato, cathæreticus cinis eſt, qui etiā abſumit caneros. Quod ex eo & ſublimate oleū elicitur, quodque è calce viua, vitreolis, aliisq; generis eiſdem feruentiſſimū eſſe cōſuevit. Hippocrates ſiccatum ſaltem ſubduplo melli miſtum vrit olla noua, puluerē excreſcenti carni aut putridæ inſpergit, faſciā arctius ad alligat, vt vis medicamenti altius impellatur, id aliquoties repetit, perſanato vitio locum aceto calido eluit. Admodum acris eſt puluis qui ſequitur. Sandarachæ, arrhenici, chryſocollæ ana. humidiora vlcera reſiccant, maligna curat, excreſcentē carnē detrahit, exceptus melle cremari poteſt, vt tenuior euadat & minus affligat, etenim tenuitas partiū efficit, vt vis ignis minus mordeat. Septica cathæreticis acriora ſunt, exedētia ver-  
tunt

tunt, altius penetrant, tenellam carnem tabefaciunt calore multo, non ita crasso corpore. Arrhenicum sandaracham, dryopteris chrysocolla pityocape, aconitum, sanguis equi admissarij: sed hec ferè cum catharticis permiscuntur. Nam hec acriora septica sunt. *Materia septicorum.* Escharoticavt nihilo plus caleat, rodunt tamè acrius crassiore materia: eaq; duris & callosis corporibus conveniunt, ut septica mollioribus. In escharoticis calx viua, hoc est recens, nec confersa aquis: vini fæx cremata & aceti, quæ secundum mensuram non superat. Atque omnino septicis iuncta adstrictio, quæ acrimoniam non eluat, crustam faciet. Vtriusque generis septicorum & escharoticorum usus est in solutis ulceribus. quæque nimio humore fluant, putrilaginosas, depascētib; & ubi ex intemperie partis ad cicatricem non veniunt. Escharoticis peculiariter utimur in cancri, carbunculis, hemorrhagijs: sed paulò antè quàm hæc adhibetur, frugalis vita, frigida liberaliter potata, vini abstinentia, alimentæ refrigerantia, multò magis ubi febris vel iam subest, vel in metu est, instituitur. Neque prius ea ratio vitæ commutanda, quàm vis ignis omnino acquiescat. Frigida quoque continetur ore, si naribus genus hoc remediorum immitti debet. Contingit aliquando vim causticam dilui, quia ea parte, cui inferitur, multus humor, isque frigidus & aqueus colligitur: hic ergo remedij potentia augenda est. Est cum vim ignis altius penetrare oporteat, quæ tamè obiter retundatur, quia non ita aperta via est: atque ita restitās medela sensim elaguefcatur. Hic ergo si nihil prohibet, via ferro faciēda est, & intro compellenda remedia in eum locum, qui igne affligendus est. In expositis partibus regio quæ dā circūscribitur nucaliteſta, umbilico

*Materia septicorum.*

*Escharotica.*

*Usus septicorum & escharoticorum.*

*Escharoticorum proprius usus.*

*Cautio.*



## INSTIT. CHIRVRGIC.

*De ratione  
applicandi  
escharotica.*

umbilico è cera factò vel re simili, quæ suis marginibus constans pateat in medio, qua scilicet ignis summitatur. Aliquando etiã vbi latius explicanda medela est & amplianda crusta, escharoticon nucis alueolo includitur, vt totum ventrẽ eius compleat, atque ita imprimitur. Eadẽ ratio in aliis machinis, quæ vel angustiore ambitu, vel ampliore ventre cõfingi possunt è cera lignis & radicibus. Alioqui emplastrum paregoricon in platysmate extẽditur, platysma meditullio decussatur, qua escharoticon pharmacum inferas. Rursus aliud platysma escharotico superdatur, plagulæ, quoque & fasciæ ad alligantur quæ contineant. Atq; hæc oui candido & rosaceo mistis inculcantur, totaque vicinia linteis constipatur, quæ in eodem liquore oui & oleo inquinaueris. Septon. 24. sandarachia, auripigmenti an. 3. 2. calcis viua, mannæ, thuris, aristolochia ana 3. 6. pumicis, resinæ, an. 3. 4. iridis 3. 2. teruntur omnia. Al. Arrhenici 1b. 1. calcis viua 3. 2. dieb. triginta in aqua merfa tundere oportet, idque in sole, aut certè igne: bis quotidie aqua mutanda est: siccatur pharmacum, & vsui reponitur. Aliud. Sandaracæ, auripigmenti, calcis viua, pumicis ana denar. 4. eadem macerantur arte. Al. Squamæ æris denar. 4. sandar. denar. 2. elleb. nigri, aluminis, al. auripig. an. denar. 1. leuigatis vtitur. Aliud. Squamæ, sandaracæ, auripigmenti, ellebori nigri, seminis vrticæ torrefacti an. denar. 1. cum rosaceo tritis vtitur. In serpente & humidiorẽ vlcere vtendũ arido: in cancro & struma cum rosaceo subactum adhibetur. Atque hæc ferè materia septorum est, quam exuras, eluas: cerato & aliis temperare possis. Excipiuntur  
cesypo,

*Sepra compo-  
sita.*

œfypo, butyro, axungia, faluua, aliisq; generis eiusdem, vnde acrimonia retundatur. Elleboro magna *Elleborus.*

vis inest contra callos: iniectus fistulæ ad tertium diem callum adimit. Iniiciendus è lixiuio acri, aut ea aqua in qua acria metallica elueris. Interitur prius, & in sextuplo liquore iniicitur. Puluis eiusdè excrescentè carnè atterit. Jam verò callus est dura & cōpacta caro, vnde pars stupet, albicat, pallet, & *Callus.*

ita stringitur, vt non expiret. *Εκπιλωτικά* sunt quæ callos detrahunt. Oppugnantur calli primùm quidem malacticis, deinde causticis, postremò ad ignè ferrumque decurritur. Eradūtur vnguibus, lacerātur scalpris, excinduntur cultris ad viuum, quòdq;

reliquum sit caustico remedio absumitur, vel candenti ferro affligitur: at fluxio reprimenda prius quàm execetur callus. Exciso callo tepida fouetur locus, repurgatur melle & ærugine, si qua sordes extiterit, & ad cicatricè abluatur aqua, in qua alumen

difflexerit. *Εκτιλωτικά* sunt scilla cocta & cum calce trita, nitrum, sal, torrefacta, fæx cremata veteris acrisq; vini, fæx aceti, cortex salicis vitus & aceto pistus, calx cremata cum pueri impubis vrina, ærugo melli, sali, thuri æqualiter mista. Calx irino vel

ligustrino cerato capta: esta terraque furnaria, pumex crematus ex aceto trita omnia: masturtij farina

aqua subacta, bdellium pingue cum melle ammoniacum aceto fufum cum pari ærugine: radicis lilicinis, ærugo cocta læuigata, amygdala è melle trita. Squamæ  $\tilde{z}$ . i. æruginis denarij 2. cerati lentiscini vel mastichini  $\tilde{z}$ . 8. plus minúsve. *Materia est loticon.*

Harpax cum *Harpax.*  
modica ærugine, est autem Harpax mistura è viuis *Olea quæ cal in conueniunt.*  
calce & sulphure. In callis laudatum est Galeno o-

leum

# INSTIT. CHIRURGIC.

leum lentiscinum, quia mollit, digerit astringit & reprimat: quæ omnia difficili vlceri opus sunt & oris induratis. Terebinthinum similiter & mastichinum. Διὰ χαλκίτεως aucto modo chalciteos fluxionem reprimat, quæ callum fouet & hūc exerit: accommodatum est duris naturis. itaque in fistulis quæ fluxione & duritie laborant, duæ partes medicamenti duabus partibus olei diluuntur, atque oleum mediæ ætatis esse conuenit. Cōstat remediū multis experimentis Galeni, quod ita in rem præsentem parandum est. Lithargyri olei veteris an. ℥. 3. axungię veteris ℥. 2. chalciteos ℥. 4. quinque, sex, (vt sunt corpora dura vel mollia, parentur) cætera vt prius: ita diluatur oleo, vt liquidū infūdi possit. Atque oleū lentiscinum mastichinum ad eam rem idoneum est. In exposito callo solidius esse oportet. Et lithargyro, chalcitide, ærugine, squama, oleo veteri & aceto ἐκ τῶν καὶ ferè compegit Asclepiades. Megetis singulare remedium. Ammoniacum aceto dissoluitur & pari ærugini permiscetur, quæ si difficilius vnientur, oleum quod conueniat addi potest: alioqui loco æruginis Ægyptiaca ammoniaco misceantur. Atq; hæc vt nihil initio effecisse videātur, perseuerandū tamen: semel enim, & nec opinante medico perficient quod velit, id quod in emplastro διὰ χαλκίτεως Galenus testatus est: ecclitoricon Asclepiadis. Lithargyr. ℥. 1. olei veteris ℥. 2. & semis æruginis, chalcitidis, squamæ, an. scrupuli 2. aceti denarij 6. Aliud. Lithargyri selibra, olei veteris lb. 1. chalcitidos ℥. 2. squamę æris vnicavna, aceti vncię duę & semis. Aliud. Lithargyri selibra, squamæ, chalciteos, æruginis ana semuncia, aut vt

Materia contra callos ex Asclepiade.

Ecclitoricon Asclepiadis. Alia ecclitorica.

fit fortius ℥.i. aceti ℥.3. & ℥.6. olei veteris ℥.i. &  
 ℥.4. Lithargyrus oleo coquitur ad crassitudinem,  
 deinde squama leuissimè trita inspergitur, assidue  
 mouentur, hic vas foco subducitur, ac refrigerenti  
 pharmaco ærugo & chalcitis ex aceto trita paula-  
 tim immittitur, & circumducta spatha permiscen-  
 tur, coquantur iterum dum non contaminet, po-  
 stremo traducta in mortarium circumaguntur, sub-  
 iguntur, vniuntur probè & ad vsum reponuntur.  
 Durorum corporum medicamentum est, quæ cal-  
 lum contraxerint. nec facile cicatricem trahât, ex-  
 crescentem carnem reprimat, crudis vlceribus con-  
 uenienter adhibetur, postremò fluida & diuturna  
 iuuat. Sed initio quidem malactico téperare præ-  
 stat œsypo, & eo cerato quod inde comparatur, bu-  
 tyro, medulla cerui & aliis id genus. In summa hæc  
 obseruata medicis in curâdo callo, vt in his paula-  
 tim molliretur, incideretur. Atque hoc nomine re-  
 primens auxilium ferè miscuerunt quia in callos hu-  
 mor aliquis, veluti mali fomes, illabitur. Adde q̃  
 quæ malactico & laxante pharmaco soluta sunt,  
 confirmare oportet, & hinc quoque reprimentia  
 commiscantur. De callo, qui ossibus adnascitur, su-  
 perius abundè scriptum est. Tophi verò qui à lue ve-  
 nerea relinquuntur, iisdem quoque remediis curari  
 debet, nisi contumaciùs repugnent. In his enim &  
 breuissima & tutissima curandi via igne perfici-  
 tur, multò magis si suspicaberis tunicam adnatam  
 ossi, & inde os aliquid vitij contraxisse. Quod si fit,  
 blandiorem illam curâdi artem, quæ tophum mol-  
 lit, secatur, discutit. & frustra & cum periculo adhi-  
 beas. Hoc loco igitur malum malo medicari oportet

*Ecchymotica  
 quibus gene-  
 ribus phar-  
 macorum mi-  
 scantur.*

*Tophi à lue  
 venerea.*

## INSTIT. CHIRVRGIC.

*Crudele ma-  
lum crudeli-  
ter depellen-  
dum.*

tet. Cauterium topho accommodatum condatur  
prunis dum vehemēter micet atque excādeat, ne-  
que enim rubere satis est, vt neque leniter transcur-  
rere tophum & molliter attingere. Etenim miseri-  
corditer premendus ignis est, inurendus tophus, vt  
iam os subiectum oculis exponi possit. Malo nodo  
malus cuneus quærendus est, vt est in prouerbio,  
raroque crudele malum nisi crudeli malo depelli  
potest, exusto topho cura quædam ossis ineunda  
est, sed tum maximè cum inducta crusta exciderit,  
videndumque nunquid arrosū, putre & cario-  
sum extiterit. Hinc ergo ad ossium inedelas recur-  
rendū, si qua ramēta decesserint, cura sit vt partim  
frugali vita, partim siccantibus remediis intabe-  
scant, sic enim sponte sua excident. Ac remedia il-  
laquæ siccant, iam ante cōmemorata sunt, & post-  
ea describentur aquæ fortes, & alia generis eius-  
dem. Verū naturæ corporum partiumque habea-  
tur ratio, etenim cum cruris articulo quam cum  
media tibia clementius agendum est, neque enim  
vim ignis thorax sustinet, quam femur medium to-  
lerare possit. Sed de his antea capite de aperienda  
vomica disputatum est. Fit aliquando vt excrescāt  
ossa atque supra modum emineant, ἑξοσώσεις no-  
minant voce ambigua, vbi pleraque frustra insti-  
tuas, quæ tophis adhiberi solent, escharotica è ma-  
teria septica conficies mistis metallis acribus, quæ  
crassa & astringenti potētia prædita sunt, vt firmior  
trahatur crusta, qualis est cadmia, calchanthum,  
chalcitis, vitrioli genera cruda omnia, quia scilicet  
vitura tenuiora fiunt & adstringendi vim depo-  
nūt. Cruda igitur & intrita salina hominis vel aceto  
subigenda,

subigenda, cocta verò crusta infirmius contrahūt. Septa permiscēda aut cremata crudis, quum altius imprimenda crusta. Verum celerrimè operatur ignis, siquidem æger perferat, atque is variis modis <sup>Ignis.</sup> adhiberi potest. In quem vsum tubuli lignei, cānales anei, ferrei, argenti variè confinguntur, aptantur cannæ & pennæ scriptoriæ, vt extrema parte in æquabilem circulum circūscribantur. Ea pars imprimenda loco, quem vrere necesse est, aqua feruida per tubulum infunditur contra clauos & verrucas. In ea aqua althææ radix, tragacantha, chamæmelum, hyssopus, pulegium, quæque molliant, incidant, discutiāt, cōcoqui possunt, vt nō solo igne, sed alio quoque genere curandi vitium pertentes, aquæ loco, oxycrato, oxymelite, vino & aliis vti datum est. Archigenes in Ægilopas liquatum plumbum & feruens per infundibilū instillabat, alij vtuntur vitro. Sed machinas quibus hæc omnia infundantur, corniculorum more patere magis necesse est eo extremo quod dehiscit foras, quaque medicamenta cauo immittūtur, ne si quid diffuset, in nudas partes elabetur. Aliter quoque lana fordida specilli nucleo adalligatur, feruēte oleo vel butyro intingitur, atque ita imprimitur loco. Fortius est, si è vitriolo, calce, antimonio & vocato sublimate, aliisq; id genus extortum igne & chemicorū arte oleum fuerit, aut minore impendio hæc eadem materia oleo inferbuerit. Sunt qui nucali testa, voluta cochleæ, crusta panis, oui cortice inurāt. Alij è radice aristolochiæ, gētianæ, struthij, ramento mitti, buxi & aliis id genus cauteria effingunt. Continentur omnia in prunis, dum carbunculēt. In ore,

*Archigenes  
ad Aegyla-  
pas.*

## INSTIT. CHIRVRGIC.

*In capis partibus.* nare & aliis partibus eiusmodi ne quid obiter violens, enodi canna vel calamo scriptorio vtendū est, atque hæc primū inferuntur cauis, dum extrema parte laboranti loco infideant, tum per eadem tenuerunt ferramentum candens inferendum, atque ita inurendum malum est. Vstione Arabica exemplo veterum vsa est posteritas, vaccinū cauteriū quidam appellant. Dioscorides in eo interitio vbi pollex brachiali cōmittitur, caua veluti lacuna subfidet, in qua lana oleo imbuta subternitur, deinde caprillum stercus feruidū sæpius imprimitur volfella captum vel forcipe, donec vapor per brachiū ad coxam sentiat peruenire. Melius Antylus, Plinius & Arabes cauum illud, quod paulò infrā ungulam sub pollice pedis est, eo stercore inurunt, donec vis ignis halitu per tibiā & femur grassante in coxam penetret, hoc enim vsturę genus coxariis inuentum est. Alij stercoris loco hermodactylos & ranuncullorū folia adalligāt. Quod videntur imitari leuiore quidē remedio, qui lenticulā aqua feruente plenam pedibus adiungunt, vt plantæ calorem ignis concipiant, atque hinc vapor per totum membrum ad coxā transmittatur. In ea aqua plurima concoquunt chamæmelum, melilotum, anethum, ebulum, maioranam, chamępytim, maluam, althæam, & alia id genus, quæ leniant, incidunt, discutiant. Quillo fimo, caprino, & aliis generis eiusdem ad vstiones similiter vti licebit. Commutandum subinde fimum est, priusquam deferbuerit. Auro & argento lenius, ære & ferro acrius inurimus. Ferro vtitur Hippocrates in carne, fungo in neruo & osse, si quidem legitimū opus est Hippocratis

poeratis quod *περί τῶν ὀτρὺς παδῶν* inscribitur, ubi  
 buxeis fulis oleo feruente tinctis & fungis hepar  
 inurit. Omnino autem magnitudo vitij & natura  
 partis cum vi remedij conferenda est. Cæsim, pun-  
 ctim cauteria imprimuntur, adiguntur longius;  
 latius & in circulum circumferuntur vno loco vel  
 pluribus, semel ac sæpius transcurrunt tantum &  
 leniter attingunt, vel diutius insidenti vi maiore  
 imprimuntur, vt natura morbi, corporum & par-  
 tium sustinet, ex quo varię cauteriorum forme in-  
 uentę sunt. Minuuntur vicinę partes, vt ne vis iu-  
 sto latius proferpat, oui candido & rosaceo, muc-  
 cagine psyllij, cerusa è rhodostagmate lota, & iis  
 omnibus quę quia phlegmonē prohibent, ἀφλεγ-  
 μαίνοντα Græci nominant, eaque in spleniis & lin-  
 teis adhibentur. Crustas autem nutare prius quàm  
 detrahantur, & veluti maturitate quadam cedere  
 oportet. Alioqui vis afferri solet, ex quo profun-  
 dum vlcus relinquitur, hæmorrhagię commo-  
 uentur, dolor, fluxio, inflammatio denique irri-  
 tantur. Tempestiuè deduci possunt butyro, iosta-  
 gmate vel rhodostagmate loto, adipe anserino &  
 gallinaceo, farina tritici in porri vel rutę succo,  
 lenticula cocta & cum melle mista, oleastri foliis  
 cum melle litis, sulphure trito & oleo, contusis  
 nucem intraneis; porri foliis salina pistis, lacte  
 cum melle cocto, albo stercore canino, cinere  
 vstarum hirundinum, aut cochlearum terrestrium,  
 crematis minore centaury, draconio, stercore  
 humano, chalcite trita & subtriplo melle, vel  
 chalciteos vncia vna, ireos semuncia, adhiben-  
 tur per se & cum melle. Nutrita lythargyro & vsto  
 butyro,

*De crusta de-  
trahenda.*

*Qua crustæ  
detrahunt.*



## INSTIT. CHIRURGIC.

butyro, radice ononidis, columbæ fimo cum melle, quod & carbunculos scarificat. In summa, detergente simul atque incidente materia, aliquando etiam molliete & paregorica, ac breuiter quæ valde sordida & contumacia vlcera repurgant, eadem crustas detrahunt. Abstinentum hac parte iis quæ adstringât. Quod si pertinacior crusta est & asfrictior, inusta caro sordem includit, atque hæc inclusa periculum aliquod denunciet, quicquid est iustum scarificare conuenit, sic enim sordes aperta via defluet. Recetiores chirurgi in septis numerat stuppas canabinas in cinerem versas, hermodactylos, anacardias, bryoniæ radices, alumen, vnguentum apostolorum, vitrioli genera, cuprosam, quæ pro calchatho, chalcitide misy & fori vsurparunt. Ad crustas crudis, ad exedendum & vim septicam vltis vtendum magis. Addunt æruginem, vnguentum viride, ægyptiacum, trochiscos e calce. Calcis ʒ. 4. terantur cum melle non tam multo quidem quam in purgantibus dictum est. Satis fuerit modò trochisci inde coëat, qui capsula figulina ordine collocati, & clibano dati eò cumentur, vt in cinerem abeant. Al. Succis radicis asphodei ʒ. 6. calcis viux ʒ. 2. auripigmenti ʒ. 1. arida succo immersa sub canicula persolentur, dum squaleant. Alij trochisci caneros absument, & polypos narium. Calcis viux arrhenic citrini ana ʒ. 2. vitrioli, æruginis, aluminis ana ʒ. 1. galliarum, acaciæ, balaustiorum ana dimidium dragmæ, teruntur omnia in mortario æneo, quod sit expositum igni vel ardori solis, respergitur aceto, eoquæ acerrimo, idquæ subinde reperitur, & acetum nouum refunditur, quinto

*Recentiorum  
remedia.*

*Trochisci  
e calce.*

*E succo aspho  
deli.*

*Alkadicon.*

quinto die trochisci fiunt, siccantur umbra, loco  
 secco & frigido reponuntur, qualis est patens Aqi-  
 lonibus. In usu, vino diluuntur, & in linamentis ad-  
 hibentur. Cantharidum ventres fermento cogunt  
 vel sepo. Sed à cātharidibus vrinæ ardor metuitur,  
 nam & hæ illitæ capiti genus hoc mali inferre pos-  
 sunt, cui gargarismus è lacte, & ex eodē infusio re  
 medio est. Sublimati (quod vocant) plurimus usus  
 est, sed paucum ut antè dictum est, plurimo butyro,  
 adipe, æsypo temperandum est duodecuplo & ali-  
 quando vigecuplo. In adipibus septicus est è ranis  
 viridibus, quæ sint familiares sepibus & arboribus.  
 E natatricibus nō ita calet. Quæ sequuntur ex quin-  
 to de compositione medicam. *κτ* γένν transitule-  
 tunt. Niger pastillus Andromachi. Malicorij dena.  
 ro. aristolochiæ rotundæ, gallæ ana. dena. 8. alumi-  
 nis, aloës, ana. denar. 4. myrrhæ, calcanthi ana. de-  
 nar. 4. colliguntur vino, & ex eodem  
 dulci in usu dissolui debent. Al. Sandarachæ, auri-  
 pigmenti ana. dena. 2. mannæ thuris denar. 4. tritis  
 vititor. Sādaracha rara est nisi venas illas colligas,  
 quæ veluti linea quædam rubra arrhenicum trans-  
 currunt. Plurimos verò finges pastillos hac ratione  
 ferè dupla calce, subduplo arrhenico, mista parte  
 aliqua gallarum, thuris & aluminis. Trochisci de  
 arrhenico recentiorū. Calcis viue lib. 1. auripigme-  
 ti rubri & citrini, alkali, acaciæ ana. sēlibra, trita  
 miscentur cum capitello. Est autē sal alkali, quan-  
 tum conficio genus quoddam salis, quale veteres  
 fingeant è quercu, corylo, trunco harundinis  
 carbunculatis & aqua dulci vel marina coctis, sa-  
 lē nigrum appellabant, aut quod posteritas è

*Cantharides.**Ranarum  
adeps.**Pastillus ni-  
ger Androma-  
chi.**Sandaracha  
Materia pa-  
stillorum.**Trochisci de  
arrhenico.**Sal alkali.*

## INSTIT. CHIRURGIC.

brassica marina facit, quanquā & è beta & nitro-  
fis planis comparari potest. Alioqui torrefactum  
salem cum hydrargyro tandiu pistillo volutabis,  
dum sal nigrescat, alij aliter alkali interpretantur.

*Capitellum.* Capitellum ita fit. Calcis viuæ, salis ammoniaci  
ana lib. 1. trita subigantur lixiuio è fabaceis seapis,  
deponuntur olla quæ è fundo hiet angusta rima;  
aliud figlinum subiicitur, in quod lixiuium paula-  
tim diffuat. Vas vtrunq; in diem septimum initio  
defodi debet. Ex eo lixiuio & sebo vt antè dictum  
est, fit sapo, cathæreticon, septicon, & lene escha-  
roticon capitellum est. Alij tres partes cineris faba-  
ceorum, vnâ viuæ calcis subinde perfodiūt aqua,  
diu conuoluunt, & per quasillum rarum transco-  
lant. E ficulneo lixiuio, tithymalino, & omninò è

*Lixiuia saponaria.*

*Capitellum vaginæ* appellat, lixiuium saponarium interpretari  
*fistulæ.* licet. Aliud quoque capitellum quod fistulære vo-

*Pastillorum  
usus.*

cant, arrhenico sublimato, vitriolo additis, vt vnâ  
cum aliis in lixiuio extillent. Sexcenta id genus è  
materia quæ fistulis conueniat, effingi possunt. Sed  
vt redeamus ad pastillos horum vsus est in nomis,  
phagedenis, fistulis, rheumaticis & malignis viceri-  
bus, reduuis vnguium, putredine narium & alia-  
rum partiū, polypis, ozænis, condylomatibus, pu-  
trescētib<sup>9</sup> gingiuis excresecēte carne, gangrenis &  
aliis generis eiusdē. Sed omninò partium corporis  
& vitiorum habeatur ratio. Vis acrior obtundi po-  
test tritis pistillis, & triginta vel quadraginta die-  
bus insolatis, perfusisq; frequēte aqua, eaq; sepius  
commutata, aut si non datur vtifole, subinde per-  
fundantur.

fundantur aqua, eaq; vel simplici, vel rosacea, aceto, vino & aliis vt res exigit, siccentur, atq; iterum proluantur, eaq; tandiu reuocentur, dum dilutam satis exoleuisse acrimoniam perceperis. Aliquādo miscentur melli, & vnā comburuntur, aliās cerato diluuntur. In fluidis & humētibus vitiis galla, mallicorium, alumen & alia quæ siccent & reprimant, commodè temperantur. Atque omninò tutius est à leuioribus ad acriora sensim progredi. In humido & fordido vlcere pinguibus abstinendum, arida insperguntur. In calloso & squalēte vitio sicca pinguibus excipi debent. Septica faciunt Arabes, quæ à Græcis descripta sunt, & alterū genus relinquunt, quod humido calore cū fœtore partes corrumpit. Quæ ex hydrargyro fiunt, præcipitatum, sublimatum, cinabriū, solani succo, brassicæ, limonum & aliis attemperāt. Licet etiam quod veteres factitarunt, non tribus, sed (quod proximè dicebatur) triginta & quadraginta diebus terere in sole sub canicula, vel loco calente bis aut sæpius, quoti die mutata aqua, vt vitiis, partibus & corporibus accommodentur. Minium è micis metallicis, è ste *Minium.* rili gleba plumbi, è cerusa vsta, quod alij Syriçon, alij Sandicem vocant, ad epulotica, potius referendum. Quod verò è sulphure & hydrargyro factitium est, in causticis censerī debet. Sed de his antea usurpant præter hæc aquas fortes &, vt dicunt, Al- *Aque fortes.* chymastarū, ex rebus acribus, stercore gallinaceo, columbino, arrhenico, aliisq; id genus, vt quibus aurum ab argento, metalla à metallis separāt. Salis ammoniaci, auripigmēti rubri & citrini, cuprosæ, æruginis anā, trita in alembicum vitreū bene stipatum

## INSTIT. CHIRV GIC.

patum luto & vnde quaque clausum deponuntur, quæ vbi lento igne concaluerunt, liquorem reddunt, sed qui primùm defluit, vel abiicitur, vel in alembicum repetitur, hîc ignis augetur duplo, qui secundò fluit, fideliter reponitur. Alij ex aluminis rotûdi, vitrioli Romani an.  $\text{℥.i.}$  salis, nitri, vel crematæ fæcis acetj sesquilibra, aquam eadem arte eliciunt. Hæc callosis corporibus idonea sunt, & ossibus. Suspecta in naso, labris, palpebris, digitis, & pudendis, mollibus atque exiguis partibus vbi vena, arteria, neruis insignis est, ac primùm quidem minimum sit quod imponitur, deinde vt res exigit, & ferunt corpora, augeatur. Ac iam constare arbitror, pyrotica omnia modò mistura, modò vstrina & lotura retundi posse. In mistura oui liquor, psyllij muccago, ceratum rosaceum, vnguentum album, dialthæas, emplastrum è muscillaginibus, & alia propè infinita, quæ ad mediam naturam veniunt, quæ refrigerant, molliunt, vsurpari debêt. In vstura ignis est figulina cruda, pana & alia, de quibus antea. Eluuntur aqua, aceto, vino & aliis generis eiusdem. Neque hoc in dubio est, vacuatis ac iam repurgatis corporibus pyrotica adhiberi, quo iam tempore à lenioribus auxiliis desperatio est. Postremò leniendæ partes, quas vis ignis exasperauit,

*Vbi suspecta  
aque fortis,  
& alia id ge-  
neris.*

*Quibus tem-  
peres pyro-  
tica.*

F I N I S.

